

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ КРЫМСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

В.П. Костина¹, Н.А.Багрикова²

1 – Крымский природный заповедник

2 – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр НААН

Инвентаризация видов растений и анализ флоры – важные этапы ботанико-географического, фитоценотического и биогеоценологического изучения любой территории. Без подобных исследований невозможно выявление динамики видового состава. За 200-летний период изучения флоры Горного Крыма, в том числе и территории Крымского природного заповедника, выполнялась большая программа ботанических исследований – от выявления флористического состава до эколого-биологического анализа ценозов, оценки условий, характеристики этапов развития флоры и растительности. В этой эстафете научных поисков принимали участие как маститые флористы, крупные геоботаники, известные лесоводы, так и рядовые сотрудники заповедника и ботаники родственных учреждений (Костина, Слизик-Маслова, 2002). В последние годы ботанические исследования на территории заповедника, в том числе изучение популяций редких и охраняемых видов, продолжают сотрудники М.И. Руденко, фенологические наблюдения за древесно-кустарниковыми видами И.Н. Мамроцкая, а также специалисты из других учреждений (В.В. Корженевский, А.Р. Никифоров, А.В. Ена, Ю.В. Плугатарь, Л.Э. Рыфф и т.д.) В данной публикации мы не будем останавливаться на истории флористических исследований на территории Крымского заповедника, которая описывается в ряде публикаций (Костина, Слизик-Маслова, 2002; Попов, 1963). Основная цель настоящей работы: составление аннотированного списка высших растений.

Первый аннотированный список флоры заповедника был подготовлен и опубликован Г.И.Поплавской (1931), в нем приводился 771 таксон высших растений. В послевоенный период работы по изучению флоры заповедника проводились Е.А. Шаройко и Л.И. Самсоновой, в результате чего список растений был уточнен и дополнен, и по неопубликованным данным Л.И. Самсоновой он включал уже 1080 видов. В 1976-1980 гг. в рамках тематических исследований заповедника были выполнены планомерные работы по флористическому обследованию территории, по обработке гербарных сборов, литературных данных (Костина, 1981, рукопись; Костина, 2001, 2003). К сожалению, составленный список, который включал 1165 видов из 466 родов и 88 семейств, до настоящего времени не был опубликован. Семейства в списке располагались по системе А. Энглера, рода и виды в пределах рода – по алфавиту. С момента составления списка прошло более 25 лет, вышли в свет «Сосудистые растения России и сопредельных государств» (Черепанов, 1995), «Vascular plants of Ukraine a nomenclatural checklist» (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999); работы по изучению вопросов флористического эндемизма Крыма (Ена, 2001, 2007, 2009); Чеклисты Роасеае и Asteraceae флоры Крыма (Ена, 2003а,б, 2005), Червона книга України (2009) и другие, поэтому назрела необходимость провести ревизию флористического состава. При подготовке конспекта флоры анализировались списки, составленные Г.И. Поплавской (1931), Л.И. Самсоновой (1953, рукопись), Л.А. Приваловой (1958), В.П. Костиной (1981, рукопись), а также данные из многотомного издания «Флора

Крыма» (Вульф, 1929-1969), Определителя высших растений Крыма (1972), Определителя высших растений Украины (1987). В список включены все дикорастущие и одичавшие виды, отмеченные на территории заповедника до 90-х годов XX в. Анализировались гербарные коллекции Крымского заповедника, YALT, а также отдельные находки авторов публикации за последние годы. Не включены 14 видов деревьев-экзотов, высаженных на территории заповедника в начале прошлого столетия (Ярославцев, Доценко, 1963). Нами не проводился критико-таксономический анализ некоторых родов, в том числе *Pilosella*, *Rosa*, *Rubus*, *Taraxacum* и др. В результате проведенной работы некоторые таксоны из списка Г.И. Поплавской в настоящее время исключены из конспекта, т.к. по нашему мнению были приведены ошибочно (такие как *Hieracium megatricum* Borbas; *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott.; *Ornithogalum brachystachys* K.Koch.); некоторые приводятся как синонимы (например, *Gagea pusilla* (F.W. Schmidt) Schult. & Schult. f.). Поэтому по современным представлениям флора заповедника по Г.И. Поплавской включала не 771, а 692 таксона. В тоже время общий список флоры заповедника пополнился за последующие 50 лет.

Таким образом, конспект флоры Крымского заповедника включает информацию о 1177 таксонах из 104 семейств. Номенклатура составлена согласно S.L. Mosykin, M.M. Fedoronchuk (1999), с дополнениями по С.К. Черепанову (1995), приводятся также синонимы названий, встречающиеся в различных источниках. На территории заповедника произрастают 114 редких и нуждающихся в охране видов, из них включено в списки IUCN – 19, ERL – 32, CITES – 37, ВК – 9, ЧКУ – 101. Достаточно высок уровень эндемизма, из 117 эндемичных таксонов, приводимых А.В.Еной (2009) для Крымского полуострова, на территории Крымского заповедника отмечено 55.

Более 450 видов относятся к синантропным, при этом на долю адвентивных приходится менее 7% от всей флоры заповедника. Таким образом, флора заповедника отличается невысокой степенью антропогенной трансформации (индекс синатропизации равен 38,5), обусловленной соблюдением заповедного режима. Многие синантропные виды попали на территорию заповедника в результате ведения различных видов хозяйственной деятельности, начатых еще в середине XIX столетия, когда на территории Горного Крыма был основан Космо-Дамиановский монастырь и проложена Романовская дорога. Кроме того, заповедник функционировал в качестве заповедно-охотничьего хозяйства, на его территории проводились лесомелиоративные работы, в том числе и посадки древесных растений на пустырях, прогалинах, вдоль дорог, на яйлах. Некоторые растения (*Aquilegia vulgaris* L., *Colutea arborescens* L., *Philadelphus coronarius* L., *Sedum spurium* M.Bieb.) высаживались в качестве декоративных и впоследствии одичали. Поэтому большинство сорных видов отмечаются, в основном, вблизи кордонов, у дорог, в местах рекреационного использования.

ОТД. EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые

1. **Equisetum arvense* L. (#*E. arvense* ssp. *boreale* (Bong.) Tolm.; #*E. boreale* Bong.) – Хвощ полевой. Мн., споры III-IV.

Сырые лесные поляны, долины рек, сорное в посевах, обычно.

2. **Equisetum hyemale* L. (#*E. komarovii* Pjin; *Hippochaete hyemalis* (L.) Bruhin) – Хвощ зимующий.

Мн., споры IV-V. На галечниковых берегах р. Кача, редко (Г.П. 18).

3. *Equisetum ramosissimum* Desf. (*Hippochaete ramosissima* (Desf.) Börner) – **Хвощ ветвистый**. Мн., споры V-VI. По речным долинам, довольно редко (Л.С.).
4. **Equisetum telmateia* Ehrh. (*E. maximum* Lam.; *E. majus* Garsault) – **Хвощ большой**. Мн., споры III-IV. По берегам лесных болотцев, источников, редко.

ОТД. POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA) – ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

Aspleniaceae Mett. ex Frank – Костенцовые

5. **Asplenium adiantum-nigrum* L. – **Костенец черный**. Мн., споры VI-VIII. Среди скал, Большой Узеньбаш, очень редко (Г.П. 11). **ЧКУ**.
6. **Asplenium ruta-muraria* L. – **Костенец постенный**. Мн., споры VI-VIII. Среди скал, по всей территории, обычно.
7. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – **Костенец северный**. Мн., споры VI-VIII. Среди камней, дубовый лес по долине р. Кача, довольно редко.
8. **Asplenium trichomanes* L. (#*A. melanocaulon* Willd.; *A. trichomanes* ssp. *bivalens* D.E.Mey) – **Костенец волосовидный**. Мн., споры VI-VIII. Среди влажных камней, по всей территории, обычно.
9. **Asplenium viride* Huds. – **Костенец зеленый**. Мн., споры VI-VIII. Среди скал, в верхнем горном поясе и на яйле, изредка (Г.П. 9).
10. *Ceterach officinarum* Willd. (*Asplenium ceterach* L.) – **Скребница лекарственная**. Мн., споры VI-VIII. Среди скал, камней в буковых лесах, редко.

Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые

11. **Athyrium filix-femina* (L.) Roth – **Кочедыжник женский**. Мн., споры VII-VIII. Во влажных местах, в буковых лесах, редко.
12. **Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. (#*C. almaatensis* Kotukhov; #*C. emarginato-denticulata* Fomin; #*C. filix-fragilis* (L.) Borbas; #*C. fragilis* ssp. *emarginato-denticulata* (Fomin) Fomin; #*C. thermalis* A.P. Khokhr.; *C. regia* (L.) Desv., nom. ambig.) – **Пузырник ломкий**. Мн., споры VII-VIII. Среди скал, по всей территории, обычно.

Dennstaedtiaceae Lotsy (=Hypolepidaceae Pichi Sermolli) - Деннштедтиевые

13. *Pteridium tauricum* (C.Presl) V. Krecz. ex Grossh. (#*Allosorus tauricus* C. Presl. nom nud.; ? #*P. aquilinum* ssp. *brevipes* (Tausch) E.Wulf.; #*Pteris aquilina* f. *transcaucasica* Rupr.) – **Орляк крымский**. Мн., споры VI-VIII. В сосновых лесах южного склона, обычно.

Dryopteridaceae Ching. (=Aspidiaceae Mett. ex Frank, nom. illeg.) – Щитовниковые

14. *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs (#*Aspidium spinulosum* (O.F. Mull.) Sw.; *D. euspinulosa* (Diels) Fomin, nom. illeg.; *D. lanceolatocristata* (Hoffm.) Alst.; #*D. spinulosa* (O.F. Mull.) Kuntze comb. superfl.; #*D. spinulosa* (O.F. Mull.) Watt; #*Polypodium carthusianum* Vill.; #*P. lanceolatocristatum* Hoffm. p.p.; #*P. spinulosum* O.F. Muell. 1777, non Burm. Fil. 1768) – **Щитовник картузианский**. Мн., споры VII-VIII. Черномольное болото в буковом лесу, очень редко.
15. **Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – **Щитовник мужской**. Мн., споры VII-VIII. Во влажных местах, по всей территории, обычно.

16. **Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newman. (*Dryopteris robertiana* (Hoffm.) C.Chr.) – **Голокучник Роберта.**

Мн., споры VII-VIII. Смешанные леса, район водопада Головкинского, р. Качи и Большой поляны, редко.

17. **Polystichum aculeatum* (L.) Roth (#*P. lobatum* (Huds.) Bast.; #*Polypodium aculeatum* L.; *P. lobatum* Huds.) – **Многорядник шиповатый.**

Мн., споры VII-VIII. Среди скал, в верхнем горном поясе, редко.

18. **Polystichum lonchitis* (L.) Roth – **Многорядник копьевидный.**

Мн., споры VII-VIII. Буковые леса, в верхнем горном поясе, яйла, изредка.

Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh – Ужовниковые

19. **Botrychium lunaria* (L.) Sw. – **Гроздовник полулунный.**

Мн., споры VII-IX. На луговинах на яйле, на полянах по склонам гор, весьма редко. ЧКУ.

20. **Ophioglossum vulgatum* L. (#*O. mironovii* Sumn.) – **Ужовник обыкновенный.**

Мн., споры VII-IX. В лесах и на влажных полянах, по всей территории, изредка.

Polypodiaceae Bercht. & Presl. – Многоножковые

21. *#*Polypodium australe* Fee. (#*P. cambricum* auct.; #*P. cambricum* ssp. *australe* (Fee) Greuter & Burdet; #*P. serratum* (Willd.) Saut. 1882, non Aubl. 1775; #*P. vulgare* ssp. *ser-rulatum* Arcang.) – **Многоножка южная.**

Мн., споры IX-III. Дно балки г. Черная, очень редко (Г.П. 14).

22. **Polypodium vulgare* L. (#*P. nipponicum* auct.; #*P. someyae* auct.; #*P. vulgare* ssp. *issaevii* Askerov & A. Bobrov) – **Многоножка обыкновенная.**

Мн., споры VI-VIII. По всей территории, изредка.

Thelypteridaceae Pichi Sermolli – Телиптерисовые

23. **Thelypteris palustris* Schott (#*Dryopteris thelypteris* (L.) A. Gray; #*Lastrea thelypteris* (L.) Bory; #*Nephrodium thelypteroides* Michx.; #*Th. thelypteroides* ssp. *glabra* Holub; #*Polypodium palustre* Salisb. nom. illeg.) – **Телиптерис болотный.**

Мн., споры VII-VIII. На болотцах, в буковом лесу (кв. 228), очень редко.

ОТД. PINOPHYTA (=GYMNOSPERMAE)

Cupressaceae Bartl. – Кипарисовые

24. *Juniperus excelsa* M.Bieb. (*J. isophyllos* auct. non K.Koch) – **Можжевельник высокий.**

Дер., цв. IV. В районе центральной котловины, единично (Л.С. 6). ЧКУ.

25. **Juniperus foetidissima* Willd. – **Можжевельник вонючий.**

Дер., цв. IV. По южному склону г. Черная, хр. Инжер-Сырт, Синабдаг, разреженно среди смешанного леса. ЧКУ.

26. **Juniperus hemisphaerica* C.Presl. (*J. communis* L. ssp. *hemisphaerica* (C.Presl) Numan; *J. depressa* Steven 1857, non Raf. 1818; *J. klokovii* Kondr., nom. inval.; *J. rugmaea* auct. non K.Koch) – **Можжевельник полусферовидный.**

Куст., цв. VI. По верхней границе леса, на яйле, изредка.

27. **Juniperus oxycedrus* L. (*J. marschalliana* Steven; #*J. oxycedrus* ssp. *rufescens* Deb.; #*J. rufescens* Link nom. illeg.) – **Можжевельник колючий.**

Дер., цв. V. В сосновых лесах южного макросклона, на яйле, редко.

28. **Juniperus sabina* L. – Можжевельник казацкий.

Куст., цв. V. По верхней границе леса и по сухим склонам, образует стелющиеся заросли с можжевельником полусферическим.

Pinaceae Lindl. – Сосновые

29. *Pinus kochiana* Klotzsch ex К. Koch (*P. hamata* (Steven) Sosn. 1925 non Roetzl 1857; *P. sosnovskyi* Nakai; #*P. sylvestris* ssp. *hamata* (Stev.) Fomin, #*P. sylvestris* ssp. *kochiana* (Klotzsch ex С. Koch) Elicin). – Сосна Коха.

Дер., цв. V-VI. В верхнем поясе, на яйлах.

30. **Pinus pallasiana* D. Don. (*Pinus nigra* J.F. Arnold ssp. *pallasiana* (D. Don) Holmboe) – Сосна крымская или Палласова.

Дер., цв. V. По южному склону главной гряды. Лесообразующая порода.

31. **Pinus sylvestris* L. (*P. fominii* Kondr.; #*P. krylovii* Serg. & Kondr.; *P. zerovii* Kondr.) – Сосна обыкновенная.

Дер., цв. V. По всей территории, лесообразующая порода.

Taxaceae S.F. Gray – Тиссовые

32. **Taxus baccata* L. – Тисс ягодный.

Дер., куст., цв. IV-V. Среди скал на яйле, под пологом букового леса, по балкам, единично. Исчезающий вид. ЧКУ.

ОТД. MAGNOLIOPHYTA

КЛАСС LILIOPSIDA (=MONOCOTYLEDONAE)

Alismataceae Vent. (Elismataceae Nakai) – Частуховые

33. **Alisma plantago-aquatica* L. – Частуха подорожниковая.

Мн., цв. VI-IX. По берегам водоемов, очень редко.

Alliaceae I. Agardh – Луковые

34. *Allium cyrillii* Ten. (*A. auctum* Omelcz.) – Лук Кирилла.

Мн., цв. V-VI. В дубовых и смешанных лесах, среди кустарников, обычно.

35. **Allium decipiens* Fisch. ex Schult. Schult. f. (#*A. auctum* Omelcz. p.p. excl. typo) – Лук обманчивый.

Мн., цв. VI. Дубовые леса и на лужайках, хр. Инжер-Сырт, долина Альмы, редко (Г.П. 125; Л.П. 163).

36. *Allium firmotunicatum* Fomin (*A. atrovioleaceum* auct. non Boiss.) – Лук прочнодетый.

Мн., цв. VI-VIII. На яйле (Л.С. 54).

37. **Allium marschalianum* Vved. (~*Allium saxatile* auct. non M. Bieb.) – Лук Маршалла.

Мн., цв. VII-VIII. На остепненных полях и каменистых склонах, по всей территории.

38. **Allium paczoskianum* Tuzs. (#*A. flavum* ssp. *tauricum* (Besser ex Rchb.) Stearn; #*A. flavum* subssp. *tauricum* (Rchb.) K. Richt.; *A. flavum* var. *tauricum* Besser ex Rchb.; *A. pulchellum* auct. non G. Don. f.; *A. tauricum* (Besser ex Rchb.) Bordz.) – Лук Пачоского.

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, не часто. ЧКУ.

39. **Allium paniculatum* L. – Лук метельчатый.

Мн., цв. VII-VIII. Под пологом леса, на полях, изредка.

40. **Allium rotundum* L. (*A. scorodoprasum* L. ssp. *rotundum* (L.) Stearn) – Лук круглый.

Мн., цв. V-VII. На луговинах яйлы, опушках, очень обычно. ЧКУ.

41. *Allium rupestre* Steven (*A. paniculatum* L. ssp. *rupestre* (Steven) K.Richt.) – Лук скальный.

Мн., цв. VI-IX. На каменистых склонах, в верхней зоне и на яйле, обычно.

42. *Allium victorialis* L. – Лук победный.

Мн., цв. VI-VII. Сосновое редколесье, район уроч. Красный камень, локально.

43. **Nectaroscordum bulgaricum* Janka (*N. dioscoridis* auct. non (Sm.) Stank., *N. meliophilum* Juz., *N. siculum* (Ucria) Lindl. ssp. *bulgaricum* (Janka) Stearn; #*N. dioscoridis* f. *meliophilum* (Juz.) Zahar.; #*N. siculum* ssp. *dioscoridis* (J.G. Sm.) Bordz. p.p excl. typo; #*Allium bulgaricum* (Janka) Prodán; #*A. dioscoridis* auct.; *A. meliophilum* Juz.) – Нектароскордий болгарский. Мн., цв. VI. Дубово-ясеневый лес, хр. Конек, г. Черная, редко. ЧКУ, IUCN, ERL.

Amaryllidaceae Jaume – Амариллисовые

44. **Galanthus plicatus* M.Bieb. (*G. latifolius* Salisb.) – Подсежник складчатый. Мн., цв. II-IV. В лесах, среди кустарников, по всей территории, обычно. ЧКУ, ERL, CITES.

45. *Leucojum aestivum* L. – Белоцветник летний. Мн., цв. IV-V. Сев.-вост. склон Бабуган-яйлы (Вульф, 1929). Подтверждающих сборов нет. ЧКУ.

Araceae Juss. – Ароидные

46. *Arum elongatum* Steven (*A. orientale* M.Bieb. var. *elongatum* (Steven) Boiss.) – Аронник удлиненный. Мн., цв. IV-VI. В лесах, среди кустарников, по всей территории, обычно.

47. **Arum orientale* M.Bieb. – Аронник восточный. Мн., цв. IV-VI. В лесах и на полянах, в нижней зоне, изредка. ЧКУ.

Asparagaceae Juss. – Спаржевые

48. **Asparagus officinalis* L. (*A. caspius* Schult. & Schult.f.; #*A. polyphyllus* Steven; #*A. setiformis* Krylov) – Спаржа лекарственная.

Мн., цв. V-VI. Каменистые южные склоны, остепненные поляны, изредка (Г.П. 135).

49. **Asparagus verticillatus* L. – Спаржа мутовчатая. Мн., цв. VI. Каменистые склоны, близ водопада Головкинского, редко (Г.П. 136).

Asphodelaceae Juss. – Асфоделиновые

50. **Anthericum ramosum* L. – Венечник ветвистый.

Мн., цв. VI-VIII. На щебнистых склонах, редко.

51. **Asphodeline lutea* (L.) Reichenb. – Асфоделина желтая.

Мн., цв. IV-V. На каменистых местах, в светлых лесах, обычно. ЧКУ.

52. **Asphodeline taurica* (Pall. ex M.Bieb.) Engl. (#*Asphodelus tauricus* Pall. ex Bieb.) – Асфоделина крымская.

Мн., цв. IV-V. Там же, где и предыдущий вид, встречается реже.

53. *Eremurus tauricus* Steven – Эремурус крымский.

Мн., цв. V-VI. На каменистых местах, обрывах, район Гурзуфского седла, очень редко (Л.С. 49, Вульф, 1930). ЧКУ, ERL.

54. **Eremurus thiodanthus* Juz. – Эремурус серноцветковый.

Мн., цв. V-VI. На полянах, в светлых лесах, южные склоны г. Черная и ее отроги, хр. Синаб–Даг, нередко. **ЧКУ, ERL.**

Convallariaceae Horan. - Ландышевые

55. **Convallaria majalis* L. (*C. latifolia* Mill.) – Ландыш майский.

Мн., цв. IV-VI. В лесах южного склона главной гряды – обычно, на северном – изредка.

56. **Polygonatum hirtum* (Bosc. ex Poir.) Pursh. (#*Convallaria hirta* Bosc ex Poir.; #*C. latifolia* Jacq. 1775, non Mill. 1768; *P. latifolium* (Jacq.) Desf.) – Купена волосистая.

Мн., цв. IV-V. Во влажных пойменных лесах, в нижней зоне, нередко.

57. *Polygonatum multiflorum* (L.) All. – Купена многоцветковая.

Мн., цв. V-VI. В широколиственных лесах верхнего пояса, изредка.

58. **Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce (#*Convallaria odorata* Mill; *P. officinale* All.) – Купена душистая.

Мн., цв. IV-V. В лесах, по всей территории, обычно.

59. **Polygonatum orientale* Desf. (*P. polyanthemum* (M.Bieb.) Link) – Купена восточная.

Мн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, по всей территории, обычно.

Cyperaceae Juss. – Осоковые

60. **Carex caryophylla* Latourr. (*C. praecox* Jack. 1778, non Schreb. 1771; *C. ruthenica* V.Krecz.; #*C. scabricuspis* V. Krecz.; *C. verna* Schaaix, non Lam.) – Осока гвоздичная.

Мн., цв. III-V. Сухие щебнистые лужайки по р. Альма (Г.П. 100).

61. **Carex cuspidata* Host (#*C. flacca* ssp. *cuspidata* (Host) Vicioso; #*C. flacca* ssp. *serrulata* (Biv.) Greuter; #*C. glauca* ssp. *serrulata* (Biv.) Arcang.; #*C. glauca* ssp. *serrulata* (Biv.) K. Richt.; #*C. serrulata* Biv.) – Осока заостренная.

Мн., цв. IV-V. В лесах и на полянах, обычно.

62. *Carex depauperata* Curtis ex With. – Осока обедненная.

Мн., цв. V. В лесах и на полянах, по всей территории, изредка. **ЧКУ.**

63. **Carex digitata* L. – Осока пальчатая.

Мн., цв. V-VII. В лесах, по всей территории, редко.

64. *Carex distans* L. – Осока расставленная.

Мн., цв. IV-V. На влажных полянах и на яйле, редко.

65. *Carex divisa* Huds. (#*C. coarcta* Boott; #*C. divisa* var. *coarcta* (Boott) T. Koyama) – Осока раздельная.

Мн., цв. IV-V. Вдоль речек и на полянах, редко.

66. **Carex divulsa* Stokes (#*Vignea divulsa* (Stokes) Rchb.) – Осока прерванная.

Мн., цв. V. В лесу и на луговинах яйлы, редко.

67. *Carex flava* L. (*C. flavella* V.V.Krecz.; #*C. nevadensis* ssp. *flavella* (V.I. Krecz.) Patzke & Podlech) – Осока желтая.

Мн., цв. V. На влажных лугах, очень редко (Л.С. 45; Вульф, 1929).

68. **Carex halleriana* Asso – Осока галлеровская.

Мн., цв. III-V. Каменистые склоны, довольно часто.

69. **Carex hirta* L. – осока волосистая.

Мн., цв. V. На влажных полянах, в поймах, изредка.

70. **Carex humilis* Leys. (#*C. buschiorum* V. Krecz.) – Осока низкая.

Мн., цв. IV-V. На сухих склонах и яйлах, обычно.

71. *Carex liparicarpos* Gaudin (*C. nitida* Host 1801, non Hoppe 1800) – **Осока блестящеплодная.**
Мн., цв. IV-V. На сухих склонах Бабугана, сбор В.Косых. ЧКУ.
72. **Carex melanostachya* M.Bieb. ex Willd. (*C. nutans* Host; #*C. ripariiformis* Litv.) – **Осока черноколосая.**
Мн., цв. III-IV. Среди лугов, на опушках, не часто (Г.П. 93).
73. **Carex michelii* Host – **Осока Микеля.**
Мн., цв. IV-VI. В лесах, на луговинах яйлы, обычно.
74. *Carex otrubae* Podp. (*C. compacta* sensu V.Krecz. non Lam.; *C. subvulpina* Senay; #*Vignea otrubae* (Podp.) Soják) – **Осока Отрубы.**
Мн., цв. IV. В светлых лесах, лугах, на яйле, обычно (Л.С. 41).
75. **Carex pallescens* L. (#*C. chalcodeta* V. Krecz.; #*C. pallescens* var. *chalcodeta* (V.Krecz.) O.Nilsson) – **Осока бледноватая.**
Мн., цв. V-VI. На влажных полянах, по берегам лесных болотцев и на яйле, изредка.
76. **Carex pendula* Huds. – **Осока висячая.**
Мн., цв. IV-V. В буковых лесах и у ручьев, часто (Г.П. 95).
77. **Carex pseudocyperus* L. – **Осока ложно-сыть.**
Мн., цв. VI. На влажных полянах, в верхнем поясе, изредка.
78. **Carex remota* L. – **Осока раздвинутая.**
Мн., цв. V-VI. У лесных болотцев, на влажных полянах, изредка.
79. **Carex spicata* Huds. (*C. contigua* Hoppe; *C. limmitzeri* Host; *C. pairaei* F.Scultz ssp. *limmitzeri* (Rouy) Soð) – **Осока соседняя.**
Мн., цв. IV. На лесных полянах, в светлых лесах, изредка.
80. **Carex sylvatica* Huds. – **Осока лесная.**
Мн., цв. III-IV. В тенистых лесах, у болотцев, район Алабача, изредка.
81. **Carex tomentosa* L. – **Осока шерстистая.**
Мн., цв. IV-V. На сухих склонах, в лесах и на яйле, обычно.
82. *Carex transsilvanica* Schur (*C. depressa* auct. non Link; *C. depressa* Link ssp. *transsilvanica* (Schur) K.Richt.; #*C. euxina* (Woronow & Marc.) V.Krecz.) – **Осока трансильванская.**
Мн., цв. V. На лесных полянах, очень редко (Л.С. 43).
83. **Carex vesicaria* L. (*C. inflata* Huds.) – **Осока пузырчатая.**
Мн., цв. V-VI. На влажных полянах, у болотцев, редко
84. *Carex vulpina* L. (*C. compacta* Lam.) – **Осока лисья.**
Мн., цв. IV-V. На влажных полянах, изредка.
85. **Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult. (*E. crassa* Fisch. & C.A.Mey. ex Zinserl.; #*E. crassa* Zinserl. 1935 sensu p.p.; #*E. ecarinata* Zinserl.; *E. eupalustis* Lindb.f.; #*E. globularis* Zinserl.; *E. intersita* Zinserl.; #*E. kasakstanica* Zinserl.; *E. levinae* Zoz; *E. mammi-lata* auct. non Lindb.f.; *E. oxystachys* Sakalo; #*E. palustris* ssp. *globularis* (Zinserl.) Egor.; #*E. palustris* var. *globularis* (Zinserl.) A.E.Kozhevnikov; #*E. palustris* ssp. *microcarpa* Walters; *Heleocharis palustris* (L.) R.Br.; #*Scirpus palustris* L.) – **Болотница болотная.**
Мн., цв. V-VII. Влажные места по берегам рек, у болотцев (Г.П. 85)
86. **Scirpus lacustris* L. (#*Hymenochoeta lacustris* (L.) Nakai; *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla) – **Камыш озерный.**
Мн., цв. V-VI. Сплошными зарослями по берегам лесных болотцев, редко (Г.П. 84).

Dioscoreaceae R.Br. – Диоскорейные

87. *Tamus communis* L. – **Тамус обыкновенный.**

Мн., цв. IV-VI. В буковых лесах нижней зоны, редко.

Hyacinthaceae Batsch. - Гиацинтовые

88. *Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow (#*Hyacinthus sarmaticus* Pall. ex Georgi) – Бельвалия сарматская.

Мн., цв. V-VIII. Гора Чучель (Л.С. 58; Вульф, 1930).

89. **Leopoldia comosa* (L.) Parl. (*L. tubiflora* (Steven) Juz., *Muscari comosum* (L.) Mill.) – Леопольдия хохолковая.

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах и луговинах, изредка.

90. **Muscari neglectum* Guss. ex Ten. (*M. dolioliforme* Sobko; *M. racemosum* (L.) Mill. ex DC. 1805 nom. ambig.; non Mill. 1768) – Мышиный гиацинт незамеченный.

Мн., цв. IV-V. По всей территории, изредка.

91. **Ornithogalum fimbriatum* Willd. – Птицемлечник бахромчатый.

Мн., цв. IV-V. На сухих полянах, травянистых склонах, светлых лесах, в нижнем поясе, обычно.

92. *Ornithogalum flavescens* Lam. (#*O. melancholicum* Klokov ex Krasnova; *O. pyrenaicum* ssp. *flavescens* (Lam.) K. Richt.) – Птицемлечник желтоватый.

Мн., цв. VI-VII. Юго-восточный лугово-степной склон г. Черная, редко.

93. *Ornithogalum kochii* Parl. (*O. gussonei* Ten.; #*O. gussonei* ssp. *kochii* (Parl.) Holub; #*O. orthophyllum* ssp. *kochii* (Parl.) Maire & Weiller; *O. orthophyllum* Ten. ssp. *kochii* (Parl.) Zahar.; *O. tenuifolium* Guss.) – Птицемлечник Коха.

Мн., цв. IV-V. На Бабугане, сбор В. Косых (1980).

94. **Ornithogalum ponticum* Zahar. (#*O. georgicum* Агарова; #*O. ponticum* ssp. *cyclogynum* Zahar.; *O. pyrenaicum* auct. non L.) – Птицемлечник понтийский.

Мн., цв. VI-VII. На травянистых склонах, в светлых лесах, редко.

95. **Ornithogalum woronowii* Krasch. – Птицемлечник Воронова.

Мн., цв. IV-V. В пойменных лесах, на влажных полянах, довольно обычно.

96. **Scilla autumnalis* L. (*S. scythica* Клеоров) – Пролеска осенняя.

Мн., цв. VIII-IX. На поляне под Чатыр-Дагом.

97. **Scilla bifolia* L. (#*S. bifolia* ssp. *nivalis* (Boiss.) Domin, comb. superfl.; #*S. bifolia* ssp. *nivalis* (Boiss.) K. Richt.; #*S. bifolia* var. *taurica* Regel; *S. nivalis* auct. non Boiss.; *S. taurica* (Regel) Fuss) – Пролеска двулистная.

Мн., цв. III-IV. В лесах, на полянах, обычно.

98. *Scilla siberica* Haw. (*S. cernua* Delar.; #*S. mordakiae* Speta; *S. sibirica* Haw., ortho) – Пролеска сибирская.

Мн., цв. III-IV. На Никитской яйле, редко (Л.П. 166).

Iridaceae Juss. – Касатиковые

99. *Crocus angustifolius* Weston (*C. susianus* Ker.-Gavl.) – Шафран узколистный.

Мн., цв. III-IV. На сухих шиферных склонах, район Аспорта, Светлой поляны, изредка. ЧКУ, IUCN.

100. **Crocus speciosus* M.Vieb. – Шафран прекрасный.

Мн., цв. IX-X. На луговых склонах, полянах, яйле, обычно. ЧКУ.

101. *Crocus tauricus* (Trautv.) Puring – Шафран крымский.

Мн., цв. II-IV. На травянистых склонах, полянах, особенно на яйле, обычно. ЧКУ.

102. **Gladiolus imbricatus* L. (#*G. apterus* Klokov) – Шпажник черепитчатый.

Мн., цв. V-VI. На каменистом склоне г. Черная, сбор Н. Троицкого (1929), на луговинах в Савитских садах, в долине Сафу-Узень. ЧКУ.

Juncaceae Juss. – Ситниковые

103. **Juncus articulatus* L. (*J. geniculatus* Schrank; *J. lamprocarpus* Ehrh. ex Hoffm.; *J. macrocephalus* Viv.; *J. obtusiflorus* Moench, nom. illeg.; #*J. subarticulatus* Zak. & Novopokr.) – **Ситник членистый.**

Мн., цв. VI-VII. На влажных полях, по берегам водоемов, изредка.

104. **Juncus compressus* Jacq. (#*J. compressus* var. *subcompressus* (Zak. et Novopokr.) V. Novik.; *J. subcompressus* Zarikov & Novopokr.) – **Ситник сплюснутый.**

Мн., цв. V-VI. По берегам рек, водоемов, по всей территории, изредка.

105. **Juncus effusus* L. – **Ситник развесистый.**

Мн., цв. V-VII. На влажных полях, в поймах, у источников, по всей территории, изредка.

106. **Juncus inflexus* L. (*J. glaucus* Ehrh.; *J. paniculatus* Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch) – **Ситник склоненный.**

Мн., цв. V-VII. По берегам болотцев, ручьев, нередко.

107. **Luzula campestris* (L.) DC. (#*Juncus campestris* L.; *L. subpilosa* Gilib.) – **Ожика луговая.**

Мн., цв. V-VI. В лесах, на луговинах яйлы, обычно.

108. **Luzula forsteri* (Smith) DC. – **Ожика Форстера.**

Мн., цв. III-IV. Светлые лиственные леса, обычно.

Lemnaceae S.F.Gray – Рясковые

109. **Lemna minor* L. – **Ряска малая.**

Мн. В водоемах, болотцах, речных заводях, обычно.

110. *Lemna trisulca* L. – **Ряска тройчатая.**

Мн. Озеро на сев. склоне г. Чучель – сбор Юнге (1907) (Вульф, 1929); пересыхающее оз. у корд. Рынковских.

Liliaceae Juss. – Лилейные

111. #*Fritillaria ophioglossifolia* Freyn. & Sint. (#*F. biebersteiniana* Charkev.; #*F. lagodechiana* Kharkev.; #*F. lutea* 1M. Bieb. 808 non Mill. 1768;) – **Рябчик узовниколистный.**

Мн., цв. IV-V. Сосновое редколесье, уроч. Красный камень, единично.

112. *Gagea callieri* Pascher – **Гусиный лук Каллье.**

Мн., цв. II-III. На щербистых сухих склонах, изредка. **ERL.**

113. *Gagea dubia* Terr. (*G. littoralis* Artemcz.) – **Гусиный лук сомнительный.**

Мн., цв. III-IV. По луговым склонам на Бабугане и Чатыр-Даге (Л.П. 151).

114. *Gagea fistulosa* Ker-Gawl. (#*Ornithogalum fistulosum* Ramond ex DC., nom. illeg. superfl.) – **Гусиный лук дудчатый.**

Мн., цв. V. На луговинах яйлы, редко.

115. **Gagea germanae* Grossh. – **Гусиный лук Жермены.**

Мн., цв. III-IV. В светлых лесах, на полях в верхней зоне, нередко.

116. **Gagea granatellii* (Parl.) Parl. (#*G. arvensis* ssp. *granatellii* (Parl.) Asch. & Graebn., comb. superfl.; #*G. arvensis* ssp. *granatellii* (Parl.) K. Richt. #*Ornithogalum granatelli* Parl.) – **Гусиный лук Гранателли.**

Мн., цв. II-III. Яйла, редко (Г.П. 119).

117. **Gagea lutea* (L.) Ker-Gawl. – **Гусиный лук желтый.**

Мн., цв. III-V. В поймах, на склонах яйл, в светлых лесах, довольно обычно.

118. **Gagea minima* (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук малый.

Мн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, изредка.

119. *Gagea transversalis* Steven – Гусиный лук поперечный.

Мн., цв. III-IV. На сев.-вост. склоне г. Малая Чучель, изредка.

120. *Gagea villosa* (M.Bieb.) Duby (*G. arvensis* (Pers.) Dumort; # *Ornithogalum arvense* Pers.; #*O. villosum* M.Bieb.) – Гусиный лук вильчатый.

Мн., цв. III-IV. Сухой склон, район Ольховой поляны, изредка.

121. ! *Lilium monodelphum* M.Bieb. (#*L. georgicum* Manden.) – Лилия однобратственная.

Мн., цв. VI. На лесных полянах и опушках, ниже ур. Красный Камень. Вероятно заносной (Опр. Кр).

Melanthiaceae Batsch (=Colchicaceae DC.) – Мелантиевые

122. **Colchicum umbrosum* Steven – Безвременник теневой.

Мн., цв. VIII-IX. На лесных полянах, в светлых лесах, обычно. ЧКУ.

Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые

123. **Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. (*Orchis pyramidalis* L.) – Анакамптис пирамидальный.

Мн., цв. V-VII. В лесах, на полянах, по всей территории, нередко. ЧКУ, CITES.

124. **Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce (*C. grandiflora* S.F.Gray; #*C. latifolia* Janch.; *C. lonchophyllum* (L.f) Rchb.f.; #*Serapias damasonium* Mill.; #*S. grandiflora* L.; #*S. lonchophyllum* L. f.) – Пыльцеголовник крупноцветковый.

Мн., цв. V-VI. В лесах, по всей территории, нередко. ЧКУ, CITES.

125. **Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch (*C. ensifolia* (Sw.) Rich.) – Пыльцеголовник длиннолистный.

Мн., цв. V-VI. В лесах и на опушках, довольно часто. ЧКУ, CITES.

126. **Cephalanthera rubra* (L.) Rich. (^*Serapias rubra* L.) – Пыльцеголовник красный.

Мн., цв. VI-VII. В лесах, по всей территории, обычно. ЧКУ, CITES.

127. **Coeloglossum viride* (L.) C.Hartm. (#*C. bracteatum* (Willd.) Schltr.; #*C. viride* ssp. *bracteatum* (Willd.) Hulten, comb. superfl.; #*C. viride* ssp. *bracteatum* (Willd.) K. Richt.; #*C. viride* ssp. *bracteatum* (Willd.) Soó, comb. superfl.; *Dactylorhiza viridis* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, *Satyrium viride* L.) – Пололепестник зеленый.

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, изредка. ЧКУ, CITES.

128. **Corallorhiza trifida* Châtel. (*C. neottia* Scop., *C. innata* R.Br., *Ophrys corallorhiza* L.) – Ладьян трехнадрезанный.

Мн., цв. VI. В тенистых лесах, изредка. ЧКУ, CITES.

129. **Cypripedium calceolus* L. – Башмачок настоящий.

Мн., цв. VI. В буковых и смешанных лесах, очень редко. ЧКУ, CITES, ВК.

130. *Dactylorhiza iberica* (M.Bieb. ex Willd.) Soó (*Dactylorhiza iberica* (M.Bieb. ex Willd.) Vermeulen; #*Orchis angustifolia* M.Bieb.; *O. iberica* M. Bieb. ex Willd.) – Пальчатокоренник иберийский.

Мн., цв. V-VII. На влажных полянах, в буковых лесах, довольно редко. ЧКУ, CITES.

131. *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó (^*D. cruenta* (O.F.Mull.) Soó; ^*D. ochroleuca* (Boll) Holub; #*D. strictifolia* (Opiz) Rauschert; *Dactylorhiza incarnata* (L.) Vermeulen; *Orchis incarnata* L.; #*O. latifolia* sensu Nevski p.p.; ^*O. latifolia* L., nom. rej. #*Orchis strictifolia* Opiz) – Пальчатокоренник мясо-красный.

Мн., цв. V. На влажных лугах, у подножия гор Большая и Малая Чучель (Вульф, 1930); корд. Буковский. **ЧКУ, CITES.**

132. **Dactylorhiza romana* (Seb. & Mauri) Soó (*D. sambucina* (L.) Soó ssp. *romana* (Sebast.) Bornm., *D. sulphurea* (Link) Franco ssp. *pseudosambucina* (Ten.) Franco, *Dactylorhiza romana* (Sebast.) Vermeulen; *Orchis pseudosambucina* Ten., *O. romana* Sebast.) – **Пальчатокоренник римский.**

Мн., цв. IV-V. В сосновых и лиственных лесах, довольно обычно. **ЧКУ, CITES.**

133. **Epipactis helleborine* (L.) Crantz (*E. latifolia* (L.) All.; #*Serapias helleborine* L.; *S. helleborine* var. *latifolia* L.) – **Дремлик морозниковый.**

Мн., цв. VII-VIII. В лесах, по всей территории, довольно обычно. **ЧКУ, CITES.**

134. **Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. (*Serapias microphylla* Ehrh.) – **Дремлик мелкоцветковый.**

Мн., цв. VII. В лесах, по всей территории, редко. **ЧКУ, CITES.**

135. **Epipogium aphyllum* Sw. (*Epipogon aphyllum* Čelak.; #*Orchis aphylla* F.W. Schmidt, 1797 non Forrsk. 1775) – **Надбородник безлиственный.**

Мн., цв. VII- VIII. В буковом лесу, у р. Кача (Г.П. 166). **ЧКУ, CITES.**

136. **Goodyera repens* (L.) R.Br. (*Satyrium repens* L.) – **Гудайера ползучая.**

Мн., цв. VII- VIII. В сосновых и смешанных лесах, изредка. **ЧКУ, CITES.**

137. **Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. (*Orchis conopsea* L.; incl. *G. alpina* (Turcz. ex Rchb.f.) Czer., *G. conopsea* (L.) R.Br. ssp. *alpina* (Turcz. ex Rchb.f.) Janchen ex Soó) – **Кокушник комарниковый.**

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, не часто. **ЧКУ, CITES.**

138. **Himantoglossum caprinum* (M.Bieb.) K.Koch (*H. hircinum* (L.) W.D.J.Koch ssp. *caprinum* (M.Bieb.) K.Richt.; *H. caprinum* (M.Bieb.) Spreng., comb. illeg.; *Orchis caprina* M.Bieb.) – **Ремнелепестник козий.**

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, в светлых лесах, очень редко. **ЧКУ, ERL, CITES, BK.**

139. **Limodorum abortivum* (L.) Sw. (*Orchis abortiva* L.) – **Лимодорум недоразвитый.**

Мн., цв. V-VI. В светлых лесах, довольно редко. **ЧКУ, CITES.**

140. **Listera ovata* (L.) R.Br. (*Ophrys ovata* L., *Neottia latifolia* Rich.) – **Тайник яйцевидный.**

Мн., цв. VI-VII. По всей территории, нередко. **ЧКУ, CITES.**

141. **Neottia nidus-avis* (L.) Rich. (*Ophrys nidus-avis* L., *Neottia vulgaris* Kolb.) – **Гнездовка настоящая.**

Мн., цв. VI-VII. В буковых лесах – обычно, в дубовых и пойменных лесах – нередко. **ЧКУ, CITES, BK.**

142. **Ophris oestrifera* M.Bieb. (incl. *O. cornuta* Steven, *O. oestrifera* M.Bieb. ssp. *cornuta* (Steven) Soó, *O. scolopax* Cav. ssp. *cornuta* (Steven) E.G.Camus, *O. scolopax* Cav. ssp. *oestrifera* (M.Bieb.) Soó) – **Офрис оводоносная.**

Мн., цв. III-V. Среди кустарников на каменистом склоне г. Черная, сборы Г.Поплавской (1925), Дзевановского (Г.П. 147; Вульф, 1930). **ЧКУ, IUCN.**

143. *Ophris taurica* (Agg.) Nevski (*O. aranifera* Huds. var. *taurica* Aggeenko, *O. sphogodes* Mill. ssp. *taurica* (Aggeenko) Soó, *O. mammosa* auct. non Desf.) – **Офрис крымская.**

Мн., цв. III-V. В разреженных лесах, на каменистых склонах, редко (Л.С. 72, YALT). **ЧКУ, CITES, BK.**

144. *Orchis coriophora* L. (*Anacamptis coriophora* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase s.l.; incl. *Orchis nervulosa* Sakalo, *Anacamptis coriophora* ssp. *nervulosa* (Sakalo) Mosyakin & Tymchenko) – **Ятрышник клопоносный.**

Мн., цв. V-VI. На влажных луговинах, очень редко (Л.С. 66, YALT). **ЧКУ, CITES.**

145. *Orchis laxiflora* Lam. (*Anacamptis laxiflora* (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) – **Ятрышник редкоцветковый.**

Мн., цв. V-VII. На сырых луговинах, изредка (Л.С. 65; Вульф, 1930; YALT). **ЧКУ, CITES.**

146. **Orchis mascula* (L.) L. (*Orchis morio* L. var. *masculus* L.) – **Ятрышник мужской.**

Мн., цв. V-VII. На лесных полянах, среди кустарников, довольно обычно. **ЧКУ, CITES.**

147. **Orchis militaris* L. – **Ятрышник шлемоносный.**

Мн., цв. IV-V. В дубовых лесах на южных склонах, изредка. **ЧКУ, CITES.**

148. *Orchis morio* L. (*Anacamptis morio* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) – **Ятрышник дремлик.**

Мн., цв. IV-V. На полянах, в буковых и дубовых лесах, луговинах, изредка. **ЧКУ, CITES.**

149. **Orchis pallens* L. – **Ятрышник бледный.**

Мн., цв. IV-V. На горных луговых полянах, в светлых дубовых лесах, редко. **ЧКУ, CITES.**

150. *Orchis palustris* Jacq. (*Anacamptis palustris* (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) – **Ятрышник болотный.**

Мн., цв. V. На влажных луговинах верхнего пояса, кроме яйлы, редко (сбор Л. Самсоновой, герб. КрПЗ). **ЧКУ, CITES.**

151. *Orchis picta* Loisel. (*Anacamptis picta* (Loisel.) R.M. Bateman; *O. morio* ssp. *picta* (Loisel.) K.Richt.) – **Ятрышник раскрашенный.**

Мн., цв. IV-V. В лиственных лесах, на луговинах яйлы и на пролянах, довольно обычно. **ЧКУ, CITES.**

152. *Orchis provincialis* Balb. – **Ятрышник прованский.**

Мн., цв. IV-V. Смешанный лес, район Горного озера (Ялтинское лесн-во), очень редко. **ЧКУ, CITES, ВК.**

153. **Orchis purpurea* Huds. (incl. *O. pontica* Fleischm. & Hand.-Mazz.) – **Ятрышник пурпурный.**

Мн., цв. IV-V. В смешанных и лиственных лесах, на полянах, довольно обычно. **ЧКУ, CITES.**

154. **Orchis simia* Lam. – **Ятрышник обезьяний.**

Мн., цв. IV-V. В дубовых лесах, на каменистых склонах, поросших кустарником, довольно обычно. **ЧКУ, CITES.**

155. **Orchis tridentata* Scop. (*Neotinea tridentata* (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (*O. variegata* All.)) – **Неотиния трехзубчатая.**

Мн., цв. IV-VI. На полянах в лиственных лесах, в нижнем поясе, не часто. **ЧКУ, CITES.**

156. **Platanthera chlorantha* (Cust.) Rehb. (*Orchis chlorantha* Cust.) – **Любка зеленоцветковая.**

Мн., цв. V-VI. В лесах и среди кустарников, по всей территории, обычно. **ЧКУ, CITES.**

157. **Steveniella satyrioides* (Steven) Schlechter (*Himantoglossum satyrioides* Spreng., *Orchis satyrioides* Steven, non L.) – **Стевениелла сатириовидная.**

Мн., цв. IV-V. В дубовых лесах и среди кустарников, на южных склонах, район Центральной котловины, Монастырская поляна, очень редко. **ЧКУ, СITES, ВК.**

158. *Trausteinera globosa* (L.) Rchb. (*Orchis globosa* L.) – **Траунштейнера шаровидная.** Мн., цв. V-VII. На луговинах Бабуган-яйлы, г. Малая Чучель (Л.С. 64, Вульф, 1930). **ЧКУ, СITES.**

Поaceae Barnhart (=Graminea Juss.) – Мятликовые, злаковые

159. *Achnatherum bromoides* (L.) Beauv. (#*Aristella bromoides* (L.) Bertol.; *Lasiagrostis bromoides* (L.) Nevski & Roshev.; #*Stipa bromoides* (L.) Doerfler) – **Чий костероовидный.**

Мн., цв. VI-VII. На сухих склонах (Л.С. 8; Вульф, 1951).

160. **Aegilops cylindrica* Host (#*A. cylindrica* ssp. *aristulata* Zhuk.; #*A. cylindrica* var. *aristulata* (Zhuk.) Tzvel.; #*A. cylindrica* ssp. *pauciaristata* (Eig) Chennav.; *Cylindropyrum cylindricum* (Host) A.Löve; #*Triticum cylindricum* (Host) Cesati) – **Эгилопс цилиндрический.**

Одн., цв. V-VI. Сухие склоны, район Горного озера, редко.

161. *Aegilops ovata* L. (#*A. neglecta* Req. ex Bertol.; *A. triaristata* auct. non Willd.; #*A. triaristata* ssp. *contorta* Zhuk.; #*A. triaristata* ssp. *intermixta* Zhuk.; #*Triticum neglectum* (Beretol.) Grueter; #*T. ovatum* (L.) Rasp.) – **Эгилопс яйцевидный, трехостный.**

Одн., цв. V-VI. Сухие склоны, поляны, изредка (Л.С. 6).

162. *Aegilops triuncialis* L. (#*A. triaristata* Willd.) – **Эгилопс трехдюймовый.**

Одн., цв. V-VI. Сухие склоны, район Горного озера, редко.

163. **Agropyron desertorum* (Fisch. ex Link) Schult. & Schult.f. (*A. cristatum* (L.) P.Beauv. ssp. *desertorum* (Fisch. ex Link) A.Löve) – **Житняк пустынный.**

Мн., цв. VI. Сухие склоны, в верхнем поясе гор, очень редко.

164. *Agropyron ponticum* Nevski (***A. cristatum* (L.) P.Beauv. ssp. *ponticum* (Nevski) Tzvelev; *A. pinifolium* auct. non Nevski) – **Житняк понтийский.**

Мн., цв. V-VI. Сухие склоны и луговины, обычно. **Энд.****

165. *Agrostis capillaris* L. (*A. stricta* Willd.; *A. tenuis* Sibth.; *A. vulgaris* With.) – **Полевица тонкая.**

Мн., цв. VI-VII. На луговинах, лесных полянах, изредка.

166. **Agrostis gigantea* Roth (*A. alba* auct. non L.; #*A. alba* ssp. *gigantea* (Roth) Jir.; #*A. diffusa* Host; *A. graniticola* Klokov; *A. praticola* Klokov; #*A. stolonifera* ssp. *gigantea* (Roth) Beldie; #*A. stolonifera* ssp. *gigantea* (Roth) Maire & Weiller; #*Cinna karataviensis* Pavl.) – **Полевица гигантская.**

Мн., цв. VI-VII. На луговинах и опушках, по всей территории, обычно.

167. *Agrostis stolonifera* L. (*A. alba* auct. non L.; #*A. alba* ssp. *stolonifera* (L.) Jir.; #*A. alba* ssp. *stolonizans* (Bess. ex Schult. & Schult. fil.) Lavr.; #*A. jacutica* Schischk.; *A. kar-sensis* Litv.; #*A. macrantha* Schischk.; #*A. palustris* Hudson; #*A. prorepens* (Koch) Golub.; *A. pseudoalba* Klokov; #*A. sibirica* Petr.; #*A. stolonifera* ssp. *palustris* (Huds.) Tzvel.; #*A. stolonifera* ssp. *stolonizans* (Bess. ex Schult. & Schult. fil.) Soó; #*A. stolonizans* Bess. ex Schult. & Schult. fil.; #*A. zerovii* Klokov) – **Полевица побегоносная.**

Мн., цв. VI-VII. Долина р. Альма, у дороги (кв. 58), изредка.

168. **Alopecurus aequalis* Sobol. (#*A. aequalis* ssp. *amurensis* (Kom.) Hult.; #*A. aequalis* ssp. *aristulatus* (Michx.) Tzvel.; #*A. amurensis* Kom.; #*A. aristulatus* Michaux; *A. fulvus* Smith; #*A. geniculatus* ssp. *fulvus* (Smith) C. Hartm.) – **Лисохвост равный.**

Одн., цв. VI-VIII. На мокрых лугах, по берегам водоемов, изредка.

169. *Alopecurus pratensis* L. (#*A. alpinus* beta *songaricus* Schrenk; #*A. laxiflorus* Ovcz.; #*A. seravschanicus* Ovcz.; #*A. songaricus* (Schrenk) V.Petrov) – **Лисохвост луговой.**

Мн., цв. V-VI. На луговинах яйлы, изредка.

170. **Alopecurus vaginatus* (Willd.) Pall. ex Kunth (#*A. brevifolius* Grossh., p.p. excl. typo; #*A. longifolius* Kolak.; *Polypogon vaginatus* Willd.) – **Лисохвост влагищный.**

Мн., цв. IV-V. На луговинах яйлы, очень обычен.

171. **Anisantha madritensis* (L.) Nevski (*Bromus madritensis* L.; *Zerna madritensis* S.F.Gray; #*Z. madritensis* (L.) Grossh., comb. superfl.) – **Неравноцветник (анизанта) мадридский.**

Одн., цв. IV-VI. На сухих полянах, в нижнем лесном поясе, изредка.

172. **Anisantha sterilis* (L.) Nevski (*Bromus sterilis* L.; *Zerna sterilis* (L.) Panz.) – **Неравноцветник стерильный.**

Одн., цв. IV-VI. У дорог, жилья, сорное, обычно. Адв.

173. **Anisantha tectorum* (L.) Nevski (*Bromus tectorum* L.; #*Zerna tectorum* (L.) Lindm.; *Z. tectorum* (L.) Panz.) – **Неравноцветник кровельный.**

Одн., цв. V-VI. В сухих лесах, среди кустарников, у жилья, сорное, обычно. Адв.

174. **Arrhenatherum elatius* (L.) J.Presl & C.Presl – **Райграс высокий.**

Мн., цв. VI-VII. На луговинах, в верхнем горном поясе, редко. (Г.П. 44).

175. **Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng (#*Amphilopsis ischaemum* (L.) Nash; *Antropogon ischaemum* L.; #*B. ischaemum* (L.) Henrard, comb. superfl.; #*B. ischaemum* (L.) Mansf., comb. superfl.; #*Dichanthium ischaemum* (L.) Roberty) – **Бородач кровоостанавливающий.**

Мн., цв. VII-VIII. На сухих полянах, у дорог, изредка.

176. **Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. (*Bromus pinnatus* L.) – **Коротконожка перистая.**

Мн., цв. VI-VIII. На луговинах яйлы, изредка.

177. *Brachypodium rupestre* (Host) Roem. & Schult. (*B. pinnatum* var. *rupestre* (Host) Reichenb.; *B. pinnatum* ssp. *rupestre* (Host) Schubl. & Martens; *B. pinnatum* ssp. *rupestre* (Host) Tzvel.) – **Коротконожка скальная.**

Мн., цв. V-VI. На сухих склонах, в верхем поясе, изредка.

178. **Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. (*Brevipodium sylvaticum* (Huds.) A.Löve & D.Löve) – **Коротконожка лесная.**

Мн., цв. VI-VIII. В лесах и на полянах, по всей территории, обычно.

179. **Briza elatior* Sibth. & Smith. (*B. australis* Prokud.; #*B. media* ssp. *elatior* (Sibth. & Smith) Rohlena) – **Трясушка высокая.**

Мн., цв. VI-VII. По всей территории, обычно.

180. **Bromopsis benekenii* (Lange) Holub (*B. ramosa* (Huds.) Holub ssp. *benekenii* (Lange) Tzvelev; *Bromus benekenii* (Lange) Trimen; #*B. ramosus* ssp. *benekenii* (Lange) Lindb. fil.; #*Zerna benekenii* (Lange) Lindm.; #*Z. ramosa* ssp. *benekenii* (Lange) Tzvel.) – **Кострец Бенекена.**

Мн., цв. VII-VIII. На полянах, яйлах, в лесах, обычно.

181. **Bromopsis heterophylla* (Klokov) Holub (*Bromopsis riparia* (Rehman) Holub ssp. *heterophylla* (Klokov) Tzvelev; ~ *Bromopsis cappadocica* (Boiss. & Balansa) Holub agrg.; #*Zerna cappadocica* (Boiss. & Bal.) Nevski, p.p. quoad pl.; #*Z. heterophylla* Klok.; #*Z. riparia* ssp. *heterophylla* (Klok.) Tzvel.) – **Кострец разнолиственный.**

Мн., цв. V-VI. На вершинах гор, яйлах, довольно обычно.

182. **Bromopsis inermis* (Leys.) Holub (*Bromus inermis* Leys.; #*B. littoreus* Georgi; #*B. pskemensis* Pavl.; *Zerna inermis* (Leys.) Lindm.) – **Кострец безостый.**

Мн., цв. VI-VII. На лугах, полянах, в лесах, обычно.

183. *Bromopsis riparia* (Rehman) Holub (*Bromus riparius* Rehman; #*Zerna riparia* (Rehm.) Nevski) – **Кострец береговой.**

Мн., цв. V-VII. На остепненных склонах, лесных полянах, обычно.

184. **Bromopsis x taurica* Sljussar. (#*B. glabrata* Klok.; *B. heterophylla* x *B. riparia* aggr.; #*B. riparia* (Rehman) Holub ssp. *fibrosa* (Hack.) Tzvel. p.p. excl. typo; #*Zerna fibrosa* (Hack.) Grossh. p.p.; #*Z. riparia* ssp. *fibrosa* (Hack.) Tzvel. p.p.) – **Кострец крымский.**

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах и осыпях, довольно обычно (Г.П. 64).

185. *Bromus arvensis* L. – **Костер полевой.**

Одн.-двул., цв. V-VII. Район Хыр-Алана, сорное, редко.

186. *Bromus commutatus* Schrad. (*B. racemosus* auct. non L.; *B. racemosus* ssp. *commutatus* (Schrud.) Maire & Weiller) – **Костер изменчивый.**

Одн.-двул., цв. VI-IX. Район Хыр-Алана, сорное, редко.

187. *Bromus hordeaceus* L. (*B. mollis* L.) – **Костер мягкий.**

Одн.-двул., цв. V-VII. На остепненных полянах, у дорог, изредка.

188. **Bromus japonicus* Thunb. (#*B. japonicus* ssp. *typicus* (Hack.) Penzes, nom. illeg.; #*B. japonicus* var. *typicus* Hack., nom. illeg.; *B. patulus* Mert. & W.D.J.Koch; *B. subsquarrosus* Borbás) – **Костер японский.**

Одн.-двул., цв. V-VI. По лесным полянам и горным склонам, обычно.

189. *Bromus squarrosus* L. (*B. megastachys* Borbás; *B. squarrosus* ssp. *typicus* Penzes, nom. illeg.) – **Костер растопыренный.**

Одн.-двул., цв. V-VI. Сухие склоны, район Горного озера, редко.

190. **Calamagrostis epigeios* (L.) Roth (*Arundo epigejos* L.; *C. gigantea* auct. non Roshev.; ~ *C. macrolepis* Litv.; #*C. lenkoranensis* Steud.) – **Вейник наземный.**

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, лесных полянах, по берегам озерец, изредка.

191. **Catabrosa aquatica* (L.) P.Beauv. – **Поручейница водяная.**

Мн., цв. V-IX. По берегам лесных болотцев, редко (Г.П. 49).

192. **Cleistogenes serotina* (L.) Keng (*Diplachne serotina* (L.) Link; *Kengia serotina* (L.) Pacher.) – **Змеевка поздняя.**

Мн., цв. VII-VIII. Южные остепненные каменистые склоны, изредка (Г.П. 46).

193. *Cynodon dactylon* (L.) Pers. – **Свиной, цинодон пальчатый.**

Мн., цв. VI-VIII. У жилищ, сорное, изредка.

194. *Cynosurus cristatus* L. – **Гребневик обыкновенный.**

Мн., цв. VI-VII. Уроч. Барлакош, поляна у родника, редко.

195. *Cynosurus echinatus* L. – **Гребневик шиповатый.**

Одн., цв. V-VI. Сухие склоны, район Горного озера, изредка.

196. **Dactylis glomerata* L. – **Ежа сборная.**

Мн., цв. VI-IX. В лесах, среди кустарников, на полянах, обычно.

197. **Dasyphyrum villosum* (L.) Vorb. (*Haynaldia villosa* (L.) Schur) – **Дазипирум лохматый.**

Одн., цв. V. Сорное у дороги (Г.П. 80).

198. *Echinochloa crusgalli* (L.) P.Beauv. (#*E. colonum* auct.; *E. occidentalis* (Wiegand) Rydb.s.str.) – **Ежовник обыкновенный.**

Одн., цв. VII-X. У жилищ, дорог, сорное, редко. Адв.

199. **Elymus caninus* (L.) L. (#*Elytrigia canina* (L.) Drob.; #*Gouardia canina* (L.) Husn.; #*Roegneria canina* (L.) Nevski; #*R. tuskaulensis* Vass.) – **Пырейник собачий**.
Мн., цв. VI-VII. Долина р. Альма, район Хыр-Алана, изредка.
200. *Elytrigia intermedia* (Host) Nevski (Agropyron *glaucum* (Desf. ex DC.) Roem. & Schult.; #*A. hispidum* Opiz; *A. intermedium* (Host) P.Beauv.; *A. rigidum* C.Presl; #*Elymus hispidus* (Opiz) Melderis) – **Пырей средний**.
Мн., цв. VI. По лесным опушкам, обнаженным склонам, обычно.
201. *Elytrigia nodosa* (Nevski) Nevski (Agropyron *nodosum* Nevski; *Elymus nodosus* (Nevski) Melderis; **Elytrigia caespitosa* ssp. *nodosa* (Nevski) Tzvel.; #*Lophopyrum nodosum* (Nevski) A.Löve; #*Triticum nodosum* Stev. ex Bieb.) – **Пырей узловатый**.
Мн., цв. VI. Никитская яйла, сбор В.Косых. Энд.**
202. **Elytrigia repens* (L.) Nevski (#Agropyron *caesium* J. & C.Presl; *A.repens* (L.) P.Beauv.; #*A. sachalinense* Honda; #*Elymus repens* (L.) Gould) – **Пырей ползучий**.
Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, луговинах яйлы, среди кустарников, сорное, обычно.
203. *Elytrigia scythica* (Nevski) Nevski (Agropyron *scythicum* Nevski; #*Elymus bungeanus* ssp. *scythicus* (Nevski) Melderis; #*Elytrigia geniculata* ssp. *scythica* (Nevski) Tzvel.; #*Pseudoroegneria geniculata* ssp. *scythica* (Nevski) A.Löve) – **Пырей скифский**.
Мн., цв. VI. На каменистых склонах и осыпях, редко.
204. **Elytrigia strigosa* (M.Bieb.) Nevski (Agropyron *strigosum* (M.Bieb.) Boiss; #*Elymus reflexiaristatus* ssp. *strigosus* (Bieb.) Melderis; #*Pseudoroegneria strigosa* (Bieb.) A.Löve) – **Пырей щетинистый**.
Мн., цв. VI. На каменистых склонах, яйлах, обычно. Энд.
205. **Elytrigia trichophora* (Link) Nevski (#Agropyron *barbulatum* Schur.; #*A. elongatum* ssp. *ruthenicum* (Griseb.) Anghel & Morariu; #*A. glaucum* ssp. *barbulatum* (Schur) K. Richt.; #*A. intermedium* ssp. *trichophorum* (Link) Reichenb. ex Hegi; #*A. intermedium* ssp. *trichophorum* (Link) Volkart; #*A. ruthenicum* (Griseb.) Prokud.; *A. trichophorum* (Link) K. Richt.; #*A. truncatum* ssp. *trichophorum* (Link) Soó; #*Elymus hispidus* ssp. *barbulatus* (Schur) Melderis; *Elytrigia aucheri* (Boiss.) Nevski; #*E. intermedia* ssp. *barbulata* (Schur) A.Löve; #*E. intermedia* ssp. *barbulata* (Schur) Soják; *E. intermedia* ssp. *trichophora* (Link) A. & D.Löve; #*E. intermedia* (Host) Nevski ssp. *trichophora* (Link) Nevski; #*E. intermedia* ssp. *trichophora* (Link) Tzvel.; *E. ruthenica* (Griseb.) Prokud., p.p. quoad nomen; *Triticum rigidum* beta *ruthenicum* Griseb.) – **Пырей волосоносный**.
Мн., цв. VI. На остепненных склонах, среди кустарников, изредка.
206. **Festuca gigantea* (L.) Vill. (#*F. bonassorum* Bornm.; #*F. pseudogigantea* Ovcz. & Schibk.) – **Овсяница гигантская**.
Мн., цв. VI-VIII. Преимущественно в буковых лесах, под пологом, изредка.
207. **Festuca pratensis* Huds. (*F. elatior* L. nom. utique rej.) – **Овсяница луговая**.
Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, луговинах яйлы, обычно.
208. *Festuca regeliana* Pavl. (*F. arundinacea* Schreb. ssp. *orientalis* (A.Kern. ex Hack.) Tzvelev; *F. orientalis* (A.Kern. ex Hack.) V.Krecz. & Bobrov 1934, non B.Fedtsch. 1915) – **Овсяница восточная**.
Мн., цв. V-VII. По влажным берегам рек, редко (Л.С. 29).
209. **Festuca rupicola* Heuff. (*F. sultata* (Hack.) Nyman; ~ *F. valesiaca* agrg.; #*F. valesiaca* Gaudin. ssp. *sulcata* (Hack.) Schinz. & R.Keller #*F. ganeschii* Drob.; #*F. hirsuta* Host; #*F. ovina* var. *hirsuta* Link; #*F. recognita* Reverd.; #*F. sulcata* (Hack.) Nym. p.p. nom. illeg.; #*F. valesiaca* ssp. *sulcata* (Hack.) Schinz & R. Keller; #*F. valesiaca* ssp. *vale-*

siaca var. *ganeschinii* (Drob) Tzvel.; #*F. valesiaca* ssp. *valesiaca* var. *hirsuta* (Link) E.Alexeev; #*F. valesiaca* var. *wagneri* auct. p.p) – **Овсяница бороздчатая.**

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, на яйле, обычно.

210. **Glyceria notata* Chevall. (*G. plicata* (Fries) Fries; #*G. turcomanica* Kom.) – **Манник складчатый.**

Мн., цв. V-VII. По берегам водоемов, долинам рек, изредка.

211. **Helictotrichon schellianum* (Hack.) Kitag. (*Avenastrum schellianum* (Hack.) Rochev; #*Avenochloa hookeri* ssp. *schelliana* (Hack.) Soják; *A. schelliana* (Hack.) Holub; #*Avenulla hookeri* ssp. *schelliana* (Hack.) Lomonosova; *A. schelliana* (Hack.) Holub; #*A. schelliana* (Hack.) Sauer & Chmelitschek; #*H. hookeri* (Scribn.) Henrard ssp. *schellianum* (Hack.) Kitag.) – **Овсец Шелля.**

Мн., цв. V-VII. На лесных полянах, в верхнем поясе, яйлах, обычно.

212. *Holcus lanatus* L. – **Бухарник шерстистый.**

Мн., цв. VII-VIII. На опушках, среди кустарников, район Горного озера, изредка.

213. *Hordelymus europaeus* (L.) Jessen ex C.O.Harz (*Cuviera europaea* (L.) Koeler) – **Хорделимус европейский.**

Мн., цв. VII-VIII. В поясе буковых лесов, изредка.

214. *Hordeum bulbosum* L. (#*Critesion bulbosum* (L.) A.Löve) – **Ячмень луковичный.**

Мн., цв. V-VI. На остепненных полянах, район Горного озера, изредка.

215. *Hordeum leporinum* Link. (#*Critesion murinum* (L.) A.Löve ssp. *leporinum* (Link) A.Löve; #*H. murinum* ssp. *leporinum* (Link) Arcangeli) – **Ячмень заячий.**

Одн., цв. V-VI. На сорных местах, у дорог, на горных склонах, обычно.

216. **Hordeum murinum* L. (#*Critesion murinum* (L.) A.Löve) – **Ячмень мышиный.**

Мн., цв. V-VI. У жилья, дорог, сорное, редко.

217. *Koeleria brevis* Steven (*K. degenii* Domin; *K. splendens* var. *degenii* (Domin) Stojan. & Stef.) – **Тонконог короткий.**

Мн., цв. IV-VII. Каменистые склоны г. Черная, г. Большая Чучель (Л.С. 21, Вульф, 1951).

218. **Koeleria cristata* (L.) Pers. (#*Aira cristata* L.; *K. gracilis* Pers., nom. illeg.; *K. macrantha* auct. non (Ledeb.) Schult.) – **Тонконог гребенчатый.**

Мн., цв. V-VII. Остепненные склоны, поляны, яйла, обычно.

219. **Koeleria lobata* (M.Bieb.) Roem. & Schult. (#*Dactylis lobata* Bieb.; #*K. callieri* (Domin) Ujhelyi; #*K. cristata* s. *robusta* Pacz. ex Schmalh.; #*K. robusta* (Pacz. ex Schmalh.) Janata; #*K. splendens* C. Presl; *K. splendens* var. *callieri* Domin; *K. theodoriana* Klokov, nom. inval.) – **Тонконог лопастный.**

Мн., цв. V-VIII. Каменистые склоны, луговины яйлы, обычно.

220. **Lolium multiflorum* Lam. (*L. italicum* A.Br.) – **Плевел мелкоцветковый.**

Одн.-двул., цв. VI-VII. Как сорное, у дорог, Центральная котловина (Г.П. 73). Адв.

221. *Lolium perenne* L. (*L. marschallii* Steven) – **Плевел многолетний.**

Мн., цв. VI-IX. На сухих южных склонах, у дорог, изредка.

222. **Melica monticola* Prokud. (*M. ciliata* L. ssp. *monticola* (Prokud.) Tzvelev; *M. taurica* ssp. *monticola* (Prokud.) Prokud.) – **Перловник горный.**

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах яйл, обычно.

223. **Melica nutans* L. – **Перловник понижающийся.**

Мн., цв. V-VI. В лесах и на полянах, обычно.

224. *Melica taurica* K.Koch (#*M. ciliata* ssp. *micrantha* (Boiss. & Hohen.) Soják; *M. ciliata* L. ssp. *taurica* (K.Koch) Tzvelev; #*M. micrantha* Boiss. & Hohen.; #*M. transsilvanica* ssp. *micrantha* (Boiss. & Hohen.) K.Richt.) – **Перловник крымский.**

Мн., цв. V-VI. На открытых луговинах, среди кустарников, изредка.

225. *Melica transsilvanica* Schur (*M. ciliata* L. ssp. *transsilvanica* (Schur) Čelak) – Перловник трансильванский.

Мн., цв. V-VII. На каменистых местах в лесу, на полянах, не часто.

226. **Millium effusum* L. – Бор развесистый.

Мн., цв. V-VII. В лесах, на полянах, обычно.

227. *Phleum montanum* К.Кoch (*Ph. phleoides* (L.) H.Karst. ssp. *montanum* (К.Кoch) Tzvelev) – Тимофеевка горная.

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах и скалах, обычно.

228. *Phleum paniculatum* Huds. (#*Ph. annuum* M.Bieb.; #*Ph. asperum* ssp. *annuum* (M.Bieb.) K.Richt.; #*Ph. asperum* var. *ciliatum* Boiss.; #*Ph. boissieri* auct.; #*Ph. paniculatum* ssp. *annuum* (M.Bieb.) Holub.; #*Ph. paniculatum* ssp. *ciliatum* (Boiss.) M.Dogan) – Тимофеевка метельчатая.

Мн., цв. V. На сухих каменистых склонах, изредка.

229. **Phleum phleoides* (L.) H.Karst. (#*Ph. boehmeri* Wib.; #*Ph. laeve* M.Bieb.) – Тимофеевка степная.

Мн., цв. VI-VIII. В лесу, на полянах и луговинах яйлы, обычно.

230. **Phleum pratense* L. (*Ph. nodosum* L.; *Ph. pratense* L. ssp. *nodosum* (L.) Arcang.) – Тимофеевка луговая.

Мн., цв. VI-VIII. На лесных опушках, среди кустарников, у дорог, обычно.

231. **Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (*Arundo australis* Cav.; *A. phragmites* L.; *P. communis* Trin.) – Тростник южный.

Мн., цв. VII-IX. По берегам болотцев, редко.

232. **Piptatherum holciforme* (M.Bieb.) Roem. & Schult. (*Oryzopsis holciformis* (M.Bieb.) Hack; #*O. kopetdagensis* Roshev.; #*P. karataviense* Roshev.) – Ломкоостник бухарниковидный.

Мн., цв. V-VI. На каменистых склонах, г. Черная, редко (Г.П. 35).

233. **Piptatherum virescens* (Trin.) Boiss. (*Oryzopsis virescens* (Trin.) G.Beck) – Ломкоостник зеленоватый.

Мн., цв. V-VI. В лесу, на полянах, в поймах, обычно.

234. *Poa angustifolia* L. (*P. pratensis* L. ssp. *angustifolia* (L.) Gaudin.; #*P. pratensis* ssp. *angustifolia* (L.) Arcang.; #*P. pratensis* ssp. *angustifolia* (L.) Lindb. fil.; #*P. setacea* Hoffm.; *P. strigosa* Hoffm.; *P. viridula* Palib.) – Мятлик узколистный.

Мн., цв. V-VII. В светлых лесах, на полянах, яйле, изредка.

235. *Poa annua* L. – Мятлик однолетний.

Одн.-двул., мн., цв. IV-X. На лугах, вдоль дорог, изредка.

236. *Poa biebersteinii* H.Pojark. (#*P. sterilis* ssp. *biebersteinii* (H. Pojark.) Tzvel.) – Мятлик Биберштейна.

Мн., цв. V-VII. Щебнистая отмель на берегу р. Альма, район Светлой поляны, редко, сбор Шабровской.

237. **Poa bulbosa* L. (#*P. bulbosa* ssp. *pseudoconcinna* (Schur) Jir.; #*P. pseudoconcinna* Schur) – Мятлик луковичный.

Мн., цв. IV-VI. Остепненные поляны, у дорог, обычно.

238. *Poa compressa* L. – Мятлик сплюснутый.

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, в верхнем поясе, обычно.

239. #*Poa crispa* Thuill. (#*P. bulbosa* L. ssp. *crispa* (Thuill.) Tzvelev; #*P. bulbosa* L. ssp. *vivipara* Rochev.; #*P. bulbosa* L. var. *vivipara* Koel.;) – Мятлик курчавый.

Мн., цв. IV-VI. Долины рек, у дорог, изредка.

- 240. **Poa fagetorum* P.Smirn.** (*P. longifolia* Trin. ssp. *fagetorum* (P.Smirn.) Tzvelev) – **Мятлик буковый.**
Мн., цв. VI-VII. На горных каменистых склонах, в разреженных лесах, обычно.
- 241. **Poa nemoralis* L.** – **Мятлик лесной.**
Мн., цв. V-VII. В лесах и на полянах, обычно.
- 242. **Poa pratensis* L.** (#*P. angustifolia* var. *angustiglumis* (Roshev.) Worosch.; #*P. angustiglumis* Roshev.; #*P. articulata* Ovcz.; #*P. garanica* Ikonn.; #*P. maydelii* Roshev.; #*P. pinegensis* Roshev.; #*P. pratensis* ssp. *angustiglumis* (Roshev.) Tzvel.; #*P. pratensis* var. *angustiglumis* (Roshev.) Bondar.; #*P. subglabriflora* Roshev.; #*P. urjanchaica* Roshev.) – **Мятлик луговой.**
Мн., цв. V-VII. На лугах и лесных полянах, обычно.
- 243. *Poa sterilis* M.Bieb.** (#*Festuca asperrima* Link) – **Мятлик бесплодный.**
Мн., цв. V-VII. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, обычно.
- 244. *Poa sylvicola* Guss.** (*P. trivialis* L. ssp. *sylvicola* (Guss.) Lindb.f.) – **Мятлик дубравный.**
Мн., цв. V-VII. В лесах, поймах рек, у дорог, обычно.
- 245. **Poa trivialis* L.** (#*P. stenantha* Trin.; #*P. stenantha* lusus *laxiflorum* auct.; #*P. trivialis* var. *woronowii* (Roshev.) Grossh.; #*P. woronowii* Roshev.) – **Мятлик обыкновенный.**
Мн., цв. V-VI. По берегам лесных болотцев, изредка (Г.П. 58).
- 246. *Polypogon viridis* (Gouan) Breist.** (*P. semiverticillatus* (Forssk.) Hyl.; #*A. semiverticillata* (Forssk.) C. Christ.; #*A. verticillata* Vill.; #*A. viridis* Gouan; #*Nowodworskya semiverticillata* (Forssk.) Nevski; #*N. verticillata* (Vill.) Nevski; *Phalaris semiverticillata* Forssk.) – **Многобородник зеленый.**
Мн., цв. V-VII. Долина р. Альма, у дороги, редко.
- 247. *Scleropoa rigida* (L.) Griseb.** (*Catapodium rigidum* (L.) Hubbard ex Dony; *Desmazeria rigida* (L.) Tutin ex Clapham) – **Жесткомятлик жесткий.**
Одн., цв. V. По сухим склонам, у дорог, редко (Л.С. 30).
- 248. *Setaria glauca* (L.) P.Beauv.** (*S. lutescens* (Weigel) F.T.Hubb.; *S. pumila* (Poir.) Roem. & Schult.) – **Щетинник сизый.**
Одн., цв. VI-IX. На сухих склонах, у дорог, сорное, изредка. Адв.
- 249. *Setaria viridis* (L.) P.Beauv.** (*S. purpurascens* Opiz.; *S. weinmannii* Roem. & Schult.) – **Щетинник зеленый.**
Мн., цв. VI-X. На сухих полянах и у жилья, изредка. Адв.
- 250. *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.** (*Danthonia decumbens* (L.) DC.) – **Зиглингя лежачая.**
Мн., цв. VI-VII. На луговинах яйлы, местами обильно.
- 251. *Stipa lithophila* P.Smirn.** (#*S. eriocalis* Borb. ssp. *lithophila* (P.Smirn.) Tzvelev; #*S. pennata* ssp. *lithophila* (P. Smirn.) Martinovsky) – **Ковыль камнелюбивый.**
Мн., цв. V-VI. На каменистых склонах, на яйлах, обычно. Энд. ЧКУ, IUCN, ERL.
- 252. *Stipa pulcherrima* К.Кoch** (*S. grafiana* Steven; #*S. pennata* ssp. *grafiana* (Stev.) K.Richt.; #*S. pennata* ssp. *pulcherrima* (C. Koch) A. & D.Love; #*S. pennata* ssp. *pulcherrima* (C. Koch) Freitag, comb. superfl.; #*S. pulcherrima* ssp. *grafiana* (Stev.) Pacz.) – **Ковыль красивейший.**
Мн., цв. V-VI. На опушках и каменистых склонах, изредка. ЧКУ.
- 253. *Stipa tirsia* Steven** (#*S. longifolia* Borbás, *S. stenophylla* (Czern. ex Lindem.) Trautv. #*S. cerariorum* Panc.; #*S. longifolia* Borb.; #*S. pennata* δ. *stenophylla* Lindem.; #*S. stenophylla* (Lindem.) Trautv.) – **Ковыль узколистный, тырса.**

Мн., цв. VI-VII. На горных луговинах и в нижней зоне, изредка. **ЧКУ.**

254. *Taeniatherum crinitum* (Simonk.) Nevski (#*Elymus caput-medusae* ssp. *crinitus* (Schreb.) Maire & Weiller; #*Hordelymus caput-medusae* ssp. *crinitum* (Scherb.) Pignatti; #*T. caput-medusae* ssp. *crinitum* (Schreb.) Melderis.; #*T. caput-medusae* var. *crinitum* (Schreber) C. J. Humphries) – **Лентоостник длинноволосый.**

Одн., цв. IV-V. На открытых каменистых склонах, изредка.

255. *Ventenata dubia* (Leers) Coss. (*Avena dubia* Leers) – **Вентената сомнительная.**

Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, изредка (Вульф, 1951).

Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые

256. **Potamogeton natans* L. (*P. morongii* A. Benn.) – **Рдест плавающий.**

Мн., цв. VI-VIII. Лесные болотца, редко.

Ruscaceae – Иглицевые

257. *Ruscus hypoglossum* L. – **Иглица подъязычная.**

Мн., цв. IV-V. В буковом лесу, район водопада Головкинского, очень редко. **ЧКУ.**

258. *Ruscus ponticus* Woronow ex Grossh. (*R. aculeatus* auct. non L.) – **Иглица понтийская.**

Мн., цв. II-IV. В дубовом лесу, район Горного озера, редко.

Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые

259. **Sparganium erectum* L. (*S. polyedrum* (Asch. & Graebn.) Juz.; *S. ramosum* Huds.; *S. ramosum* Huds. ssp. *polyedrum* Asch. & Graebn. #*S. erectum* ssp. *polyedrum* (Asch. & Graebn.) Schinz & Thell.) – **Ежеголовник прямой.**

Мн., цв. VI-VIII. По берегам водоемов и болотцев, изредка.

260. *Sparganium microcarpum* (Neum.) Raunk. #*S. erectum* ssp. *microcarpum* (K.G. Neumann) Domin; #*S. erectum* ssp. *microcarpum* (K.G. Neumann) Hyl.; #*S. ramosum* ssp. *microcarpum* (K.G. Neumann) Hyl.) – **Ежеголовник мелкоплодный.**

Мн., цв. VI-VIII. На берегу болотца у корд. Буковский, изредка.

Typhaceae Juss. – Рогозовые

261. *Typha angustifolia* L. (#*T. foveolata* Pobed.; *T. pontica* Klokov f. & A.Krasnova) – **Рогоз узколистный.**

Мн., цв. V-VII. Берег Горного озера (Ялтинское лесн-во).

262. **Typha latifolia* L. – **Рогоз широколистный.**

Мн., цв. VI-VII. По берегам р. Альма и лесных болотцев, редко.

Класс Magnoliopsida (=Dicotyledonae)

Aceraceae Juss. – Кленовые

263. **Acer campestre* L. – **Клен полевой.**

Дер., цв. IV-V. В дубовых и буковых лесах, среди кустарников, обычно.

264. **Acer stevenii* Pojark. (***A. hircanum* ssp. *stevenii* (Pojark.) E. Murray; *A. opalus* ssp. *stevenii* (Pojark.) E. Murray) – **Клен Стевена.**

Дер., цв. IV-V. В буковых, дубовых лесах средней и верхней зоны, обычно. **Энд.** ERL.**

Amaranthaceae Juss. – Щирицевые

265. *Amaranthus graecizans* L. – Цирица маскированная.

Одн., цв. VII-IX. Сорное в посевах и у жилья, район Горного озера, очень редко. Адв.

266. **Amaranthus retroflexus* L. – Цирица запрокинутая.

Одн., цв. VII-IX. Сорное в огородах и у жилья, в нижней зоне, обычно. Адв.

Anacardiaceae Lindl. – Сумаховые**267. **Cotinus coggygria* Scop. (*Rhus cotinus* L.) – Скумпия кожевенная.**

Куст., цв. V-VI. На сухих склонах и в светлых лесах, довольно обычно.

268. *Rhus coriaria* L. – Сумах дубильный.

Куст., цв. V-VI. В сосновых и смешанных лесах южного макросклона, на сухих склонах, обычно.

Apiaceae Lindl. (Umbeliferae Juss., Hydrocotylaceae Hyl.) – Зонтичные**269. *Aethusa cynapium* L. (#*A. cynapium* ssp. *agrestis* (Wallr.) Dostál; #*A. cynapium* ssp. *cynapioides* (M.Bieb.) Nyman; #*A. cynapium* ssp. *segetalis* (Boenn.) Schubl. & Martens) – Кокорыш обыкновенный.**

Одн.-двул., цв. VII. В пойме р. Альма, редко.

270. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. – Купырь лесной.

Двул., цв. VI-VII. В лесах, на полянах, яйле, обычно.

271. #*Astrantia maxima* Pall. (*Transcaucasia armenia* M. Hiroe) – Астранция наибольшая.

Мн., цв. VIII. В сосновом редколесье, в уроч. Красный камень, у границы с яйлой.

272. *Bunium ferrulaceum* Smith. (#*B. bourgaei* (Boiss.) Freyn & Sint., #*B. microcarpum* (Boiss.) Freyn. & Sint. ex Freyn.) – Буниум феруловый.

Мн., цв. VI-VII. На южных каменистых и скалистых склонах, редко (Г.П. 496).

273. *Vupleurum affine* Sadler – Володушка родственная.

Одн., цв. VI-VII. По сухим склонам, изредка.

274. *Vupleurum exaltatum* M.Bieb. (#*B. kotschyianum* Boiss.; #*B. linearifolium* auct.) – Володушка высокая.

Мн., цв. VI-VII. На щебнистых, каменистых горных склонах, полянах, яйле, обычно.

275. **Vupleurum falcatum* L. (*B. rossicum* (Coso-Pol.) Woronow) – Володушка серповидная.

Мн., цв. VI. На яйле, приайлинских южных склонах, изредка.

276. **Vupleurum gerardii* All. (*B. commutatum* Boiss. & Bal.) – Володушка Жерарда.

Одн., цв. VI-VII. На полянах и сухих склонах, редко.

277. *Vupleurum pauciradiatum* Fenzl ex Boiss. – Володушка малолучевая.

Одн., цв. V-VI. На сухом шиферном склоне (Л.С. 205).

278. **Vupleurum rotundifolium* L. – Володушка круглолистная.

Одн., цв. IV-VII. На полянах со степной растительностью, довольно часто (Г.П. 496).

279. **Vupleurum woronowii* Manden. (*B. baldense* Host.) – Володушка Воронова.

Двул.-мн., цв. VII-VIII. Каменистые склоны нижнего и верхнего поясов, яйлы, изредка.

280. *Carum carvi* L. (*C. carvi* var. *roseum* Trautv.; *C. rosellum* Woronow) – Тмин обыкновенный.

Одн.-двул., цв. VI. Собран однажды на поляне у турбазы.

281. **Caucalis platycarpus* L. (*C. lappula* (Weber) Grande; *C. daucoides* L.; #*C. daucoides* ssp. *muricata* Bisch. ex Čelak.; #*C. daucoides* var. *muricata* (Bisch. ex Čelak.) Та-

mamsch.; #*C. platycarpus* ssp. *bischoffii* (Koso-Pol.) Soó; #*C. platycarpus* ssp. *muricata* (Bisch. ex Čelak.) Holub) – **Прицепник плоскоплодный.**

Одн., цв. VI-VII. Среди кустарников, на сухих полянах, у дорог, изредка.

282. **Chaerophyllum aureum* L. (*Ch. maculatum* Welld. ex DC.; #*Ch. temuloides* Boiss.) – **Бутень золотистый.**

Мн., цв. VI-VII. В лесах, на полянах, яйлах, обычно.

283. **Chaerophyllum bulbosum* L. (#*Ch. bobrovii* Schischk.; #*Ch. bulbosum* ssp. *bobrovii* (Schischk.) Soó; #*Ch. caucasicum* (Hoffm.) Schischk.) – **Бутень клубненосный.**

Двул., цв. VI-VII. В лесах, на лесосеках, у дорог, изредка.

284. #*Chaerophyllum roseum* Vieb. – **Бутень розовый**

Мн., цв. V-VI. В сосновом редколесье, в уроч. Красный камень, у границы с яйлой.

285. **Chaerophyllum temulum* L. – **Бутень опьяняющий.**

Мн., цв. V-VII. В лесах, среди кустарников, на сорных местах, довольно обычно.

286. **Conium maculatum* L. – **Болиголов пятнистый.**

Одн., цв. V-VII. На сорных местах, у жилья, обычно. Адв.

287. !Coriandrum sativum* L.** – **Кориандр посевной.**

Одн., цв. VI-VII. Собран однажды у усадьбы корд. Хыр-Алан. Адв.

288. *Daucus carota* L. (*D. australis* Kotov; #*D. kotovii* M.Hiroe) – **Морковь дикая.**

Одн.-двул., цв. VI-VIII. На сухих склонах и полянах в нижнем и среднем поясе, изредка.

289. **Eryngium campestre* L. – **Синеголовник полевой.**

Мн., цв. VII-IX. На сухих склонах и полянах, у дорог, обычно.

290. **Falcaria vulgaris* Bernh. (#*Drepanophyllum sioides* Wib.; *F. neglectissima* Klokov; *F. sioides* (Wibb.) Asch.) – **Резак обыкновенный.**

Двул., цв. VI-VII. На сухих полянах, у дорог, изредка.

291. *Ferulago taurica* Schischk. (#*F. galbanifera* (Mill.) W.D.J.Koch var. *brachyloba* Boiss.) – **Ферульник крымский.**

Мн., цв. VII. На сухих щебнистых склонах, в нижней зоне, изредка.

292. **Heracleum ligusticifolium* M.Vieb. – **Борщевик лигустиколистный.**

Двул.-мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах и осыпях близ яйлы (Г.П. 508). Энд. ЧКУ, ERL.

293. **Heracleum sibiricum* L. (*H. sphondylium* L. ssp. *sibiricum* (L.) Simonk.) – **Борщевик сибирский.**

Двул.-мн., цв. VI-VII. На полянах и в лесах, в тенистых балках, обычно.

294. *Heracleum stevenii* Manden. – **Борщевик Стевена.**

Двул.-мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, в тенистых лесах, на яйле, редко.

295. **Laser trilobum* (L.) Borkh. (*Laserpitium trilobum* L.) – **Лазурник трехлопастный.**

Мн., цв. VI-VII. В лесах, особенно сосновых, на полянах, обычно.

296. **Laserpitium hispidum* M.Vieb. – **Гладыш щетинистоволосистый.**

Мн., цв. VI-VII. В лесах, на полянах, лесосеках, среди кустарников, обычно.

297. *Oenanthe pimpinelloides* L. – **Омежник бедренцевидный.**

Мн., цв. VI. На влажных местах, г. Чучель, район Горного озера, редко.

298. **Orlaya daucoides* (L.) Greuter (*Caucalis daucoides* L., #*O.kochii* Heywood; *O. platycarpus* (L.) W.D.J.Koch p.p. excl. basionymo) – **Орлай морковновидная.**

Одн., цв. V-VI. У дорог, по долине р. Альма, изредка.

299. *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. (*Caucalis grandiflora* L.) – **Орлай крупноцветковая.**

Одн., цв. V-VI. На лесных полянах, открытых сухих склонах, изредка.

300. *Pastinaca clausii* (Ledeb.) M.Pimen (*Heracleum clausii* Ledeb.; #*H. graveolens* (M.Bieb.) Spreng.; *Malabaila graveolens* (Spreng.) Hoffm.; #*P. biebersteinii* Galushko; #*P. graveolens* M.Bieb.; *Peucedanum biebersteinii* Schmalh.) – **Пастернак Клауза.**

Мн., цв. VII. На остепненных склонах, редко.

301. **Pastinaca umbrosa* Steven ex DC. (*P. opaca* Bernh. Ex Hornem.; *P. sativa* L. ssp. *umbrosa* (Steven ex DC.) Bondar.; *P. sativa* L. ssp. *urens* (Req. ex Godr.) Čelak; *P. urens* Req. ex Godr.) – **Пастернак теневой.**

Двул., цв. VII-VIII. Среди кустарников, у дорог, жилья, изредка.

302. *Peucedanum lubimenkoanum* Kotov (*P. alsaticum* L. aggr.; *Xanthoselinum alsaticum* (L.) Schur.) – **Горичник Любименко.**

Мн., цв. VII-VIII. На сухих полянах, среди кустарников, в нижней зоне, не часто.

303. **Peucedanum tauricum* M.Bieb. – **Горичник крымский.**

Мн., цв. VI-VII. На сухих склонах, полянах, изредка (Г.П. 504).

304. *Physocaulis nodosus* (L.) W.D.J.Koch (#*Myrrhooides nodosa* (L.) Cannon) – **Вздуто-стебельник узловатый.**

Одн., цв. VI-VII. В смешанных лесах, на каменистых местах, изредка.

305. **Physospermum cornubiense* (L.) DC. (*Danaa nudicaulis* (M.Bieb.) Grossh.; *P. danae* (M.Bieb.) Schischk. ex N.I.Rubtzov) – **Вздутосемянник Корнуба.**

Мн., цв. VI-VII. В лесах, особенно сосновых, обычно.

306. **Pimpinella lithophila* Schischk. (~*P. tragium* aggr.) – **Бедренец камнелюбивый.**

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, осяпях, сухих полянах, яйле, обычно.

307. *Pimpinella peregrina* L. (#*P. affinis* Ledeb.; #*P. affinis* var. *multiradiata* Boiss.; #*P. korovinii* Kamelin; #*P. multiradiata* (Boiss.) Korovin; *P. taurica* (Ledeb.) Steud.) – **Бедренец иноземный.**

Двул., цв. VII-VIII. На сухих склонах, полянах, редко.

308. *Pimpinella saxifraga* L. (*P. dissecta* Retz.) – **Бедренец камнеломковый.**

Мн., цв. VI-VII. На лугово-степной поляне юго-восточного склона г. Черная, редко.

309. **Prangos trifida* (Mill.) Herrnst. & Heun (*Cachrys alpina* M.Bieb.; #*C. trifida* Mill.) – **Прангос трехраздельный.**

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах и полянах, в лесах, изредка. **ЧКУ, ERL.**

310. **Rumia crithmifolia* (Willd.) K.-Pol. (*Cachrys taurica* M.Bieb. 1808, non Willd. 1801; *Rumia taurica* Hoffm.; *Sanicula crithmifolia* Willd.; *Trinia crithmifolia* (Willd.) H.Wolff; *T. taurica* (Hoffm.) Schmalh.) – **Румия критмолистная.**

Мн., цв. V. На сухих склонах и осыпях г. Черная (Г.П. 495). Энд. **ЧКУ, IUCN, ERL.**

311. **Sanicula europea* L. – **Подлесник европейский.**

Мн., цв. VI-VII. В тенистых лесах, на влажных полянах, довольно обычно.

312. **Seseli dichotomum* Pall. ex M.Bieb. – **Жабрица вильчатая.**

Мн., цв. VI-VII. На южных каменистых склонах, в светлых лесах, на яйле, довольно обычно.

313. **Seseli gummiferum* Pall. ex Smith – **Жабрица камеденосная.**

Мн., цв. VII-VIII. На каменистых осыпях, скалистых склонах, изредка.

314. **Seseli lehmannii* Degen – **Жабрица Лемана.**

Мн., цв. VII-VIII. На каменистых луговинах яйлы и безлесных вершинах гор, довольно редко. Энд. **ЧКУ, IUCN, ERL.**

315. **Seseli libanotis* (L.) W.D.J.Koch (*Libanotis intermedia* Rupr., *L. montana* Crantz, *L. sibirica* auct. non C.A.Mey., *L. taurica* N.Rubtzov; #*L. leiocarpa* (Heuff.) Simonk.; #*L. montana* ssp. *bipinnata* (Čelak.) Dostál; #*L. pyrenaica* (L.) Bourg.; #*L. pyrenaica* ssp. *bi-*

pinnata (Čelak.) Holub; #*L. pyrenaica* ssp. *montana* (Crantz) Lemke & Rothm.; #*S. intermedium* (Rupr.) Vodop.; #*S. libanotis* var. *bipinnatum* Čelak.; #*S. libanotis* ssp. *intermedium* (Rupr.) P.W.Ball) – **Жабрица порезниковая.**

Мн., цв. VI-VII. На склонах гор Большая и Малая Чучель, уроч. Яман-Дере, изредка (Г.П. 499).

316. **Smyrnum perfoliatum* L. – Смирния пронзеннолистная.

Двул., цв. V-VII. В дубовых, ясеневых лесах, на опушках и вырубках, часто.

317. **Tordylium maximum* L. – Тордилиум крупный.

Одн.-двул., цв. VI-VII. На сухих склонах, среди кустарников, у дорог, довольно обычно.

318. *Torilis arvensis* (Huds.) Link (*Caucalis arvensis* Huds.) – Торилис полевой.

Одн.-двул., цв. VI-VII. На сухих полянах, среди кустарников, у дорог, изредка.

319. *Torilis heterophylla* Guss. (*Caucalis heterophylla* (Guss.) Arcang.; #*T. arvensis* ssp. *heterophylla* (Guss.) Thell.; *T. heterosperma* Steven) – Торилис разнолистный.

Одн., цв. V-VI. На лесных полянах, в нижнем поясе, район Горного озера, редко.

320. *Torilis japonica* (Houtt.) DC. (*Caucalis japonica* Houtt.) – Торилис японский.

Одн.-двул., цв. VI-VII. У лесных дорог, на опушках, сухих склонах, обычно.

321. *Torilis leptophylla* (L.) Rchb. (*Caucalis leptophylla* L.; #*T. xanthotricha* (Steven) Stankov) – Торилис тонколистный.

Одн., цв. IV-VI. На полянах в смешанных лесах, район Горного озера, редко.

322. *Torilis nodosa* (L.) P.Gaertn. (*Caucalis nodosa* (L.) Crantz.) – Торилис узловатый.

Одн., цв. V-VI. На сорных местах, район Центральной котловины (Вульф, 1953).

323. *Trinia glauca* (L.) Dumort. (#*Pimpinella glauca* L.; *T. stankovii* Schischk.) – Триния сизая.

Мн., цв. V-VI. На сухих шиферных склонах и яйле, довольно часто.

324. **Trinia hispida* Hoffm. (#*Rumia hispida* (Hoffm.) Stankov; #*R. hoffmannii* (M.Bieb.) Stankov; *T. hoffmannii* auct. non M.Bieb.) – Триния жестковолосая.

Мн., цв. VI. На южных каменистых горных склонах со степной растительностью, довольно обычно (Г.П. 494).

325. *Trinia kitaibelii* M.Bieb. (#*T. ramosissima* (Fisch. ex Trev.) Reichenb. 1832, non Ledeb. 1829; *T. ucrainica* Schischk.) – Триния Китайбея.

Мн., цв. V-VI. На Бабугане, сбор В. Косых (1980).

326. *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. (*Caucalis latifolia* L.) – Тургенция широколистная.

Одн., цв. V-VI. На сухих склонах и осыпях, в нижнем и среднем поясе, изредка.

Аросунaceae Juss. – Кутровые

327. **Vinca herbacea* Waldst. & Kit. (#*V. semidesertorum* Ponert) – Барвинок травянистый.

Полукуст., цв. IV-V. На лесных полянах, среди кустарников, изредка.

Araliaceae Juss. – Аралиевые

328. **Hedera helix* L. (#*H. caucasigena* Pojark.; #*H. helix* ssp. *caucasigena* (Pojark.) Takht. & Mulk.; #*H. taurica* Carrière) – Плющ обыкновенный.

Куст., Мн., цв. IX-X. В дубовых и буковых лесах, обычно.

Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые

329. *Aristolochia clematitis* L. – Кирказон ломоносовидный.

Мн., цв. V-VII. Тенистый лиственный лес, район корд. Камышлы, изредка.

Asclepiadaceae R.Br. – Ластовневые

330. *Vincetoxicum juzepczukii* (Pobed.) Privalova ex Wissjul. (*Antitoxicum juzepczukii* Pobed.; #*Cynanchum juzepczukii* (Pobedimova) Borhidi; #*V. juzepczukii* (Pobed.) Markgr., comb. superfl.) – **Ластовень Юзепчука.**

Мн., цв. V-VIII. В лесах, на полянах, район Центральной котловины, изредка.

331. **Vincetoxicum hirundinaria* Medik. (#*Alexitoxicon cretaceum* (Pobed.) Pobed.; #*A. laxum* (Bartl.) Pobed. ex Kuth.; #*A. officinale* (Moench) St.-Lag.; #*A. stauropolitanum* (Pobed.) Pobed.; #*A. vincetoxicum* (L.) H.P. Fuchs; *Antitoxicum cretaceum* Pobed.; *A. laxum* (Bartl.) Pobed.; *A. officinale* (Moench) Pobed.; #*A. stauropolitanum* (Pobed.) Pobed.; #*Cynanchum vincetoxicum* ssp. *laxum* (Bartl.) V.E. Avet.; *V. cretaceum* (Pobed.) Wissjul.; #*V. hirundinaria* ssp. *cretaceum* (Pobed.) Markgr.; *V. laxum* (Bartl.) Gren. & Godr.; *V. officinale* Moench; #*V. stauropolitanum* Pobed.; #*V. tanaicense* P.A. Smirn.) – **Ластовень ласточкин.**

Мн., цв. V-VII. На опушках, сухих склонах, в светлых лесах, обычно.

332. **Vincetoxicum scandens* Sommier & Levier (#*Alexitoxicon scandens* (Sommier & Levier) Pobed.; *Antitoxicum scandens* Sommier & Levier; #*A. scandens* (Sommier & Levier) Pobed.; #*V. amplifolium* K.Koch; *V. nigrum* auct.) – **Ластовень лазящий.**

Мн., цв. V-VI. В лесах, на полянах, вырубках, среди кустарников, по всей территории, обычно.

333. *Vincetoxicum schmalgausonii* (Kusn.) Stank. (#*Alexitoxicon schmalhausonii* (Kusn.) Pobed.; *Antitoxicum schmalgausonii* (Kusn.) Pobed.; #*V. schmalhausonii* (Kusn.) Markgr., comb. superfl.) – **Ластовень Шмальгаузена.**

Мн., цв. VI-VII. На открытых южных склонах, полянах, изредка.

Asteraceae Dumort. (=Compositae) – Астровые, сложноцветные

334. **Achillea nobilis* L. – **Тысячелистник благородный.**

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых и травянистых южных склонах Чатыр-Дага, редко.

335. **Achillea pannonica* Scheele (*A. millefolium* L. ssp. *pannonica* (Scheele) Hayek) – **Тысячелистник поннонский.**

Мн., цв. VI-VIII. На травянистых склонах и полянах, изредка.

336. *Achillea setacea* Waldst. & Kit. (*A. millefolium* L. ssp. *setacea* (Waldst. & Kit.) Weiss) – **Тысячелистник щетинистый.**

Мн., цв. VI-VIII. На полянах, сухих склонах, у дорог, на яйле и приайлинских склонах, обычно.

337. **Antennaria dioica* (L.) P.Gaertn. – **Кошачья лапка двудомная.**

Мн., цв. V-VIII. На луговинах яйлы и приайлинских склонах, довольно обычно.

338. *Anthemis altissima* L. (#*Cota altissima* (L.) J. Gay) – **Пупавка высочайшая.**

Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, г. Черная, редко (Вульф, 1969). Адв.

339. *Anthemis austriaca* Jacq. (#*Cota austriaca* (Jacq.) J. Gay) – **Пупавка австрийская.**

Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, сорных местах, редко. Адв.

340. *Anthemis cotula* L. – **Пупавка собачья.**

Одн., цв. VI-VIII. На сухих склонах и полянах, хр. Конек, изредка.

341. *Anthemis dumetorum* Sosn. (#*Cota dumetorum* (Sosn.) Holub) – **Пупавка кустарниковая.**

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, каменистых полянах, изредка.

- 342. *Anthemis jailensis* Zefir.** (#*Cota jailensis* (Zefir.) Holub) – **Пулавка яйлинская.**
Мн., цв. VI-VIII. На луговых склонах, в верхнем лесном поясе, на яйле, изредка. Энд.
ERL.
- 343. *Anthemis monantha* Willd.** (#*A. cretacea* Zefir.; #*A. parviceps* Dobroc. & Fed. ex Klokov; #*Cota cretacea* (Zefir.) Holub) – **Пулавка однокорзинчатая.**
Мн., цв. VI-VIII. На травянистых лесных склонах и полянах, у дорог, довольно обычно. Энд.
- 344. *Anthemis ruthenica* M.Bieb.** (*A. neilreichii* Ortman) – **Пулавка русская.**
Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, в нижней зоне, изредка.
- 345. *Anthemis sterilis* Steven** – **Пулавка бесплодная.**
Мн.-двул., цв. V-VII. На сухих шиферных склонах, по долине р. Альма и Кача, редко. Энд. IUCN, ERL.
- 346. **Anthemis tinctoria* L. ssp. *subtinctoria* (Dobroc.) Soó** (*A. subtinctoria* Dobroc.; *A. tinctoria* ssp. *subtinctoria* (Dobroc.) Soó; #*A. zephyrovii* Dobroc.; #*Cota tinctoria* ssp. *subtinctoria* (Dobroc.) Holub) – **Пулавка светло-желтая.**
Мн., цв. VI-VIII. На сухих остепненных склонах, в нижней и средней зоне, довольно обычно.
- 347. *Arctium lappa* L.** (*A. chaorum* Klokov; *A. majus* Bernh.) – **Лопух репейник.**
Двул., цв. VII-VIII. На сорных местах, у жилья, изредка.
- 348. **Arctium minus* (Hill.) Bernh.** – **Лопух малый.**
Двул., цв. VI-VIII. У дорог (Г.П. 729).
- 349. **Arctium nemorosum* Lej** (#*A. glabrescens* Klokov) – **Лопух дубравный.**
Двул., цв. VI-VIII. На лесных полянах, преимущественно в нижней зоне, изредка.
- 350. **Artemisia absinthium* L.** – **Полынь горькая.**
Мн., цв. VII-VIII. На лесных полянах, у дорог и жилья, изредка. Адв.
- 351. **Artemisia austriaca* Jacq.** (*A. repens* Pall. ex Willd.) – **Полынь австрийская.**
Мн., цв. VIII. На сухих склонах и полянах, редко.
- 352. *Artemisia caucasica* Willd.** (#*A. alpina* Pall. ex Willd.; #*A. argentata* Klokov; *A. lanulosa* Klokov; #*A. pedemontana* auct.) – **Полынь кавказская.**
Мн., цв. VI-VII. На каменистых обнажениях яйлы (Бабуган, Чатыр-Даг), редко (Л.С. 284, Вульф, 1969).
- 353. *Artemisia vulgaris* L.** (#*A. coarctata* Forselles; #*A. vulgaris* ssp. *coarctata* (Forselles) Ameljcz., comb. inval.; #*A. vulgaris* ssp. *urijanchaica* Ameljczenko, nom. inval.) – **Полынь обыкновенная.**
Мн., цв. VI-VIII. В светлых лесах, на полянах, у жилья, изредка.
- 354. **Aster bessarabicus* Bernh. ex Rchb.** (*A. amelloides* Besser 1822, non Hoffm. 1801; *A. amellus* L. ssp. *bessarabicus* (Bernh. Ex Rchb.) Soó) – **Астра бессарабская.**
Мн., цв. VII-IX. На каменистых склонах, яйле, изредка.
- 355. *Bellis perennis* L.** – **Маргаритка многолетняя.**
Мн., цв. III-VI. На лесных и луговых полянах, довольно обычно.
- 356. *Bombucileana erecta* (L.) Smoljjan.** – **Бомбицилена прямостоячая.**
Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, изредка.
- 357. *Carduus acanthoides* L.** (*C. fortior* Klokov) – **Чертополох колючий.**
Мн., цв. VI-VIII. На сорных местах, у дорог, редко. Адв. ?
- 358. *Carduus hamulosus* Ehrh.** (*C. tyraicus* Klokov) – **Чертополох крючковатый.**
Двул.-мн., цв. VI-VIII. На вырубках, сорных местах, изредка.

359. **Carduus nutans* L. (#*C. coloratus* Tamamsch.; *C. kondratjukii* Gorlaczova; #*C. nutans* var. *armenus* Boiss.; #*C. schischkinii* Tamamsch.; #*C. songoricus* Tamamsch.; #*C. thoermeri* ssp. *armenus* (Boiss.) Kazmi) – **Чертополох поникающий**.
Двул., цв. VI-VII. У дорог, жилья, изредка. Адв. ?
360. *Carduus uncinatus* M.Bieb. (*C. uncinatus* M.Bieb. ssp. *davisii* Kazmi) – **Чертополох крючковатый**.
Двул., цв. V-VIII. На сухих склонах, район Горного озера, редко.
361. **Carlina vulgaris* L. (#*C. taurica* Klokov) – **Колючник обыкновенный**.
Двул., цв. VII-IX. На сухих склонах, яйле, ветровалах, в светлых лесах, довольно обычно.
362. *Carthamus lanatus* L. – **Сафлор шерстистый**.
Одн.-двул., цв. VII-VIII. На сухих склонах, г. Чучель, редко (Л.С. 294, Вульф, 1969).
363. *Centaurea abbreviata* (К.Коч) Hand.- Mazz. (*C. phrygia* L. ssp. *abbreviata* (К.Коч) Dostál; #*Jacea abbreviata* (К.Коч) Soják) – **Василек укороченный**.
Мн., цв. VI-VIII. На высокогорных полянах, г. Малая Чучель, уроч. Красный камень, редко.
364. *Centaurea aemulans* Klokov (*Acosta aemulans* (Klokov) Holub; *C. pseudocoriacea* Dobroc.) – **Василек подражающий**.
Двул., цв. VII-IX. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, редко. ERL.
365. *Centaurea apiculata* Ledeb. (*Colymbada apiculata* (Ledeb.) Holub) – **Василек шпиконосный**.
Мн., цв. VI-IX. На сухих склонах, приайлинских луговинах, редко.
366. **Centaurea declinata* M.Bieb. – **Василек наклоненный**.
Мн., цв. IV-V. На каменистых сухих склонах, в светлых лесах, обычно.
367. **Centaurea diffusa* Lam. (*Acosta diffusa* (Lam.) Soják; #*C. microcalathina* A.O.Tarassov) – **Василек раскидистый**.
Двул., цв. VII-IX. На сухих остепненных склонах, в нижней зоне, обычно. Адв.
368. *Centaurea fuscomarginata* (К.Коч) Juz. (*C. cana* auct. non Sibth. & Smith; #*C. triumfettii* ssp. *cana* auct. p.p.) – **Василек буроотороченный**.
Мн., цв. VI-VIII. На яйле и приайлинских склонах, довольно обычно. Энд.
369. **Centaurea jacea* L. – **Василек луговой**.
Мн., цв. VI-IX. На полянах, сухих склонах, среди кустарников, обычно.
370. **Centaurea orientalis* L. (*Colymbada orientalis* (L.) Holub) – **Василек восточный**.
Мн., цв. VI-VIII. На сухих каменистых склонах, у дорог, не часто.
371. **Centaurea salonitana* Vis. (*Colymbada salonitana* (Vis.) Holub) – **Василек салонский**.
Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах по левому берегу р. Альма, редко (Г.П. 747).
372. *Centaurea semijusta* Juz. (#***C. sterilis* Steven ssp. *semijusta* (Juz.) Dostál) – **Василек полужаконный**.
Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах г. Черная, на Никитской яйле, редко. Энд.** ЧКУ.
373. **Centaurea solstitialis* L. – **Василек солнечный**.
Двул., цв. VI-VII. На сухих полянах, редко.
374. *Centaurea sterilis* Steven (***C. sterilis* Steven ssp. *sterilis* . *alba* M.Bieb., non L.; *C. leucolepis* Ledeb., p.p., non DC.; *C. stankovii* Ilar.; *C. nikitensis* Ilar. p.p.) – **Василек бесплодный**.
Двул.-мн., цв. VI-IX. На каменистых склонах, обнажениях яйлы, редко. Энд.**

375. *Centaurea substituta* Czerep. (*C. pannonica* (Heuff.) ssp. *substituta* (Czerep.) Dostál; #*Jacea substituta* (Czerep.) Soják) – **Василек замещающий**.
Мн., цв. VI-IX. На полянах в сосновых лесах, г. Малая Чучель, редко.
376. *Cephalorrhynchus tuberosus* (Steven) Schchian – **Цефалоринхус клубневой**.
Двул.-мн., цв. V. В лесах и на опушках, изредка.
377. *Chondrilla juncea* L. – **Хондрилла ситниковидная**.
Мн.-двул., цв. VI-IX. На сухих шиферных склонах, в нижней зоне, изредка.
378. **Cichorium inthibus* L. – **Цикорий обыкновенный**.
Мн., цв. V-X. На сорных местах, у дорог, среди кустарников, обычно. Адв.
379. **Cirsium arvense* (L.) Scop. (*Carduus arvensis* (L.) Smith.) – **Бодяк полевой**.
Мн., цв. VI-VIII. На полях, у дорог, сорное, изредка.
380. *Cirsium incanum* (S.G.Gmel.) Fisch. (*C. arvense* ssp. *incanum* (S.G.Gmel.) Petrak ex Пјin) – **Бодяк седой**.
Мн., цв. VI-VIII. На полянах, в светлых лесах, на вырубках и ветровалах, изредка.
381. **Cirsium laniflorum* (M.Bieb.) M.Bieb. – **Бодяк шерстистоцветковый**.
Мн., цв. VII-IX. В сосновых лесах, у дорог, на полянах, довольно обычно. Энд.
382. *Cirsium serrulatum* (M.Bieb.) Fisch. – **Бодяк мелкозубчатый**.
Двул., цв. VII-VIII. На сорных местах, район Светлой поляны, редко.
383. *Cirsium sublaniflorum* Soják (*C. lipskyi* Klokov) – **Бодяк почти шерстистоцветковый**.
Мн., цв. VII-VIII (IX). В сосновых лесах, на полянах, у дорог, изредка.
384. *Conyza canadensis* (L.) Cronq. (*Erigeron canadensis* L.) – **Мелколепестник канадский**.
Одн., цв. V-IX. Сорное в посевах и на лесосеках, редко (Г.П. 698). Адв.
385. *Crepis micrantha* Czerep. (*C. parviflora* Desf. 1807, non Moench 1794) – **Скерда мелкоцветковая**.
Одн., цв. V-VII. На сухих склонах, в нижней зоне, район Хыр-Алана, редко.
386. *Crepis setosa* Hall.f. – **Скерда щетинистая**.
Одн., цв. V-VI. На сухих полянах и сорных местах, изредка.
387. **Crupina vulgaris* Cass. – **Крупина обыкновенная**.
Одн.-двул., цв. V. На поляне со степной растительностью, на Веселом шпиле (Г.П. 738).
388. *Doronicum orientale* O.Hoffm. – **Дороникум восточный**.
Мн., цв. IV-V. В тенистых лесах, на северном склоне прирусловой долины р. Писара вблизи ее слияния с р. Бирюк-Узень, сбор В. Косых (1980).
389. **Echinops ruthenicus* M.Bieb. (*E. ritro* auct. non L.; *E. ritro* L. ssp. *ruthenicus* (M.Bieb.) Numan) – **Мордовник русский**.
Мн., цв. V-VI. На южных склонах со степной растительностью, изредка.
390. *Echinops sphaerocephalus* L. (#*E. erevanensis* Mulk.) – **Мордовник шароголовый**.
Мн., цв. VII-IX. На сухих каменистых склонах, осыпях, изредка.
391. **Erigeron orientalis* Boiss. – **Мелколепестный восточный**.
Мн., цв. VII-VIII. На остепненных лугах, яйле, обычно.
392. **Eupatorium cannabinum* L. – **Посконник коноплевидный**.
Мн., цв. VII-IX. Во влажных местах, по берегам рек, в средней и нижней зоне, довольно обычно.
393. *Filago arvensis* L. (*F. montana* auct. non L.; #*Logfia arvensis* (L.) Holub; #*Oglifa arvensis* (L.) Cass.) – **Жабник полевой**.

Одн., цв. VI-VIII. Поляна в заброшенном саду, район Светлой поляны.

394. **Gnaphalium sylvaticum* L. (*Omalotheca sylvatica* (L.) Sch.Bip. & F.Schultz) – Сушеница лесная.

Мн., цв. VII-VIII. В «окнах» в буковых лесах, на яйле по понижениям, изредка.

395. **Helichrysum arenarium* (L.) Moench – Цмин песчаный.

Мн., цв. VI-IX. На каменистых склонах, яйле, обычно.

396. **Helichrysum graveolens* (M.Bieb.) Sweet (#*H. aurantiacum* Boiss. & Huet.) – Цмин сильнопахнущий.

Мн., цв. VI-IX. На сухих склонах, яйлах, довольно обычно.

397. *Hieracium auratum* Fr. (#*H. sabaudum* ssp. *boreale* var. *auratum* (Fr.) Nyár.) – Ястребинка золотистая.

Мн., цв. VIII-IX. По опушкам лесов (Вульф, 1969).

398. **Hieracium gentile* Jord. ex Voreau – Ястребинка сродственная.

Мн., цв. V-VIII. В лесах, на полянах, обычно.

399. **Hieracium vagum* Jord. (*H. sabaudum* L. ssp. *vagum* (Jord.) Zahn; #*H. sublactucaesum* auct.) – Ястребинка блуждающая.

Мн., цв. VIII-IX. На лесных полянах, в светлых лесах, изредка.

400. *Hieracium virgultorum* Jord. – Ястребинка ветвистая.

Мн., цв. VIII-IX. На лесных полянах, склонах, среди кустарников, изредка (Вульф, 1969).

401. **Inula aspera* Poir. (#*I. salicina* ssp. *aspera* (Poir.) Jav.; #*I. salicina* var. *aspera* (Poir.) Beck) – Девясил шероховатый.

Мн., цв. VI-VIII. На сухих каменистых склонах, открытых лесных полянах, довольно обычно.

402. *Inula britannica* L. – Девясил британский.

Мн., цв. VI-VII. В долине р. Альма, в районе Аспорта вдоль старого арыка, редко.

403. **Inula conyzae* (Greiss.) Meikle (*I. conyza* DC; #*I. squarrosa* (L.) Bernh. 1800 non L. 1763; *I. vulgaris* (Lam.) Trevis.) – Девясил растопыренный.

Двул., цв. VII-IX. В лесах и на полянах, изредка.

404. **Inula ensifolia* L. – Девясил мечелистный.

Мн., цв. VI-VIII. На яйле и приайлинских склонах, обычно.

405. *Inula helenium* L. – Девясил высокий.

Мн., цв. VI-VIII. По долине р. Альма, в районе Аспорта.

406. **Inula oculus-christi* L. – Девясил глазковый.

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, осыпях, яйле, обычно.

407. **Jurinea sordida* Steven – Наголоватка грязная.

Мн., цв. V-VI. На травянистых и каменистых склонах, яйлинских плато, обычно.
Энд.

408. **Lactuca quercina* L. (*L. stricta* Waldsn. & Kit., *L. wilhelmsiana* Fisch. & C.A.Mey. ex DC.; #*Mulgedium quercinum* (L.) C. Jeffrey) – Латук сжатый.

Двул., цв. VI-VII. На полянах, среди кустарников, у дорог, редко (Г.П. 765).

409. *Lactuca serriola* L. (*L. scariola* L.) – Латук дикий, компасный.

Одн.-двул., цв. VI-IX. У дорог, жилья, сорное в посевах, изредка.

410. *Lagoseris callicephala* Juz. – Лагозерис красивоголовый.

Мн., цв. VI-VII. На скалистых обнажениях, осыпях, ущелье Уч-Кош, редко. ЧКУ.

411. **Lagoseris purpurea* (Willd.) Boiss. (*L. robusta* Czerep.; *L. taurica* M.Bieb., nom. illeg.; *Crepis purpurea* (Willd.) M.Bieb.) – Лагозерис пурпуровый.

Мн., цв. VI-VII. На каменистых осыпях, известняковых обнажениях, редко. Энд. **ЧКУ, IUCN, ERL, BK.**

412. **Lamyra echinocephala* (Willd.) Tamamsch. (*Ptilostemon echinocephalus* (Willd.) Greuter) – Ламира колючеголовая.

Мн., цв. VII-VIII. На каменистых склонах, осыпях южного склона Чатыр–Дага, редко (Г.П. 732).

413. **Lapsana intermedia* M.Bieb. (*L. aipetriensis* Vassilcz.; *L. alpina* auct. non Boiss. & Balansa; *L. communis* L. ssp. *intermedia* (M.Bieb.) Hayek; *L. grandiflora* M.Bieb. var. *intermedia* (M.Bieb.) Schmalh.) – Бородавник средний.

Одн.-двул., цв. V-VIII. В лесах, на полянах, у дорог, обычно.

414. **Leontodon biscutellifolius* DC. (*L. asper* (Waldst. & Kit.Poir 1814, non Forssk. 1775; *L. crispus* auct. non Vill.; #*L. crispus* ssp. *asper* (Waldst. & Kit.) Rohlena) – Кульбаба шероховатая.

Мн., цв. V-VII. На сухих полянах, в сосновых лесах, на яйле, обычно.

415. *Leontodon danubialis* Jacq. (#*L. hastilis* ssp. *danubialis* (Jacq.) Ball; #*L. hastilis* var. *glabratus* K.Koch; *L. hispidus* L. ssp. *danubialis* (Jacq.) Simonk.; #*L. hispidus* ssp. *glabratus* (W.D.J.Koch) Čelak.; #*L. hispidus* var. *glabratus* (W.D.J.Koch) Bisch.; *L. schischkini* V.Vassil.) – Кульбаба дунайская.

Мн., цв. VII. Сборы с берега р. Альма и из Центральной котловины (Вульф, 1969).

416. **Leontodon hispidus* L. – Кульбаба щетинистая.

Мн., цв. VI-VIII. На сухих каменистых склонах, яйле, обычно.

417. **Leucanthemum vulgare* Lam. – Нивяник обыкновенный, поповник.

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, лугах, яйле, обычно.

418. **Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert; #*M. chamomilla* var. *recutita* (L.) Grierson, #*M. chamomilla* sensu L. 1755) – Ромашка ободранная.

Одн., цв. V-VI. Сорное на огородах и у жилья, редко (Г.П. 713). Адв. ?

419. **Mycelis muralis* (L.) Dumort. (*Lactuca muralis* (L.) Gaerth.) – Мицелис стеной.

Мн., цв. VI-VII. В буковых, дубовых лесах, очень обычно.

420. **Onopordum acanthium* L. (*Onopordon acanthium* L.) – Татарник колючий.

Двул., цв. VI-IX. Как сорное в нижней зоне, изредка. Адв.

421. *Onopordum tauricum* Willd. – Татарник крымский.

Двул., цв. VI-VIII. На пустырях, сухих полянах, изредка.

422. **Petasites hybridus* (L.) Gaertn., В.Мey. & Scherb. – Белокопытник гибридный.

Мн., цв. III-V. По берегам речек, на влажных полянах, в нижнем поясе, довольно обычно.

423. *Picnomon acarna* (L.) Cass. – Пикномон колючий.

Одн., цв. VI-VIII. На полянах, в светлых лесах, у дорог, сорное, изредка.

424. **Picris echioides* L. (*Helminthia echioides* (L.) Juss.; *Helminthotheca echioides* (L.) Holub) – Горлюха румянковидная.

Одн., цв. VI-VII. На сорных местах, у дорог (Г.П. 754).

425. *Picris pauciflora* Willd. – Горлюха малоцветковая.

Одн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, изредка (Л.С. 297, Вульф, 1969).

426. *Picris rigida* Ledeb. ex Spreng. (*P. strigosa* auct. non M.Bieb.) – Горлюха твердая.

Двул., цв. VI-VIII. На сухих щебнистых склонах, полянах, среди кустарников, у дорог, обычно.

427. *Pilosella armeniaca* (Naeg. & Peter) Schljak. (*Hieracium armeniacum* (Naeg. & Petr) Ueksip) – Пироселла армянская.

Мн., цв. VI-VII. На сухих склонах, г. Роман-Кош (Вульф, 1969).

428. **Pilosella x auriculoides* (A.F.Lang) F.Schultz. (*Hieracium asperimum* Schur; *H. auriculoides* Lang; *H. echiogenes* (Naeg. & Peter) Ueksip; *H. longysetum* (Naeg. & Peter) Ueksip *H. pareysianum* (Naeg. & Peter) Ueksip; *H. sarmentosum* Froel.; *H. tanythrix* (Naeg. & Peter) Ueksip; *H. umbellosum* (Naeg. & Peter) Ueksip) – **Пилоселла длиннощетиная.**

Мн., цв. VI-VII. На открытых склонах, полянах, довольно часто.

429. **Pilosella bauhini* (Besser) Arv.-Touv. aggr. (*Hieracium bauhini* Bess.; *H. cymanthum* Naeg. & Peter, *Pilosella cymantha* (Naeg. & Peter) Schljak. nom. inval. *Pilosella fastigiata* (Tausch ex. Naeg. & Peter) Schljak. (*Hieracium fastigiatum* (Tausch ex. Naeg. & Peter) Ueksip, nom. inval.; *Pilosella pseudoauriculoides* (Naeg. & Peter) Schljak.; *P. rojowskii* (Rehman.) Schljak.) – **Пилоселла Баугина.**

Мн., цв. VI-VII. На сухих лугах, г. Роман-Кош (Г.П. 767), на сухих травянистых склонах Чатыр-Дага, Никитской яйлы, Бабуган-яйлы, обычно (Л.П. 912, 913; Вульф, 1969).

430. **Pilosella x bifurca* (M.Bieb.) F.Schultz & Sch.Bip. (*Hieracium x bifurcum* Bieb.; *H. longipes* (K.Koch ex Naeg. & Peter) Ueksip; *H. sterromastix* (Naeg. & Peter) Ueksip; *H. vindobonae* (Zahn) Ueksip) – **Пилоселла вильчатая.**

431. *Pilosella echioides* (Lumn.) F.Schultz & Sch.Bip. (*Hieracium echioides* Lumn., *P. asiatica* (Naeg. & Peter) Schljak.) – **Пилоселла румяноквидная.**

Мн., цв. V-VIII. На сухих травянистых склонах и обнажениях, обычно (Л.П. 912; Вульф, 1969).

432. *Pilosella glaucescens* (Besser) Soják. aggr. (*Hieracium armeniacum* (Naeg. & Petr) Ueksip; *H. glaucescens* Bess.; *Pilosella armeniaca* (Naeg. & Peter) Schljak.; *P. filifera* (Tausch) Schljak.; *P. marginalis* (Naeg. & Peter) Schljak.; *P. megalomastix* (Naeg. & Peter) Schljak.; *P. nigriseta* (Naeg. & Peter) Schljak.) – **Пилоселла голубовато-зеленая.**

Мн., цв. VI-VII. На сухих полянах, открытых склонах, довольно обычно.

433. ? *Pilosella hoppeana* (Schult.) F.Schult & Sch.Bip. (*Hieracium hoppeanum* Schult.; *Pilosella submacrolepis* Schljak.) – **Пилоселла Гоппе.**

Мн., цв. V-VII. На горных лугах яйлы, сбор с Инжер-Сырты (Вульф, 1969).

434. *Pilosella x lamprocoma* (Naeg. & Peter) Schljak. (#*Hieracium x lamprocomum* (Naeg. & Peter) Juxip. – **Пилоселла блестящеволосяная.**

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, травянистых склонах, изредка.

435. *Pilosella officinarum* F.Schult. & Sch.Bip. (*Hieracium pilosella* L.) – **Пилоселла волосистая.**

Мн., цв. VI-VIII. На сухих каменистых склонах, яйле и приайлинских луговинах, довольно часто.

436. ? *Pilosella procera* (Fr.) F.Schult. & Sch.Bip. (*Hieracium procerum* Fries) – **Пилоселла видная.**

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, район Грушевой поляны (Вульф, 1969).

437. ? **Pilosella proceriformis* (Naeg. & Peter) Soják. (*Hieracium proceriformis* (Naeg. & Peter) Zahn) – **Пилоселла высокорослая.**

Мн., цв. VI-VII. На приайлинских склонах и яйле, обычно.

438. ? *Pilosella x tephrocephala* (Vuk.) Soják (*Hieracium x tephrocephalum* Vuk.) – **Пилоселла пепельностолая.**

Мн., цв. VI-VII. На каменистых местах, Чучельский перевал, Никитская яйла, редко.

439. *Ptarmica salicifolia* (Besser) Serg. (*Achillea salicifolia* Bess.; #*Ptarmica borysthenica* Klokov & Sakalo; #*P. salicifolia* ssp. *borysthenica* (Klokov & Sakalo) Tzvelev) – **Птармика (тысячелистник) иволлистная.**

Мн., цв. VI-VIII. На влажных местах, в «Демьяновом лесу» в Центральной котловине, сбор Григорьева (Вульф, 1969), более поздних сборов нет.

440. *Pteropteca sancta* (L.) K.Koch (*Crepis sancta* (L.) Babcs.; *Lagoseris sancta* (L.) K. Maly; **P. orientalis* (Boiss.) Schmalh. p.p.) – **Птероштека палестинская.**

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, полянах, обычно.

441. *Pyrethrum corymbosum* (L.) Scop. – **Пиретрум, ромашник щитковый.**

Мн., цв. VI-VII. В лесах, на полянах, среди кустарников, обычно.

442. *Pyrethrum parthenifolium* Willd. – **Пиретрум девичьелистный.**

Мн., цв. VI-VII. В лесу, на полянах, лесосеках, у дорог, обычно.

443. **Scariola viminea* (L.) F.W. Schmidt (*Lactuca viminea* (L.) J.Presl & C.Presl) – **Скариола прутьевидная.**

Двул., цв. VII-VIII. На полянах, у дорог, на сухих склонах, обычно.

444. **Scorzonera crispa* M.Bieb. (#*S. austriaca* ssp. *crispa* (M.Bieb.) Nyman) – **Козелец курчавый.**

Мн., цв. IV-V. На каменистых склонах, скалах, яйле, обычно.

445. **Scorzonera hispanica* L. – **Козелец испанский.**

Мн., цв. V-VI. На остепненных горных склонах, полянах, обычно.

446. *Scorzonera laciniata* L. – **Козелец разрезной.**

Двул.-мн., цв. IV-VI. На каменистых полянах, луговинах, по долине р. Альма, изредка.

447. *Senecio grandidentatus* Ledeb. (#*S. arenarius* M.Bieb. 1816, non Thunb. 1800; #*S. erucifolius* ssp. *arenarius* Soó; #*S. erucifolius* ssp. *grandidentatus* (Ledeb.) B. Nordenstam, comb. superfl.; #*S. erucifolius* ssp. *grandidentatus* (Ledeb.) V.E.Avet.) – **Крестовник крупнозубчатый.**

Мн., цв. VII-VIII. На лесных опушках, у дорог, в нижней зоне, редко.

448. **Senecio jacobaea* L. – **Крестовник луговой.**

Двул., цв. VI-VIII. На полянах, луговинах яйлы, склонах, изредка.

449. *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. (#*S. euxinus* Minderova; #*S. leucanthemifolius* var. *vernalis* (Waldst. & Kit.) C.Alexander) – **Крестовник весенний.**

Одн.-двул., цв. IV-VI. На полянах, среди кустарников, в нижней зоне, изредка.

450. *Senecio vulgaris* L. – **Крестовник обыкновенный.**

Одн.-двул., цв. III-VIII-IX. Сорное у дорог, вдоль арыка, редко. Адв.

451. **Solidago virgaurea* L. – **Золотарник обыкновенный, золотая розга.**

Мн., цв. VII-IX. В лесах, на полянах, открытых травянистых склонах, на яйле, обычно.

452. **Sonchus asper* (L.) Hill. – **Осот шероховатый.**

Одн., цв. V-IX. Сорное в посевах, на лесосеках и ветровалах, у дорог, изредка. Адв.

453. **Tanacetum vulgare* L. – **Пижма обыкновенная, дикая рябинка.**

Мн., цв. VII-IX. На лесных полянах, луговинах, у дорог, изредка.

454. **Taraxacum erythrospermum* Andrz. (#*T. laevigatum* auct.) – **Одуванчик красносемянной.**

Мн., цв. III-IV. На сухих полянах, яйле, изредка.

455. **Taraxacum officinale* Wigg. aggr. (#*T. laeticolor* Dahlst.) – **Одуванчик лекарственный.**

Мн., цв. IV-VI. На лесных полянах, у дорог, жилья, обычно.

456. *Tephrosieris jaiolica (Juz.) Konechn. (Senecio jaiolica Juz.) – Тэфросерис яйлинский.

Мн., цв. VI-VII. На яйле и приайлинских склонах, обычно. Энд.

457. Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. – Козлобородник опушенноносый.

Двул., цв. V-VIII. На сухих остепненных полянах, редко.

458. *Tragopogon dubius Scop. (#T. major Jacq.; T. tauricus Klokov) – Козлобородник сомнительный.

Двул., цв. V-VIII. На сухих полянах, луговинах, у дорог, жилья, обычно.

459. *Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная.

Мн., цв. II-IV. На смытых почвах, у речек, дорог, обычно.

460. Xanthium spinosum L. (Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr.) – Дурнишник игольчатый.

Одн., цв. VI-IX. Сорное на огородах, у дорог и жилья, изредка. Адв.

461. *Xeranthemum annuum L. – Сухоцвет однолетний.

Одн., цв. V-IX. У дорог, на сухих склонах, единично (Г.П. 725).

462. *Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Smith (Xeroloma cylindracea (Sibth. & Smith) Holub) – Сухоцвет цилиндрический.

Одн., цв. V-VIII. На задерненных склонах со степной растительностью, обычно.

Berberidaceae Juss. – Барбарисовые

463. Berberis orientalis C.K.Schneid. (B. vulgaris L. ssp. orientalis (C.K.Schneid.) Takht.; B. vulgaris L. var. orientalis (Schneid.) Papava) – Барбарис восточный.

Куст., цв. V. Под пологом смешанных лесов, на сухих склонах, изредка.

464. *Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный

Куст., цв. V. В лесах и на полянах, по долине р. Альма, обычно.

Betulaceae S.F.Gray – Березовые

465. *Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (A. vulgaris Pers.; Betula glutinosa (L.) Lam.) – Оляха клейкая, черная.

Дер., цв. III-IV. По долине р. Альма, Сухая Альма, в составе пойменных лесов.

466. *Betula pendula Roth (#B. platyphyloides V.Vassil; #B. tallasica Poljak.; B. verrucosa Ehrh.) – Береза повислая.

Дер., цв. IV-V. Небольшими участками и отдельными деревьями в составе соснового леса на крутых склонах в уроч. Яман-Дере (над водопадом Головкинского) и в верховьях Сухой Альмы.

Boraginaceae Juss. – Бурчаниковые

467. *Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub (Buglossoides purpureo-caeruleum (L.) I.M.Johnst.; Lithospermum purpureo-caeruleum L.) – Воробейник пурпурно-синий.

Мн., цв. IV-VI. В лесах, преимущественно дубовых, среди кустарников, на полянах, обычно.

468. Anchusa azurea Mill. (A. italica Retz.) – Анхуза лазоревая.

Мн., цв. V-VI. На огородах, у дорог, сорное, изредка (Л.С. 216, YALT).

469. *Anchusa leptophylla Roem. & Schult. – Анхуза узколистная.

Двул.-мн., цв. VI-VII. На сухих местах и у дорог, не часто (Г.П. 545).

470. Anchusa stylosa M.Bieb. – Анхуза длинностолбиковая.

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, изредка (Л.С. 217, YALT).

471. *Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. (*Lithospermum arvense* L.; #*Rhytispermum arvense* (L.) Link) – **Воробейник полевой.**

Одн., цв. IV-VI. На пустырях, сухих остепненных склонах, изредка.

472. *Cerinthe minor L. (*C. quinguemaculata* Vahlenb.) – **Восковик малый.**

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, лесных полянах, обычно.

473. *Cynoglossum germanicum Jacq. (*C. montanum* auct. non L.) – **Чернокорень германский.**

Двул., цв. V-VI. В лесах, преимущественно буковых, довольно обычно.

474. Cynoglossum officinale L. – **Чернокорень лекарственный.**

Двул., цв. V-VI. На каменистых склонах, в речных долинах, у дорог, изредка.

475. Echium biebersteinii Lacaita (*E. italicum* auct. non L.; #*E. italicum* ssp. *biebersteinii* (Lacaita) Greuter & Burdet; #*E. italicum* var. *biebersteinii* Lacaita; *E. pyramidatum* DC.) – **Синяк Биберштейна.**

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, у дорог, изредка.

476. *Echium russicum J.F.Gmel. (*E. maculatum* auct. non L., *E. rubrum* Jacq. 1778, non Forssk. 1774) – **Синяк русский.**

Мн., цв. VI-VIII. На остепненных полянах, каменистых склонах, в нижней зоне, изредка.

477. *Echium vulgare L. – **Синяк обыкновенный.**

Двул., цв. VI-IX. На сухих склонах и полянах, у дорог, обычно.

478. Lappula barbata (M.Bieb.) Guerke (*Myosotis barbata* M.Bieb.) – **Липучка бордчатая.**

Двул., цв. V-VIII. На каменистых склонах, редко (Л.С. 221, YALT).

479. *Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (*L. echinata* Gilib. nom. inval.; *L. myosotis* Moench; *Myosotis lappula* L.; #*M. squarrosa* Retz.) – **Липучка растопыренная.**

Одн.-двул., цв. V-VII. В посевах, у дорог, сорное, изредка.

480. *Lithospermum officinale L. – **Воробейник лекарственный.**

Мн., цв. IV-VI. Среди кустарников, в светлых лесах, на сухих полянах, обычно.

481. Myosotis arvensis (L.) Hill (*M. scorpioides* L. var. *arvensis* L.) – **Незабудка полевая.**

Одн.-двул., цв. V-VII. На склонах, лесных полянах, довольно обычно.

482. *Myosotis laxa Lehm. (*M. caespitosa* K.F.Schultz) – **Незабудка рыхлая.**

Мн., цв. IV-VI. По сырым местам, изредка (Г.П. 548).

483. *Myosotis litoralis Steven ex M.Bieb. – **Незабудка прибрежная.**

Одн., цв. IV-V. На каменистых сухих полянах, редко.

484. Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. (*M. arenaria* Schrad. ex Schultz; *M. stricta* Link ex Roem. & Schult.; *M. verna* Opiz) – **Незабудка мелкоцветковая.**

Одн., цв. V-VI. На сухих полянах и склонах, изредка.

485. *Myosotis popovii Dobrocz. (#*M. suaveolens* auct. p.p.) – **Незабудка Попова.**

Мн., цв. VI-VII. На яйле и приайлинских склонах, обычно.

486. *Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. (*M. collina* Rchb. 1822, non Hoffm. 1791; *M. hispida* Schlecht.) – **Незабудка ветвистая.**

Одн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, редко (Г.П. 550).

487. *Myosotis sparsiflora J.C.Mikan ex Pohl (#*M. pseudopropinqua* Popov; *Strophostoma sparsiflora* (Pohl) Turcz.) – **Незабудка редкоцветковая.**

Одн., цв. V-VII. На лесных полянах, в лесах, в поймах, по берегам болотцев, довольно обычно.

488. *Neatostema apulum* (L.) Johnst. (*Lithospermum apulum* L.) – Неатостема опулейская.

Одн., цв. IV-V. На сухих каменистых склонах, полянах, очень редко.

489. *Nonea pulla* (L.) DC. (*Anchusa pulla* (L.) M.Bieb.; *Lycopsis pulla* L. 1759, non Loefl. 1758) – Ноннея темно-бурая.

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, по долине р. Альма, изредка.

490. **Onosma polyphylla* Ledeb. – Оносма многолистная.

Полукуст., цв. VI-VIII. На каменистых и скалистых склонах яйлы, изредка. ЧКУ, IUCN, ERL, BK.

491. *Onosma rigida* Ledeb. – Оносма жесткая.

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых обнажениях яйлы, редко.

492. **Onosma taurica* Pall. – Оносма крымская.

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых полянах и осыпях, г. Черная, редко (Г.П. 554).

493. *Pulmonaria obscura* Dumort. (*P. officinalis* L. ssp. *obscura* (Dumort.) Murb.) – Медунница неясная.

Мн., цв. VI-VIII. В поймах рек Донга, Кача, в буковых и дубовых лесах, редко.

494. **Solananthus biebersteinii* DC. (#*Cynoglossum biebersteinii* (DC.) Greuter & Burdet) – Трубкацвет Биберштейна.

Мн., цв. IV-V. В тенистых лесах, на травянистых лесных полянах, изредка. ЧКУ.

495. *Symphytum officinale* L. – Окопник лекарственный.

Мн., цв. V-VII. Во влажных местах, в «Демьяновском лесу», сбор Григорьева.

496. **Symphytum tauricum* Willd. (*S. orientale* auct. non L.) – Окопник крымский.

Двул., цв. V-VII. В лесах, на полянах, у дорог, довольно обычно.

Brassicaceae Burnett (=Cruciferae Juss., nom. altern.) – Капустные, крестоцветные

497. **Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande (#*A. alliacea* (Salisb.) Britten & Rendle nom. illeg.; *A. officinalis* Andrzej. ex M.Bieb.; *Arabis petiolata* M.Bieb.; *Sisymbrium alliaceum* Salisb., nom. illeg.) – Чесночница черешчатая.

Одн.-двул., цв. IV-VI. В лесах, на вырубках, у дорог, довольно обычно.

498. **Alyssum calycinum* L. (*A. alyssoides* (L.) L., *A. campestre* (L.) L.; #*Clypeola alyssoides* L.; #*C. campestris* L.; #*Psilonema alyssoides* (L.) Heideman; #*P. calycinum* (L.) S.A. Mey.) – Бурачок чашечковый.

Одн., цв. IV-V. На сухих полянах, каменистых склонах, сорное у дорог, обычно.

499. **Alyssum desertorum* Stapf (*A. minimum* auct. non L.; *A. turkestanicum* Regel & Schmalh. var. *desertorum* (Stapf.) Botsch.; *A. vindobonense* Beck) – Бурачок пустынный.

Одн., цв. IV-VI. Каменистые сухие склоны, редко.

500. **Alyssum gmelinii* Jord. (*A. arenarium* C.C.Gmel., nom. illeg.; *A. medium* Iljinskaja, non Host; *A. montanum* auct. non L. #*A. montanum* ssp. *gmelinii* (Jord.) Hegi & Ed. Schmid) – Бурачок Гмелина.

Мн., цв. V-VI. Собран на Никитской яйле.

501. **Alyssum hirsutum* M.Bieb. (*A. brodense* Zapal.; #*A. minus* (L.) Rothm. ssp. *hirsutum* (M.Bieb.) Stojan. & Stef.) – Бурачок шершавый.

Одн., цв. IV-VI. Поляны у границы леса, редко.

502. **Alyssum minutum* Schlecht. ex DC. – Бурачок маленький.

Одн., цв. IV-VI. На шиферных сухих склонах, изредка.

503. **Alyssum murale* Waldst. & Kit. (#*A. caucasicum* (Nyár.) Nyár.; #*A. murale* ssp. *caucasicum* Nyár.) – **Бурачок стенной.**

Мн., цв. IV-VIII. Каменистые склоны и поляны со степной растительностью, изредка.

504. **Alyssum obtusifolium* Steven ex DC. – **Бурачок туполистный.**

Мн., цв. VI-VII. На остепненных каменистых склонах, изредка (Г.П. 307). **ЧКУ.**

505. *Alyssum parviflorum* M.Bieb. (*A. campestre* auct. non L.; #*A. micropetalum* Fisch. ex DC.; #*A. micropetalum* Fisch. ex Hornem.; #*A. minus* (L.) Rothm.; #*A. rothmalleri* Galushko; #*Clupeola minor* L.) – **Бурачок мелкоцветковый.**

Одн.-двул., цв. IV-VII. На сухих склонах, яйлах, редко.

506. *Alyssum rostratum* Steven (*A. montanum* L. ssp. *rostratum* (Steven) Schmalh.) – **Бурачок носатый.**

Одн.-мн., цв. V-VII. На сухих склонах и каменистых обнажениях, обычно.

507. **Alyssum tortuosum* Waldst. & Kit. (#*A. bracteatum* auct.; #*A. cuneipetalum* Nyár.; #*A. diversicaule* P.A. Smirn.; *A. longistylum* (N.Busch.) Grossh.; #*A. longistylum* (Sommier & Levier) Grossh.; *A. odessanum* Nyár.; #*A. serpyllifolium* var. *longistylum* Sommier & Levier; #*A. tortuosum* var. *longistylum* (Sommier & Levier) N. Busch; #*A. transiens* Nyár.) – **Бурачок извилистый.**

Мн., цв. V-VII. На щебнистых сухих склонах, обычно. **ЧКУ.**

508. **Alyssum trichostachyum* Rupr. (*A. montanum* L. ssp. *trichostachyum* (Rupr.) Hayek; *A. repens* Vaubg. ssp. *trichostachyum* (Rupr.) Hayek) – **Бурачок пушистый.**

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, осыпях, яйлах, остепненных полянах, довольно обычно.

509. *Alyssum umbellatum* Desv. – **Бурачок зонтичный.**

Одн., цв. IV-VII. На остепненных сухих полянах, каменистых склонах, довольно обычно.

510. *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. – **Резушка Галя.**

Одн.-двул., цв. IV-VI. На сухих склонах, в нижней зоне, изредка.

511. *Arabis auriculata* Lam. (*A. dasycarpa* Andrz. ex DC.; *A. recta* Vill.) – **Резуха ушастая.**

Одн., цв. IV-V. На сухих каменистых склонах, изредка (Л.С. 114, YALT).

512. **Arabis caucasica* Schlecht. ex Willd. (*A. alpina* L. ssp. *caucasica* Schlectht. ex Willd.) Briq.; #*A. caucasica* var. *dolichothrix* (N. Busch) Grossh.; #*A. dolichothrix* (N.Busch) N.Busch; #*A. flaviflora* Bunge; #*A. ionocalyx* auct.) – **Резуха кавказская.**

Мн., цв. III-V. На скалах, каменистых обнажениях, по всей территории, обычно.

513. **Arabis sagittata* (Bertol.) DC. (*A. hirsuta* auct. non (L.) Scop.; #*Turritis sagittata* Bertol.) – **Резуха стреловидная.**

Одн.-двул., цв. V-VI. Поляны и остепненные склоны, обычно.

514. **Arabis turrata* L. – **Резуха башенная.**

Двул., цв. IV-VII. В лесах, на полянах, у дорог, довольно часто.

515. **Barbarea vulgaris* R.Br. ssp. *arcuata* (Opiz ex J.& C.Presl) Hayek (*B. arcuata* (Opiz ex J.et C.Presl) Reichenb.; *B. taurica* DC. #*Campe barbarea* (L.) Wight ex Piper; *Erysimum arcuatum* Opiz ex J. & C.Presl) – **Сурепка дуговидная.**

Двул., цв. IV-VII. В поймах рек, на лесных полянах, луговинах, довольно обычно.

516. **Berteroa incana* (L.) DC. (*Alyssum incanum* L.) – **Икотник серый.**

Одн.-двул., цв. IV-X. На сухих полянах, у дорог, обычно.

517. **Bunias orientalis* L. – **Свербига восточная.**

Двул., цв. V-VII. На лесных полянах, среди кустарников, изредка.

518. *Calepina irregularis* (Asso) Thell. – **Калепина неравномерная.**

Одн.-двул, цв. IV-VI. На полянах и сорных местах, изредка.

519. **Capsella bursa-pastoris* Medik. (#*Capsella hircana* Grossh.; *Thlaspi bursa-pastoris* L.) – **Пастушья сумка обыкновенная.**

Одн., цв. III-XI. По обочинам дорог, у жилья, сорное, обычно. Адв.

520. *Cardamine hirsuta* L. (*C. multicaulis* Норре) – **Сердечник шершавый.**

Одн.-двул, цв. III-V. По тенистым, влажным местам, в лесах и среди кустарников (Л.С. 113).

521. *Cardamine impatiens* L. (#*C. dasycarpa* M.Bieb.) – **Сердечник недотрога.**

Одн., цв. V-VI. Черноольховое болото, район корд. Буковского, у подножия г. Большая Чучель, редко.

522. **Cardamine tenera* S.G.Gmel. ex C.A.Mey. – **Сердечник нежный.**

Мн., цв. V-VI. В тенистых лесах, по берегам болотцев, изредка. ЧКУ.

523. **Cardaria draba* (L.) Desv. (*Lepidium draba* L.) – **Кардария крупковидная.**

Мн., цв. V-VI. У дорог и жилья, на сорных местах, не часто.

524. **Dentaria bulbifera* L. (*Cardamine bulbifera* (L.) Krantz.) – **Зубянка клубненосная.**

Мн., цв. IV-VI. В буковых, смешанных лесах, на дне балок, очень редко.

525. **Dentaria quinquefolia* M.Bieb. (*Cardamine quinquefolia* (M.Bieb.) Schmalh.) – **Зубянка пятилистная.**

Мн., цв. IV-V. В буковых лесах, по долине р. Альма, очень обычно.

526. **Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl (*Sisymbrium sophia* L.) – **Дескурения Софии.**

Одн., цв. V-IX. По обочинам дорог и сорным местам, на сухих полянах, изредка. Адв.

527. *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. (*Sisymbrium tenuifolium* L.) – **Двурядка тонколистная.**

Мн., цв. V-X. На сухих склонах, сорное, изредка.

528. **Draba cuspidata* M.Bieb. – **Крупка вытянутостолбиковая.**

Мн., цв. IV-VII. На каменистых склонах в верхнем поясе, на яйле, обычно. IUCN.

529. *Draba muralis* L. – **Крупка стенная.**

Одн., цв. V-VII. На каменистых местах, шиферных склонах, изредка.

530. *Draba nemorosa* L. – **Крупка дубравная.**

Одн., цв. IV-VII. Лесные поляны в верхней зоне, район Красного камня, изредка.

531. *Erophila praecox* (Steven) DC. (*E. verna* (L.) Besser ssp. *praecox* (Steven) Walters) – **Веснянка ранняя.**

Одн., цв. III-V. На полянах, склонах, залежах (Л.С. 121).

532. *Erophila verna* (L.) Besser (*Draba verna* L.; *E. verna* (L.) Besser ssp. *praecox* (Steven) Walters; #*E. verna* (L.) Chevall., comb. superfl.) – **Веснянка весенняя.**

Одн., цв. III-V. На сухих полянах, вырубках, у дорог, обычно.

533. **Erysimum cuspidatum* (M.Bieb.) DC. (*Acachmena cuspidata* (Bieb.) H.P. Fuchs; #*Cuspidaria cuspidata* (M.Bieb.) Takht.; #*Syrenia cuspidata* (N.Busch) Rchb.; #*Syreniopsis cuspidata* (M.Bieb.) H.P.Fuchs) – **Желтушник щитовидный.**

Двул, цв. V-VII. На каменистых, сухих склонах, остепненных полянах, довольно обычно.

534. *Fibigia clypeata* (L.) Medik. – **Фибигия щитовидная.**

Мн., цв. IV-VI. На сухих склонах и полянах южного склона гор, изредка.

535. **Hesperis ruscifolia* Borbas & Degen. – **Вечерница ночная фиалка.**

Одн.-двул, цв. V-VII. В лесах и среди кустарников, на полянах, сухих склонах, обычно.

536. *Hesperis steveniana* DC. – Вечерница Стевена.

Двул., цв. V-VII. В дубовых лесах южного склона, район Горного оз., редко.

537. *Iberis amara* L. – Иберийка горькая.

Одн., цв. VI-VII. Единственное местонахождение – между Аспортом и Хыр-Аланом (Вульф, 1947). Адв.

538. **Iberis saxatilis* L. – Иберийка скальная.

Полукуст., цв. III-VII. На скалистых и каменистых склонах яйлы, обычно.

539. **Iberis taurica* DC. (#*I. oschtenica* Kharkev.; *I. simplex* auct. p.p.) – Иберийка крымская.

Двул., цв. V-VII. На каменистых склонах, осыпях в нижней и верхней зонах, изредка.

540. *Isatis taurica* M.Bieb. – Вайда крымская.

Двул., цв. VI. На сухих склонах, изредка.

541. **Lepidium campestre* (L.) R.Br. (*Thlaspi campestre* L.) – Клоповник полевой.

Одн.-двул., цв. V-VII. На сухих склонах, полянах, у дорог, обычно.

542. **Lepidium perfoliatum* L. – Клоповник пронзеннолистный.

Одн.-двул., цв. IV-VI. Сорное у дорог, редко. Адв.

543. *Lepidium sativum* L. – Клоповник посевой.

Одн., цв. VI-VII. Сорное у дорог и жилья, редко. Адв.

544. *Neslia paniculata* (L.) Desv. (#*N. paniculata* ssp. *apiculata* (Fisch. & C.A.Mey) Maire & Weiller) – Неслия метельчатая.

Одн., цв. V-VIII. На полянах, сухих склонах, по обочинам дорог, редко. Адв.

545. *Rorippa austriaca* (Crantz) Besser (*Nasturtium austriacum* Crantz) – Жерушник австрийский.

Мн., цв. V-VII. По сырым местам и берегам водоемов, редко.

546. *Rorippa sylvestris* (L.) Besser (*Nasturtium sylvestre* (L.) R.Br.; *Sisymbrium sylvestre* L.) – Жерушник лесной.

Мн., цв. V-VIII. На сырых местах, близ Хыр-Алана.

547. *Sisymbrium loeselii* L. (#*S. decipiens* Bunge; #*S. turcomanicum* Litv.) – Гулявник Лезеля.

Одн.-двул., цв. V-VIII. По сухим полянам, у дорог, редко. Адв.

548. **Sisymbrium officinale* (L.) Scop. (*Erysimum officinale* L.) – Гулявник лекарственный.

Одн.-двул., цв. V-IX. На полянах, у дорог, сорное, изредка. Адв.

549. **Sisymbrium orientale* L. (#*S. daghestanicum* Vassilcz.) – Гулявник восточный.

Одн.-двул., цв. V-VII. Сухие остепненные поляны, в нижней зоне, изредка.

550. **Sobolewsia sibirica* (Willd.) P.W.Ball (*S. lithophila* M.Bieb.; #*Cochlearia sibirica* Willd.) – Соболевская сибирская.

Одн., цв. III-V. На подвижных осыпях южных и западных склонов Чатыр-Дага (Г.П. 288). Энд. ЧКУ, ERL.

551. **Thlaspi arvense* L. – Ярутка полевая.

Одн., цв. IV-VI. Сорное на огородах, у дорог, изредка. Адв.

552. **Thlaspi macranthum* (Lipsky) N.Busch (*Noccaea macrantha* (Lipsky) F.K.Mey.) – Ярутка крупноцветковая.

Мн., цв. IV-VI. На каменистых и скалистых склонах, лесных полянах, довольно обычно.

553. **Thlaspi perfoliatum* L. (*Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey.) – Ярутка пронзенная.

Одн., цв. III-V. На южных склонах и остепненных полянах, обычно.

554. **Thlaspi praecox* Wulf (*Noccaea praecox* (Wulf.) F.K. Mey.) – **Ярутка ранняя**.
Мн., цв. IV-V. На сухих склонах, скалах, изредка.

555. **Turritis glabra* L. (*Arabis glabra* L.) – **Башенница гладкая**.
Одн.-двул., цв. IV-VII. На лесных и яйлинских луговинах, изредка.

Callitrichaceae Link – Болотниковые

556. **Callitriche palustris* L. (#*C. anceps* ssp. *subanceps* (Petrov) A.Löve & D.Löve; #*C. elegans* Petrov; #*C. fallax* Petrov; #*C. palustris* var. *elegans* (Petrov) Y.L. Chang; #*C. subanceps* Petrov; *C. verna* L.; #*C. verna* var. *elegans* (Petrov) Kitag.; *C. vernalis* W.D.J.Koch) – **Болотник болотный**.

Одн., цв. V-VI. В долине р. Альма и на болотце у корд. Буковского, редко.

557. **Callitriche stagnalis* Scop. – **Болотник прудовой**.

Одн., цв. V-VI. В лесном озерце среди букового леса в районе Бишуйской дачи (Г.П. 435).

Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые

558. **Adenophora taurica* (Sukacz.) Juz. – **Бубенчик крымский**.

Мн., цв. VII-VIII. На лугах яйлы и склонах гор Большая и Малая Чучель, редко (Г.П. 693). ЧКУ, IUCN, ERL.

559. **Campanula bononiensis* L. – **Колокольчик болонский**.

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, в лесах, на яйлинских склонах, обычно.

560. *#Campanula collina* Sims. (#*C. annae* Kolak.; #*C. collina* M.Bieb.) – **Колокольчик холмовой**.

Мн., цв. VII. В сосновом редколесье, уроч. Красный камень, очень редко.

561. *Campanula rapunculoides* L. (#*C. grossheimii* Kharadze) – **Колокольчик рапунцеливидный**.

Мн., цв. VI-VIII. В светлых лесах, редко.

562. **Campanula sibirica* L. – **Колокольчик сибирский**.

Двул., цв. V-VII. На полянах, в светлых лесах, изредка.

563. *Campanula taurica* Juz. (***C. sibirica* L. ssp. *taurica* (Juz.) Fed.) – **Колокольчик крымский**.

Двул.-мн., цв. V-VII. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, среди кустарников, обычно. Энд.**

564. **Campanula trachelium* L. (*C. urticifolia* Schmidt) – **Колокольчик крапиволистный**.

Мн., цв. VI-VIII. В лесах, среди кустарников, на полянах, не часто.

Cannabaceae Endl. – Коноплевые

565. *Humulus lupulus* L. – **Хмель обыкновенный**.

Мн., цв. VI-VII. В районе усадьбы Хыр-Алан, изредка.

Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные

566. **Sambucus ebulus* L. – **Бузина травянистая**.

Куст., цв. VI-VIII. У дорог, на лесосеках, у кордонов, обычно.

567. **Sambucus nigra* L. – **Бузина черная**.

Куст., цв. V-VI. В пойме р. Альма, у дорог, в балках, довольно обычно.

568. **Viburnum opulus* L. – **Калина обыкновенная**.

Куст., цв. V-VI. По долине р. Альма, среди кустарников, изредка.

Carvophyllaceae Juss. – Гвоздичные

569. *Agrostemma githago* L. (#*A. githago* var. *linicola* (Terechov) K. Hammer; #*A. githago* var. *microspermum* (Levina) K. Hammer; *A. linicola* Telechov; #*A. macrospermum* Levina) – **Куколь посевной.**

Одн., цв. VI-VII. Один сбор Л. Самсоновой в Центральной котловине. Адв.

570. **Arenaria serpyllifolia* L. – **Песчанка тимьянолистная.**

Одн., цв. V-IX. На остепненных склонах, в светлых лесах и как сорное в огородах, обычно.

571. *Cerastium balearicum* F. Herm. (*C. dentatum* Möeschl.; #*C. semidecandrum* ssp. *balearicum* (F. Herm.) Litard.; #*C. semidecandrum* ssp. *dentatum* (Moschl) Maire & Weiller; #*C. semidecandrum* var. *dentatum* (Moschl) Kharadze) – **Ясколка балеарская.**

Одн., цв. IV-V. В светлых лесах, на каменистых склонах, у дорог (Л.П. 247; Вульф, 1947).

572. **Cerastium biebersteinii* DC. (#*C. biebersteinii* ssp. *transcaucasicum* Buschm.) – **Ясколка Биберштейна.**

Мн., цв. V-VII. На яйле, каменистых склонах гор, на полянах у границы леса, обычно.

Энд. ЧКУ, ERL.

573. **Cerastium glomeratum* Thuill. – **Ясколка скученноцветковая.**

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах и у дорог, изредка.

574. #*Cerastium glutinosum* Fries (#*C. pallens* (F.W. Schultz) F.W. Schultz; #*C. pumilum* ssp. *glutinosum* (Fr.) Jalas; #*C. pumilum* ssp. *pallens* (F.W. Schultz) Schinz & Thell.) – **Ясколка клейкая.**

Одн., цв. IV-V. Открытые поляны, район Горного озера, изредка.

575. **Cerastium holosteoides* Fr. (*C. caespitosum* Gilib., nom. inval.; #*C. caespitosum* ssp. *triviale* (Spenn.) Hiitonen; #*C. fontanum* ssp. *holosteoides* (Fr.) Salman, Ommering & de Voogd; #*C. fontanum* ssp. *triviale* (Spenn.) Jalas; #*C. fontanum* ssp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet; #*C. holosteoides* ssp. *triviale* (Spenn.) Moschl; #*C. rigidulum* Takeda; #*C. triviale* Link nom. illeg.; #*C. vulgare* Hartm.; #*C. vulgatum* auct.) – **Ясколка костенецевидная.**

Одн., цв. V-VI. Травянистые лесные поляны в пойме р. Альма, довольно часто.

576. *Cerastium nemorale* M. Bieb. – **Ясколка лесная.**

Одн., цв. V-VI. Бабуган, сбор В. Косых (1980).

577. **Cerastium tauricum* Spreng. (#*C. brachypetalum* Desp. ex Pers. #*C. brachypetalum* f. *tauricum* (Spreng.) Prodan; #*C. brachypetalum* Pers. ssp. *tauricum* (Spreng.) Murb.) – **Ясколка крымская.**

Одн., цв. IV-V. Сухие лесные поляны и каменистые склоны по долине р. Альма, изредка.

578. **Coronaria coriacea* (Moench) Schischk. & Gorschk. (*Lychnis coronaria* (L.) Desr.) – **Горицвет кожистый.**

Мн., цв. VI-VII. На сухих полянах, в светлых лесах, изредка.

579. **Dianthus armeria* L. – **Гвоздика армериевидная.**

Одн.-двул., цв. VI-VIII. В лесах и на опушках, довольно обычно.

580. **Dianthus capitatus* Balb. ex DC. – **Гвоздика головчатая.**

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах и приайлинских склонах, довольно обычно.

581. *Dianthus humilis* Willd. ex Ledeb. – **Гвоздика низкая.**

Мн., цв. VI-VII. Бабуган, сбор В. Косых (1980).

582. *Elisanthe noctiflora* L. (*Melandrium noctiflorum* (L.) Fr., *Silene noctiflora* L.) – Элизанта ночная.

Одн.-двул., цв. V-VIII. В лесах, на лесных полянах, редко.

583. *Elisanthe viscosa* (L.) Pupr. (*Melandrium viscosum* (L.) Čelak; *Silene viscosa* (L.) Pers.) – Элизанта липкая.

Одн.-двул., цв. V-VIII. Шиферные склоны (Л.С. 94).

584. *Herniaria besseri* Fisch. ex Hornem. (*H. incana* auct. non Lam.) – Грыжник Бессера.

Мн., цв. V-VII. На сухих склонах и полянах, довольно редко.

585. *Herniaria glabra* L. (*Herniaria suavis* Клоков) – Грыжник голый.

Мн., цв. V-VII. На сухих шиферных склонах, яйлах, район Светлой поляны, изредка.

586. *Holosteum umbellatum* L. (*Alcine umbellata* (L.) Lam.; *H. syvachysum* Клеоров) – Костенец зонтичный.

Одн., цв. III-V. На сухих полянах и среди кустарников, район Горного озера, редко.

587. *Kohlrauschia prolifera* (L.) Kunth (*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood) – Кольраушия побегоносная.

Одн., цв. V-VI. На каменистых склонах, остепненных полянах, довольно часто.

588. **Melandrium album* (Mill.) Garcke (#*Lychmis alba* Mill.; #*L. pratensis* Rafn; #*M. dioicum* ssp. *album* (Mill.) D.Love; #*M. pratense* (Rafn) Roehl.; *Silene alba* (Mill.) E.H.L. Krause 1901, non Britt. 1893; #*Silene latifolia* ssp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet; #*S. pratensis* (Rafn) Godr.) – Драма белая.

Одн.-двул., цв. V-X. По обочинам дорог, среди кустарников, в дубовых лесах, не часто.

589. *Melandrium latifolium* (Poir.) Maire (*M. boissieri* Schischk.; *M. divaricatum* (Reichenb.) Fenzl; *Silene latifolia* Poir.) – Драма широколистная.

Одн.-двул., цв. V-VII. На лесных опушках и открытых луговых склонах, на Чатыр-Даге, изредка (Л.П. 274).

590. *Minuartia adenotricha* Schischk. – Минуарция железистая.

Мн., цв. VI-VII. На яйле, каменистых склонах и полянах, обычно. Энд.

591. *Minuartia birjuczensis* Klokov (*M. hybrida* auct. non (Vill.) Schischk.) – Минуарция бирючинская.

Одн., цв. IV-VI. На каменистых и сухих склонах на Бабугане и Чатыр-Даге, изредка (Л.П. 254).

592. *Minuartia euxina* Klokov (*M. aucta* Klokov; *M. setacea* auct. non (Thuill.) Hayek) – Минуарция эвксинская.

Мн., цв. VI-VII. На каменистых, сухих склонах, скалах, на Никитской и Гурзуфской яйлах, изредка (Л.П. 257). Энд.

593. **Minuartia glomerata* (M.Bieb.) Degen – Минуарция скученная.

Одн., цв. V-VI. На скалах, щелочистых и каменистых южных склонах, часто (Г.П. 220).

594. **Minuartia hirsuta* (M.Bieb.) Hand.- Mazz. – Минуарция волосистая.

Мн., цв. V-IX. На яйле, каменистых полянах приайлинских склонов, обычно. Энд.

595. *Minuartia taurica* (Steven) Graebn. (*Alcine taurica* Steven) – Минуарция крымская.

Мн., цв. VI-VII. Среди камней на яйле, редко. Энд. IUCN.

596. **Moehringia trinervia* (L.) Clairv. (*Alcine trinervia* (L.) Crantz; *M. bracteata* Slendz.) – Мерингия трехжилковая.

Одн.-двул., цв. V-VIII. В лесах, на влажных полянах, довольно обычно.

597. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench (*M. sarmaticum* (Zapał.) Sävul. & Rayss.; *Cerastium aquaticum* L.; *Malachium aquaticum* (L.) Fr.) – **Мягковолосник водяной.**

Мн., цв. VI-VII. Под пологом пойменных лесов, по берегам водоемов, редко.

598. *Oberna commutata* (Guss.) Ikonn. (#*Behenantha commutata* (Guss.) Ikonn.; *Silene commutata* Guss.; #*S. cucubalus* ssp. *commutata* (Guss.) Rech. f.; #*S. vulgaris* ssp. *commutata* (Guss.) Hayek; #*S. vulgaris* var. *commutata* (Guss.) Coode & Cullen) – **Оберна замещающая.**

Мн., цв. V-IX. В лесах, на полянах, среди кустарников, на лугах, довольно обычно.

599. **Oberna cserei* (Baumg.) Ikonn. (#*Behen cserei* (Baumg.) Gusul.; #*Behenantha cserei* (Baumg.) Schur; *Silene czerei* Baumg.; *S. coringiifolia* Andr.; #*S. fabaria* auct. p.p.; *S. saponarifolia* Schott & Ledeb.) – **Оберна Сцера.**

Мн., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, южных полянах, довольно часто.

600. **Otites densiflorus* (D'Urv.) Grossh. (*Silene densiflora* D'Urv.) – **Отитес густоцветковый.**

Мн., цв. V-VI. На южных каменистых склонах со степной растительностью, изредка.

601. **Paronychia cephalotes* (M.Bieb.) Bess. (*P. cephalotes* (M.Bieb.) Besser ssp. *pontica* Borhidi; ~*P. pontica* (Borhidi) Claudhri; *P. taurica* Borhidi & Sikura) – **Приноготовник головчатый.**

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, яйлах, обычно.

602. *Pleconax subconica* (Friv.) Šourková (#*Conosilene conica* var. *subconica* (Friv.) A.Löve & Kjellq.; *P. conica* auct. non (L.) Ikonn.; #*Pleconax conica* var. *subconica* (Friv.) A.Löve & Kjellq.; *Silene conica* auct. non L. *S. conica* L. ssp. *subconica* (Friv.) Gavioli; #*Silene subconica* Friv.) – **Плеконакс полуконическая.**

Одн., цв. IV-VI. На остепненных склонах, среди кустарников, на яйлах, редко (Л.С. 93).

603. *Sagina procumbens* L. – **Мшанка лежачая.**

Одн.-двул., цв. VI-VIII. На яйле и увлажненных полянах, редко (Л.С. 84, Вульф, 1947).

604. **Saponaria glutinosa* M.Bieb. – **Мыльнянка клейкая.**

Двул., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, изредка.

605. **Saponaria officinalis* L. – **Мыльнянка лекарственная.**

Одн., цв. VI-IX. В садах, у жилья, по обочинам дорог, изредка.

606. **Scleranthus annuus* L. – **Дивала однолетняя.**

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, просеках, у дорог, довольно обычно.

607. *Scleranthus syvaschicum* Клеоров & *S. tauricus* Schur (*S. polycarpus* auct. non L.; *S. verticillatus* auct. non Tausch) – **Дивала многоплодная.**

Одн., цв. IV-V. На сухих полянах, остепненных склонах, изредка.

608. **Silene bupleuroides* (#*S. longiflora* Ehrh.; *S. mariae* Klokov, *S. multifuga* Klokov; *S. ucrainica* Klokov) – Смолевка володушковая.

Мн., цв. V-VIII. На полянах в верхнем лесном поясе, яйле, не часто.

609. *Silene dichotoma* Ehrh. – **Смолевка вильчатая.**

Одн.-двул., цв. VI-VIII. На травянистых склонах, на Бабугане, изредка (Л.П. 269; Вульф, 1947).

610. *Silene jailensis* N.Rubtz. – **Смолевка яйлинская.**

Мн., цв. VII-VIII. Каменистые обрывы, район «Беседки Ветров» на Гурзуфской яйле, редко. Энд. ЧКУ, IUCN, ERL.

611. **Silene viridiflora* L. – **Смолевка зеленоватая.**

Мн., цв. VI. На лесных опушках и лугах в поясе буковых и смешанных лесов, очень редко. **ЧКУ.**

612. *Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковая.

Мн., цв. VI-VII. В пойменных лесах, на полянах, у дорог, довольно обычно.

613. *Stellaria media (L.) Vill. (Alcine media L.; #Alsinula media (L.) Dostál; S. xanthanthera Pobed.) – Звездчатка средняя, мокрица.

Одн.-двул., цв. II-IX. По сырым местам у жилья, сорное в посевах, у дорог, обычно.

614. Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert (#Saponaria hispanica Mill.; #S. segetalis Neck.; V. pyramidata Medik.; V. segetalis Garcke, nom. illeg.) – Тысячеголов испанский.

Одн., цв. V-VIII. В посевах и на сорных местах (Л.С. 96, YALT). Адв.

Celastraceae R. Br. – Бересклетовые

615. *Euonymus europaea L. (#E. bulgarica Velen.; #E. europaea f. bulgarica (Velen.) Gancev; E. floribunda Steven; E. medirossica Klokov; #E. suberosa Klokov) – Бересклет европейский.

Куст., цв. V. В лесах, кустарниковых зарослях по долине р. Альма, не часто.

616. *Euonymus latifolia (L.) Mill. (#E. europaea beta latifolia L.; Kalonymus latifolia (L.) Prokh.) – Бересклет широколистный.

Куст., цв. V. В лесах, часто буковых, по тенистым балкам, обычно.

617. *Euonymus verrucosa Scop. – Бересклет бородавчатый.

Куст., цв. V-VI. Среди кустарников, в пойменных лесах, на каменистых склонах, обычно.

Ceratophyllaceae S.F. Gray – Роголистниковые

618. *Ceratophyllum submersum L. – Роголистник полупогруженный.

Мн., цв. VI-IX. В лесных озерах у бывш. Каракаминской дачи (Г.П. 238).

Chenopodiaceae Vent. – Маревые

619. *Atriplex hortensis L. – Лебеда садовая.

Одн., цв. VII-VIII. Сорное на огородах и у жилья, в нижней зоне, довольно часто. Адв.

620. Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. – Лебеда продолговатая.

Одн., цв. VII-IX. Сорное в посевах, изредка.

621. *Beta trigyna Waldst. & Kit. – Свекла трехстолбиковая.

Мн., цв. V-VI. У дорог, по берегам рек среди зарослей, редко.

622. Chenopodium album L. (#Ch. album ssp. virgatum (Thunb.) Blom; #Ch. centrourbrum (Makino) Nakai; #Ch. giganteum auct.; Ch. leiospermum DC.; #Ch. virgatum Thunb.; #Ch. viride auct.) – Марь белая.

Одн., цв. VII-IX. Сорное в посевах, у жилья, изредка.

623. *Chenopodium foliosum Asch. (#Ch. korshinskyi Litv.; #Monolepis litwinowii Paulsen) – Марь многолистная.

Одн., цв. VII-VIII. На вырубках, полянах, у дорог, в посевах, сорное, довольно обычно.

624. *Chenopodium hybridum L. – Марь гибридная.

Одн., цв. VII-IX. Сорное в посевах и у жилья, изредка. Адв.

625. *Chenopodium polyspermum L. (Ch. acutifolium Smith.) – Марь многосемянная.

Одн., цв. VII-VIII. В посевах, у дорог, по берегам болотцев и водоемов, обычно. Адв.

Cistaceae Juss. – Ладанниковые

626. **Fumana procumbens* (Dun.) Gren. & Godr. (*Cistus fumana* L.) – Фумана лежачая.

Полукуст., цв. IV-VII. На сухих склонах со степной растительностью, редко (Г.П. 460).

627. **Helianthemum canum* (L.) Hornem. (*Rhodax canum* (L.) Fuss.; incl. *H. cretaceum* (Rupr.) Juz., *H. cretophilum* Klok. & Dobrocz.) – Солнцецвет седой.

Полукуст., цв. V-VII. На каменистых склонах, горных луговинах, яйлах (Г.П. 459).
ЧКУ.

628. **Helianthemum chamaecystus* Mill. (#*H. hirsutum* (Truill.) Mérat; *H. ovatum* (Viv.) Dun.) – Солнцецвет яйцевидный.

Полукуст., цв. VI-VII. На сухих склонах, горных лугах, в светлых лесах, изредка.

629. *Helianthemum grandiflorum* (Scop.) DC. (*H. nummularium* (L.) Mill. ssp. *grandiflorum* (Scop.) Schintz & Thell.; *H. tauricum* Sweet) – Солнцецвет крупноцветковый.

Полукуст., цв. VI-VIII. На луговинах яйлы, лесных полянах, горных склонах, обычно.

630. *Helianthemum nitidum* Clementi (*H. nummularium* (L.) Mill. ssp. *grandiflorum* (Scop.) Schintz & Thell.; *H. tauricum* Sweet) – Солнцецвет блестящий.

Полукуст., цв. V-VII. На яйлах и приайлинских склонах, редко.

631. *Helianthemum orientale* (Grosser) Juz. & Pozdeeva (*H. oelandicum* (L.) DC. ssp. *orientale* (Grosser) Proctor; *Rhodax orientalis* (Grosser) Holub) – Солнцецвет восточный.

Полукуст., цв. V-VII. На яйлах, открытых каменистых склонах, обычно.

632. *Helianthemum stevenii* Rupr. ex Juz. & Pozdeeva (#*H. canum* ssp. *stevenii* (Rupr. ex Juz. & Pozdeeva) M.Proctor; #*H. oelandicum* ssp. *stevenii* (Juz. & Pozdeeva) Greuter & Burdet; *Rhodax stevenii* (Rupr. ex Juz. & Pozdeeva) Holub) – Солнцецвет Стевена.

Полукуст., цв. V-VII. На сухих каменистых местах, обрывах, яйлах, довольно обычно. Энд.

Clusiaceae (=Hypericaceae Juss.; Guttiferae auct.) – Зверобойные

633. **Hypericum elongatum* Ledeb. (#*H. antasiaticum* Grossh.; #*H. apricum* Kar. & Kir.; #*H. davisii* N.Robson; #*H. elongatum* ssp. *apiculatum* N.Robson; #*H. hyssopifolium* auct. p.p.; #*H. hyssopifolium* ssp. *elongatum* (Ledeb.) Woronow; #*H. karjaginii* Rzazade) – Зверобой удлиненный.

Мн., цв. VI-VII. На сухих каменистых склонах г. Черная и на Инжер-Сырте (Г.П. 454).

634. **Hypericum hirsutum* L. – Зверобой жестковолосый.

Мн., цв. V-VII. На лесных полянах, среди кустарников, изредка.

635. **Hypericum perforatum* L. (#*H. komarovii* Gorschk.; #*H. nachitschevanicum* Grossh.) – Зверобой продырявленный.

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, среди кустарников, на вырубках и ветровалах, обычно.

636. **Hypericum tauricum* R.Keller (*H. alpestre* (Steven ex Woronov) Gorschk.; *H. linarioides* Bosse) – Зверобой крымский.

Мн., цв. VI-VII. На сухих лесных полянах, приайлинских склонах и яйле, обычно.

Convolvulaceae Juss. – Бьюнковые

637. *Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. (*C. sylvestris* Roem. & Schult., nom. illeg.) – Полевой лесной.

Мн., цв. V-VII. В лесах и на полянах, изредка.

638. **Convolvulus arvensis* L. – Вьюнок полевой.

Мн., цв. VI-X. На огородах, у дорог, жилья, обычно.

639. **Convolvulus cantabrica* L. – Вьюнок кантабрийский.

Мн., цв. I-VIII. На сухих полянах, каменистых склонах, обычно.

640. **Convolvulus tauricus* (Bornm.) Juz. (*C. calvertii* Boiss. ssp. *tauricus* (Bornm.) Smoljjan.) – Вьюнок крымский.

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах гор и яйлы, довольно обычно.

Cornaceae Dumort. – Кизилковые

641. **Cornus mas* L. – Кизил мужской.

Куст, цв. III-V. В лесах, по долинам рек, по всей территории обычно.

642. **Swida australis* (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh. (*Cornus australis* C.A. Mey.; #*C. sanguinea* ssp. *australis* (C.A. Mey.) Jav.; #*S. sanguinea* ssp. *australis* (C.A. Mey.) Kubat; #*S. sanguinea* ssp. *australis* (C.A. Mey.) Soják, comb. superfl.; #*S. sanguinea* ssp. *australis* (C.A. Mey.) Takht., comb. superfl.; *Thelycrania australis* (C.A. Mey.) Sanadze) – Свидина южная.

Дер., куст., цв. VI-VII. В лесах, среди кустарников, по всей территории, обычно.

Corylaceae Mirb. – Лещиновые

643. **Carpinus betulus* L. (#*C. caucasica* Grossh.) – Граб обыкновенный.

Дер., цв. III-IV. По всей территории, как сопутствующая или лесообразующая порода, обычно.

644. **Carpinus orientalis* Mill. – Граб восточный, грабинник.

Куст., дер., цв. IV-V. В дубовых, грабовых лесах в виде подлеска или образует кустарниковые заросли, обычно.

645. **Corylus avellana* L. – Лещина обыкновенная.

Куст., цв. III-IV. В пойме р. Альма – заросли, в дубовых и буковых лесах как подлесок.

Crassulaceae DC. – Толстянковые

646. **Sedum acre* L. – Очиток едкий.

Мн., цв. V-VIII. На каменистых склонах, осыпях, лесных полянах, довольно обычно.

647. *Sedum album* L. (#*Oreosedum album* (L.) Grulich) – Очиток белый.

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, осыпях, полянах, редко.

648. *Sedum hispanicum* L. – Очиток испанский.

Одн.-двул., цв. VI-VII. На каменистых осыпях ю-в. склонов г. Черная, изредка.

649. **Sedum pallidum* M.Bieb. – Очиток бледный.

Одн.-двул., цв. V-VII. На каменистых полянах, скалах, в лесах, по всей территории, обычно.

650. ! *Sedum spurium* M.Bieb. (#*Asterosedum spurium* (M.Bieb.) Grulich; *Spathulata spuria* (M.Bieb.) A.Löve & D.Löve) – Очиток ложный.

Мн., цв. VI-VIII. На месте монастырского сада в Центральной котловине (Л.С. 124). Адв.

Cuscutaceae Dumort. – Повиликовые

651. *Cuscuta alba* J.Presl & C.Presl – Повилика белая.

Одн., цв. VI-VIII. Близ Космодемьяновского монастыря, на *Acinos* sp., сбор Алексеенко (Вульф, 1966).

652. **Cuscuta approximata* Bab. (#*C. cupulata* Engelm.) – Повилика сближенная.

Одн., цв. VI-VIII. На полянах и склонах со степной растительностью, обычно.

653. **Cuscuta epithymum* (L.) L. (#*C. europaea* var. *epithymum* L.; #*C. trifolii* Bab.) – Повилика тимьянная.

Одн., цв. VI-VIII. На травянистых склонах и полянах, обычно.

654. **Cuscuta europaea* L. (#*C. viciae* W.D.J.Koch, W.Schnizl. & Schonh.) – Повилика европейская.

Одн., цв. VI-VIII. На сорных местах, в посевах, на лесных полянах, у дорог, обычно.

Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые

655. **Cephalaria coriacea* (Willd.) Steud. – Головчатка кожистая.

Мн., цв. VII-IX. На южных каменистых склонах, в разреженных дубовых лесах со степной растительностью (Г.П. 686).

656. *Cephalaria uralensis* (Murr.) Roem. & Schult. – Головчатка уральская.

Мн., цв. VI-VII. На яйле, каменистых горных склонах, изредка.

657. **Dipsacus laciniatus* L. – Ворсянка разрезная.

Двул., цв. VI-VII. На лесных полянах, вырубках, у дорог, обычно.

658. **Dipsacus pilosus* L. (#*Dipsacella pilosa* (L.) Soják; *Virga pilosa* (L.) Hill) – Ворсянка волосистая.

Двул., цв. VII. В светлых лесах, на полянах, у дорог, обычно.

659. *Dipsacus strigosus* Willd. ex Roem. & Schult. (#*Virga strigosa* (Willd. ex Roem. & Schult.) Holub) – Ворсянка щетинистая.

Двул., цв. VI-VII. На лесных полянах, сорных местах, у дорог, изредка.

660. **Dipsacus sylvestris* Huds. (*D. fullonum* L. p.p., nom. ambig.) – Ворсянка лесная.

Двул., цв. VI-VII. Поляны в долине р. Альмы, у дорог, в районе Хыр-Алана, редко.

661. **Knautia arvensis* (L.) Coult. (*Scabiosa arvensis* L.; *S. campestris* Andrz. ex Besser; #*Trichera arvensis* (L.) Schrad.) – Короставник полевой.

Мн., цв. VI-IX. На лесных полянах, среди кустарников, на травянистых склонах, обычно.

662. **Scabiosa columbaria* L. – Скабиоза голубиная.

Мн., цв. VI-VII. На полянах, лесных опушках, луговинах яйлы, обычно.

663. **Scabiosa micrantha* Desf. (*Lomelosia micrantha* (Desf.) Greuter & Burdet; #*Trochocephalus micranthus* (Desf.) A. Löve & D. Löve) – Скабиоза мелкоцветковая.

Двул., цв. V-VI. На сухих склонах и полянах, изредка (Г.П. 689).

Euphorbiaceae Juss. – Молочайные

664. **Euphorbia agraria* M.Bieb. (*Tithymalus agrarius* (M.Bieb.) Klotzsch & Garcke) – Молочай пашенный.

Мн., цв. V-VI. На сухих каменистых полянах, среди кустарников, изредка.

665. **Euphorbia amygdaloides* L. (*Tithymalus amygdaloides* (L.) Garsault.) – Молочай миндалевидный.

Мн., цв. IV-V. В лесах, особенно буковых, очень обычно.

666. **Euphorbia glareosa* Pall. ex M.Bieb. (#*E. maleevii* Tamamsch.; #*E. nicaeensis* ssp. *glareosa* (Pall. ex M.Bieb.) A.R.Smith; #*E. nicaeensis* ssp. *maleevii* (Tamamsch.) Quedjans; *Tithymalus glareosus* (Pall. ex M.Bieb.) Prokh.) – Молочай хрящеватый.

Мн., цв. V-VI. Каменистые склоны и поляны, обычно.

667. *Euphorbia helioscopia L. (*Tithymalus helioscopia* (L.) Hill.) – **Молочай солнцегляд.**

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах и полянах, ка менистых осыпях, довольно редко.

668. Euphorbia myrsinites L. (*Tithymalus mirsinites* (L.) Hill) – **Молочай миртолистный.**

Мн., цв. IV-V. На каменистых склонах Бабуган-яйлы, редко (Л.П. 528).

669. *Euphorbia petrophila С.А.Меу. (*E. subhastifolia* Klokov; *Tithymalus petrophilus* (С.А.Меу.) Soják) – **Молочай камнелюбивый.**

Мн., цв. IV-V. На скалах, каменистых склонах, довольно обычно.

670. Euphorbia platyphyllos L. (*Tithymalus platyphellos* (L.) Hill) – **Молочай расширеннолистный.**

Одн., цв. IV-V. По лесным вырубкам и полянам, редко.

671. Euphorbia seguierana Neck. (*Tithymalus seguieranus* (Neck.) Prokh) – **Молочай Сегиев.**

Мн., цв. V-VI. На сухих полянах, очень редко.

672. *Euphorbia stricta L. (*E. serrulata* Thuill.; *Tithymalus strictus* (L.) Klotzsch & Garcke) – **Молочай прямой.**

Одн., цв. IV-V. В светлых лесах, на полянах, вырубках, у дорог, обычно.

673. *Euphorbia taurinensis All. (*E. graeca* Boiss. & Sprun.; *Tithymalus taurinensis* (L.) Klotzsch & Garcke) – **Молочай греческий.**

Одн., цв. IV-VI. На каменистых склонах, полянах, осыпях, обычно.

674. *Euphorbia virgata Waldst & Kit. (*E. kitaibeli* Klokov ex Dubovik, nom. inval.; *E. tommasiniana* Bertol; *E. virgultosa* Klokov; *E. waldsteinii* (Soják) Czerep.; *Tithymalus* sp.) – **Молочай лозный.**

Мн., цв. IV-VII. Среди кустарников, на полянах, изредка.

675. *Mercurialis perennis L. – **Пролесник многолетний.**

Мн., цв. IV-V. В лесах, на опушках, очень обычно.

Fabaceae Lindl. (=Leguminosae Juss.) – Бобовые, мотыльковые

676. *Anthyllis biebersteiniana Popl. (#*A. daghestanica* Chinth.; #*A. vulneraria* var. *biebersteiniana* Taliev nom. provis.; #*A. vulneraria* ssp. *pulchella* auct. p.p.) – **Язвенник Биберштейна.**

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, луговинах яйлы, обычно.

677. *Anthyllis macrocephala Wender. x A. schiwereckii (DC.) Blocki (#*A. grossheimii* Chinth., p.p. excl. typo; *A. polyphylla* auct. non (DC.) Kit. ex Loudon; #*A. vulneraria* ssp. *polyphylla* (Ser.) Numan) – **Язвенник многолистный.**

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, у дорог, по сухим склонам, изредка (Вульф, 1960). Энд.

678. *Anthyllis taurica Juz. (*A. vulneraria* L. ssp. *boissieri* (Sagorski) Bornm.) – **Язвенник крымский.**

Мн., цв. VI-VII. На скалистых обнажениях, каменистых склонах яйлы, изредка (Вульф, 1960). Энд.

679. Argyrolobium biebersteinii P.W.Ball (*A. calycinum* (M.Bieb.) Jaub. & Spach, nom. illeg.; *A. pauciflorum* (M.Bieb. ex Willd.) Hayek 1926, non Eckl. & Zeyh. 1836; *Cytisus calycinum* M.Bieb., nom. illeg.; *C. pauciflorus* M.Bieb. ex Willd.) – **Аргиролобиум Биберштейна.**

Мн., цв. V-VII. На опушках светлых лесов, на южном макросклоне (Л.С. 151; Вульф, 1960, YALT).

680. *Astragalus cicer L. – Астрагал нутовый.

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, лесосеках, изредка.

681. *Astragalus glycyphylloides DC. (#A. fraxinifolius auct.; A. glycyphyllos L. ssp. glycyphylloides (DC.) V.A.Matthews) – Астрагал ложносладолистный.

Мн., цв. VI-VIII. В дубовых и дубово-ясеневых лесах, редко (Г.П. 388).

682. *Astragalus glycyphyllos L. – Астрагал сладколистный.

Мн., цв. V-VI. В дубовых и буковых лесах, на полянах, у дорог, обычно.

683. *Astragalus onobrychis L. (#A. borysthenticus Klokov; #A. hybridus S.G.Gmel.; A. pseudonobrychis Andr.; #A. troizkii Grossh.) – Астрагал эспарцетный.

Мн., цв. V-VIII. На сухих полянах, шиферных склонах, в дубовых, грабовых лесах, довольно обычно.

684. Bituminaria bituminosa (L.) Stirton (#Asphaltium bituminosum (L.) Medikus; Psoralea bituminosa L.; #P. palaestina Gouan) – Битуминария смолистая.

Мн., цв. VI-VII. В светлых, преимущественно сосновых лесах, у дорог, нередко.

685. *Chamaecytisus polytrichus (M.Bieb.) Rothm. (#Ch. hirsutus ssp. polytrichus (M.Bieb.) Ponert; #Cytisus polytrichus M.Bieb.) – Ракитник многоволосковый.

Куст., цв. V-VI. На кфменистых обнажениях, в светлых лесах и на яйле, довольно часто.

686. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klásková (#Ch. caucasicus (Grossh.) Holub; #Ch. ratisbonensis ssp. ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Zielinski; #Cytisus caucasicus Grossh.; #C. ruthenicus Fisch. ex Woloszcz.) – Ракитник русский.

Куст., цв. V-VI. На Бабугане, сбор В. Косых (1980).

687. Chamaecytisus wulfii (V.Krecz.) Klaskova (#Cytisus wulfii V.Krecz.) – Ракитник Вульфа.

Куст., цв. V-VI. На Никитской яйле, сбор В.Косых (1980). Энд. ЧКУ, ERL.

688. ! Colutea arborescens L. – Пузырник древовидный.

Дер., цв. V. На поляне в сосновом лесу у корд. «Земляничная поляна». Адв.

689. Colutea cilicica Boiss. & Balansa (C. arborescens L. ssp. cilicica (Boiss. & Balansa) Ponert) – Пузырник киликийский.

Дер., цв. V-VI. В сухих лесах, среди кустарников на южных склонах, редко.

690. *Coronilla coronata L. (C. montana Scop.) – Вязель увенчанный.

Мн., цв. V-VI. В сосновых лесах, на южных каменистых склонах, у дорог, обычно.

691. *Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch – Вязель завитой.

Одн., цв. IV-V. На сухих полянах, южных щебнистых склонах, довольно редко.

692. *Dorycnium graecum (L.) Ser. (D. latifolium Willd.) – Дорикниум греческий.

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, щебнистых склонах, довольно обычно.

693. *Dorycnium herbaceum Vill. (D. intermedium Ledeb.; #D. pentaphyllum ssp. herbaceum (Vill.) Rouy) – Дорикниум средний.

Мн., цв. V-VI. На остепненных склонах, полянах, у дорог, обычно.

694. *Galega officinalis L. – Козлятник лекарственный.

Мн., цв. VI-VII. По долине р. Альма, у дорог, среди кустарников, довольно часто.

695. *Genista albida Willd. – Дрок беловатый.

Куст., цв. V-VI. На каменистых склонах, яйлах, довольно часто.

696. Genista scythica Pacz. – Дрок скифский.

Куст., цв. V-VI. На каменистых склонах, яйлах, изредка (Л.П. 431). ЧКУ.

697. *Genista depressa M.Bieb. (G. tinctoria L. var. depressa (M.Bieb.) Schmalh.) – Дрок прижатый.

Куст., цв. VI-VII. На каменистых местах, скалистых склонах и осыпях, на яйле, изредка.

698. *Genista juzepczukii* Tzvelev (*G. pilosa* auct. non L.) – Дрок Юзепчука.

Куст., цв. VII. На Бабуган-яйле (Вульф, 1960).

699. *Glycyrrhiza glabra* L. (#*G. glabra* ssp. *glandulifera* (Waldst. & Kit.) Ponert; #*G. glandulifera* Waldst. & Kit.; *G. hirsuta* Pall.) – Солодка голая.

Мн., цв. V-VI. В буковых лесах по р. Аспорт (Вульф, 1960).

700. **Hedysarum candidum* M.Bieb. – Копеечник бледный.

Мн., цв. V-VI. На скалисто-каменистом склоне хр. Яман-Дере, скалах Чатыр-Дага, единично (Г.П. 394).

701. *Hippocrepis emeroïdes* (Boiss. & Spruner) Czerep. (*Coronilla emeroïdes* Boiss. & Sprun.; #*C. emerus* ssp. *emeroïdes* (Boiss. & Sprun.) Hayek; #*C. emerus* ssp. *emeroïdes* (Boiss. & Sprun.) Holmboe; #*H. emerus* ssp. *emeroïdes* (Boiss. & Sprun.) Lassen) – Подковник эмеровидный.

Куст., цв. V-VI. В светлых лесах, на Никитской яйле, изредка (Л.С. 166, YALT).

702. *Lathyrus aureus* (Steven) Brandza (#*Orobis aureus* Steven) – Чина золотистая.

Мн., цв. V-VI. В лесах, на полянах, у дорог, по всей территории, обычно.

703. *Lathyrus cicera* L. – Чина нутовая.

Одн., цв. IV-VI. В дубово-грабовых, дубовых лесах, на полянах, изредка.

704. **Lathyrus laxiflorus* (Desf.) O.Kuntze (*Orobis laxiflorus* Desf.) – Чина редкоцветковая.

Мн., цв. IV-V. В лесах и на полянах, довольно обычно.

705. **Lathyrus niger* (L.) Bernh. (*Orobis niger* L.) – Чина черная.

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, в светлых лесах, довольно обычно.

706. **Lathyrus nissolia* L. (*Orobis nissolia* (L.) Döll.) – Чина злаколистная.

Одн., цв. VI. В светлых лесах, на полянах и луговинах, обычно.

707. *Lathyrus pallescens* (M.Bieb.) K.Koch (#*Orobis canescens* auct.; #*O. filiformis* auct.; *O. pallescens* M.Bieb.) – Чина бледнеющая.

Мн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, довольно обычно.

708. **Lathyrus pannonicus* (Jacq.) Garcke (*L. austriacus* (Crantz) Wissjul.; *Orobis austriacus* Crantz; *O. pannonicus* Jacq.) – Чина паннонская.

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, яйлинских склонах, в дубовых лесах, довольно обычно.

709. **Lathyrus pratensis* L. (*Orobis pratensis* L.) Döll.) – Чина луговая.

Мн., цв. VI-VII. В светлых лесах и на полянах с луговой растительностью, обычно.

710. **Lathyrus rotundifolius* Willd. – Чина круглолистная.

Мн., цв. V-VI. В лиственных лесах, среди кустарников, у дорог, обычно.

711. **Lathyrus tuberosus* L. – Чина клубненосная.

Мн., цв. V-VI. Сорное в огородах, у дорог, изредка. Адв.

712. *Lotus angustissimus* L. – Лядвенец узкий.

Одн.-двул, цв. VI-VII. На влажных и затененных местах, по берегам рек (Л.С. 163, Вульф, 1960, YALT).

713. **Lotus corniculatus* L. – Лядвенец рогатый.

Мн., цв. VI-VII. На луговинах, в долинах рек, обычно.

714. *Lotus tauricus* Juz. (*L. caucasicus* auct. non Kuprian. ex Juz.) – Лядвенец крымский.

Мн., цв. VI-VIII. На скалах и известняковых склонах, на яйлах (Л.С. 162, Вульф, 1960). Энд.

715. **Medicago falcata* L. aggr. (#*M. borealis* Grossh.; #*M. glutinosa* ssp. *praefalcata* Sinsk.; #*M. procumbens* Besser; #*M. quasifalcata* Sinskaya; #*M. sativa* ssp. *falcata* (L.) Arcang.) – **Люцерна серповидная.**

Мн., цв. V-VII. На сухих склонах и луговинах яйлы, у дорог, на лесных полянах, по всей территории, обычно.

716. **Medicago lupulina* L. – **Люцерна хмелевидная.**

Одн.-двул, цв. IV-V. На каменистых склонах с луговой растительностью, сорное у дорог, обычно.

717. **Medicago minima* (L.) Bortal. (#*M. polymorpha* var. *minima* L.) – **Люцерна маленькая.**

Одн.-двул, цв. III-IV. На каменистых нагреваемых склонах, довольно часто (Г.П. 370).

718. *Medicago orbicularis* (L.) Bortal. (*M. marginata* Willd.; #*M. polymorpha* var. *orbicularis* L.) – **Люцерна округлая.**

Одн., цв. IV-V. На полянах, залежах, изредка.

719. *Medicago praecox* DC. – **Люцерна ранняя.**

Одн., цв. III-IV. На сухих лесных полянах, изредка.

720. *Medicago romanica* Prod. (*M. erecta* Kotov 1940 non Winterl.; #*M. falcata* L. ssp. *romanica* (Prodán) Schwarz & Klinkovski; #*M. falcata* var. *romanica* (Prodan) Hayek; #*M. falcata* ssp. *teneriensis* (Opperm. ex Klok.) Vass.; #*M. kotovii* Wissjul., nom. inval.; #*M. tenderiensis* Opperm. ex Klovov) – **Люцерна румынская.**

Мн., цв. VI-VII. На остепненных полянах, редко (Л.С. 153, Вульф, 1960).

721. **Medicago sativa* L. (#*M. afghanica* (Bordere) Vassilcz.; #*M. glomerata* Balb.; #*M. grandiflora* (Grossh.) Vassilcz.; #*M. ladak* Vassilcz.; #*M. mesopotamica* Vassilcz.; #*M. orientalis* Vassilcz.; #*M. polia* (Brand) Vassilcz.; #*M. praesativa* Sinskaya; #*M. praesativa* ssp. *spontanea* Sinsk.; #*M. sativa* grex *afganica* Bord.; #*M. sativa* var. *polia* Brand; #*M. sogdiana* (Brand) Vassilcz.) – **Люцерна посевная.**

Мн., цв. V-VII. На луговых полянах, редко. Адв.

722. **Melilotus officinalis* (L.) Pall. (*M. arvensis* Wallr.) – **Донник лекарственный.**

Двул, цв. VI-VII. На лугах, у дорог, жилья, в посевах, сорное, обычно.

723. *Melilotus tauricus* (M.Bieb.) Ser. – **Донник крымский.**

Одн.-двул, цв. V-VI. На луговинах и полянах, в Ялтинском лесн-ве, довольно обычно.

724. *Onobrychis jaiilae* Czernova – **Эспарцет яйлинский.**

Мн., цв. VI-VII. На яйле, по склонам гор, изредка. Энд.

725. **Onobrychis miniata* Steven (*Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. ssp. *miniata* (Steven) P.W.Pall.) – **Эспарцет киноварно-красный.**

Мн., цв. VI-VII. На яйле и приайлинских склонах, обычно.

726. *Onobrychis transcaucasica* Grossh. – **Эспарцет закавказский.**

Мн., цв. VI-VII. На сухих полянах и склонах, изредка.

727. *Onobrychis viciifolia* Scop. – **Эспарцет виколистный, посевной.**

Мн., цв. VI-VII. Район Форелевого хоз-ва. Адв.

728. *Ononis leiosperma* Boiss. (#*O. repens* ssp. *leiosperma* (Boiss.) Greuter; #*O. spinosa* ssp. *leiosperma* (Boiss.) Sirj.) – **Стальник гладкосеменной.**

Мн., цв. VI-VII. На злаково-разнотравном лугу, район Горного озера, редко.

729. **Oxytropis pilosa* (L.) DC. – **Остролодочник волосистый.**

Мн., цв. V-VI. На южных склонах, редко (Г.П. 386).

730. *Pisum elatius* M.Bieb. (#*P. humile* Boiss & Noe; #*P. sativum* L. ssp. *elatius* (M.Bieb.) Asch. & Graebn., *P. sativum* var. *elatius* (M.Bieb.) Trautv.) – **Горох высокий.**

Одн., цв. V. Собран однажды у дороги, в районе Хыр-Алана. **ЧКУ.**

731. *Securigera cretica (L.) Lassen (Coronilla cretica L.) – Секуригера критская.

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах (Л.С. 167, YALT).

732. *Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla varia L.) – Секуригера пестрая.

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, у дорог, по всей территории, обычно.

733. Sophora alopecuroides L. ssp. jaubertii (Spach) Borsa (#Goebelia alopecuroides (L.) Bunge; #G. alopecuroides beta tomentosa Bunge; #Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet; #S. alopecuroides L.; #S. alopecuroides var. tomentosa (Bunge) Chamberlain; #S. alopecuroides ssp. tomentosa (Bunge) Ponert; #S. alopecuroides ssp. tomentosa (Bunge) Yakovl.; S. prodanii E.S.Anderson; Vexibia alopecuroides (L.) Yakovl.; #V. alopecuroides ssp. tomentosa (Bunge) Yakovl.) – Софора лисохвостная.

Мн., цв. V-VI. На светлых лесных полянах. В районе Светлой поляны, корд. Тарьер, ущ. Уч-Кош. Вероятно заносное. **ЧКУ.**

734. Trifolium alpestre L. – Клевер альпийский.

Мн., цв. VI-VII. На полянах, среди кустарников на яйле, довольно обычно.

735. *Trifolium ambiguum M.Bieb. (Amoria ambigua (M.Bieb.) Soják) – Клевер сходный.

Мн., цв. V-VI. На горных лугах, лесных полянах, обычно.

736. *Trifolium arvense L. (T. eriocephalum Ledeb.) – Клевер пашенный.

Одн., цв. V-VI. На сухих полянах, в редколесье, у дорог, изредка.

737. Trifolium aureum Pollich (Chrysaspis aurea (Pollich.) Greene; T. agrarium L., nom. utique rej. prop.; T. strepens Crantz) – Клевер золотистый.

Одн., цв. VI-VII. На лугах, среди кустарников, не часто.

738. *Trifolium campestre Schreb. (Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv.; T. procumbens L., nom. utique rej. prop.) – Клевер полевой.

Одн., цв. VII. На сухих полянах и склонах, изредка.

739. *Trifolium caucasicum Tausch (#T. marschalii Rouy; #T. ochroleucon auct. p.p.; #T. ochroleucon ssp. caucasicum (Tausch) Kozhukharov; #T. panormitanum auct.; #T. topczibashevii Khalilov) – Клевер кавказский.

Мн., цв. VI-VII. На светлых сухих полянах, изредка.

740. Trifolium hirtum All. – Клевер мохнатый.

Одн., цв. IV-V. На открытых полянах в сосновых и смешанных лесах, редко.

741. Trifolium hybridum L. (Amoria hybrida (L.) C.Presl; #A. hybrida ssp. elegans (Savi) Soják; #T. elegans Savi; #T. hybridum L.; #T. hybridum ssp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.; #T. hybridum var. elegans (Savi) Boiss.) – Клевер гибридный.

Мн., цв. IV-V. Поляна в долине р. Альма, редко.

742. *Trifolium medium L. – Клевер средний.

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах и опушках, по всей территории, довольно обычно.

743. *Trifolium montanum L. (Amoria montana (L.) Soják) – Клевер горный.

Мн., цв. VI-VII. На полянах в лиственных лесах, изредка.

744. *Trifolium pratense L. (#T. ucrainicum Orperman ex Wissjul.) – Клевер луговой.

Мн., цв. VI-VII. На открытых склонах и луговинах яйлы, обычно.

745. Trifolium repens L. (Amoria repens (L.) C.Presl; #A. repens ssp. orbelica (Velen.) Soják; #T. orbelicum Velen.; #T. repens ssp. orbelicum (Vel.) Pawl.) – Клевер ползучий.

Мн., цв. V-VIII. На влажных лесных полянах, по долинам рек, обычно.

746. Trifolium scabrum L. – Клевер шершавый.

Одн., цв. IV-V. На сухих луговинах, район Ольховой поляны, редко.

747. **Trigonella striata* L.f. (*T. tenuis* Fisch. ex Vieb.) – Пажитник тонкий.

Одн., цв. V-VI. Каменистый склон на хр. Веселый (Г.П. 367).

748. *Vicia cassubica* L. – Вика кашубская.

Одн., цв. VI-VII. В лиственных лесах, на полянах, у дорог, довольно обычно.

749. **Vicia ciliatula* Lipsky – Вика реснитчатая.

Одн., цв. V-VI. На сухих склонах со степной растительностью, хр. Веселый, редко. (Г.П. 396).

750. **Vicia cracca* L. (#*V. heteropus* Freyn; #*V. macrophylla* (Maxim.) B. Fedtsch.; #*V. neglecta* Hanelt & Mettin) – Вика мышинный горошек.

Мн., цв. V-VI. На склонах, лугах и в дубовых лесах, часто (Г.П. 398).

751. *Vicia heracleotica* Juz. (#*V. asiatica* (Freyn) Grossh. *V. dalmatica* auct. non A.Kern.; *V. elegans* auct. non Guss.; #*V. elegans* var. *asiatica* Freyn; #*V. heracleotica* Juz.) – Вика далматская.

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах южных склонов, лесосеках, не часто.

752. **Vicia hirsuta* (L.) S.F.Gray (#*Ervum hirsutum* L.) – Вика волосистая.

Одн., цв. IV-V. На полянах, в светлых лесах, сорное в огородах, довольно обычно. Адв.

753. *Vicia lathyroides* L. (#*Ervum lathyroides* (L.) Stank.) – Вика чиновидная.

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах и полянах, в нижнем лесном поясе, обычно.

754. *Vicia loiseleurii* (M.Bieb.) Litv. (#*Ervum loiseleurii* M.Bieb.; #*E. terronii* Ten.; *V. litvinovii* Boriss.; #*V. meyeri* Boiss.; *V. pubescens* Link.) – Вика Луазелёрии.

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, в окр. корд. Тарьер, редко.

755. **Vicia pannonica* Crantz – Вика паннонская.

Одн., цв. IV-V. На полянах со степной растительностью, не часто (Г.П. 396). Адв.

756. **Vicia tenuifolia* Roth (#*V. brachytropis* Kar. & Kir.; *V. cracca* ssp. *tenuifolia* (Roth) Gaudin) – Вика тонколистная.

Мн., цв. V-VI. На полянах в светлых лесах, среди кустарников, у дорог, обычно.

757. *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. – Вика четырехсемянная.

Одн., цв. IV-V. На сухих полянах, среди кустарников, изредка.

Fagaceae Dumort. – Буковые

758. **Fagus orientalis* Lipsky (*F. sylvatica* L. ssp. *orientalis* (Lipsky) Greuter & Burdet) – Бук восточный.

Дер., цв. IV-V. Лесообразующая порода на северном макросклоне на высоте 400-1350 м.

759. *Fagus sylvatica* L. – Бук обыкновенный.

Дер., цв. IV-V. Там же, где и предыдущий вид, от которого с трудом отличается.

760. **Quercus petraea* Liebl. (#*Q. iberica* var. *polycarpa* (Schur) Zohary; #*Q. polycarpa* Schur; *Q. petraea* Mattuschka, non basionimum; #*Q. robur* L. Spielart *Q. sessiliflora* Salisb.; *Q. sessilis* Ehrh.) – Дуб скальный.

Дер., цв. IV-V. Лесообразующая порода в верхнем горном поясе.

761. **Quercus pubescens* Willd. (#*Q. anatolica* Sosn. ex Bandin p.p. quoad plantas, nom. inval.; #*Q. crispata* Steven; #*Q. lanuginosa* Lam. ssp. *crispata* (Steven) A. Camus; #*Q. pubescens* ssp. *crispata* (Steven) Greuter & Burdet) – Дуб пушистый.

Дер., цв. IV-V. У самых нижних границ заповедника, район Горного озера.

762. **Quercus robur* L. (*Q. pedunculata* Ehrh.) – Дуб черешчатый.

Дер., цв. IV-V. По долине р. Альма, район Светлой поляны, корд. Сосновый, не часто.

Fumariaceae DC. – Дымянковые

763. **Corydalis marschalliana* (Pall. ex Willd) Pers. (*C. bulbosa* (L.) DC. ssp. *marschalliana* (Pers.) Chater, comb. inval.; *C. cava* (L.) Schweigg. & Körte ssp. *marschalliana* (Pall. ex Willd.) Hayek; #*Fumaria marschalliana* Pall.; *F. marschalliana* Pall. ex Willd.; #*Pistlochchia bulbosa* ssp. *marschalliana* (Pall.) Soják; *P. marschalliana* (Pall.) Holub) – **Хохлатка Маршалла.**

Мн., цв. III-V. Под пологом лиственных лесов и на полянах, изредка.

764. **Corydalis paczoskii* N.Busch (*Pistlochchia paczoskii* (N. Busch) Soják) – **Хохлатка Пачоского.**

Мн., цв. III-V. В дубово-грабниковых лесах, на сухих полянах, яйлах, обычно.

765. *Fumaria officinalis* L. – **Дымянка лекарственная.**

Одн., цв. IV-VI. Вдоль дорог, в посевах, обычно. Адв.

766. **Fumaria schleicheri* Soy.-Willem. – **Дымянка Шлейхера.**

Одн., цв. IV-VI. На полянах, у жилья, редко. Адв.

Gentianaceae Juss. – Горечавковые

767. **Centaurium erythraea* Rafn (#*C. erythraea* ssp. *austriacum* (Ronniger) Holub; *C. minus* auct. non Monch.; #*C. minus* ssp. *austriacum* (Ronniger) O. Schwarz; #*C. umbellatum* Gilib.; #*C. umbellatum* ssp. *austriacum* Ronniger) – **Золототысячник обыкновенный.**

Одн., цв. VII-VIII. На лесных полянах, открытых склонах, в нижней и средней зоне, не часто.

768. **Gentiana cruciata* L. (#*Pneumonanthe cruciata* (L.) Zuev; #*Tretorhiza cruciata* (L.) Delarbre; #*T. cruciata* (L.) Opiz) – **Горечавка крестообразная.**

Мн., цв. VII-VIII. На яйле, горных травянистых склонах, лесных опушках, обычно.

769. **Gentianella amarella* (L.) Börner (#*Gentiana amarella* L.; #*G. amarella* ssp. *axillaris* (F.W. Schmidt) Murb.; *G. axillaris* Murb.; #*G. axillaris* (F.W. Schmidt) Rchb.; #*Gentianella amarella* (L.) Harry Sm., comb. superfl.; *G. axillaris* (F.W. Schmidt) A.Löve & D.Löve; #*G. axillaris* (F.W. Schmidt) Jovan.-Dunj.) – **Горечавочка горьковатая.**

Geraniaceae Juss. – Гераниевые

770. **Erodium cicutarium* (L.) L'Her. (*Geranium cicutarium* L.) – **Журавельник цикутный.**

Одн., цв. III-VIII. На каменистых склонах и полянах, у дорог, сорное в посевах, обычно.

771. *Geranium asphodeloides* Burm.f. (*G. tauricum* Rupr.; #*G. pallens* M.Bieb.) – **Герань крымская.**

Мн., цв. IV-V. В светлых лиственных лесах, на полянах, среди кустарников в нижней зоне, не часто.

772. **Geranium collinum* Stephan (#*G. collinum* var. *wakchanicum* Paulsen; *G. londesii* Fisch. ex Link; #*G. minutum* Ikonn.; #*G. wakchanicum* (Paulsen) Ikonn.) – **Герань холмовая.**

Мн., цв. VI-VII. Поляны у вершины г. Черная (Г.П. 415).

773. *Geranium columbinum* L. – **Герань голубиная.**

Одн., цв. V-VI. На сухих склонах и полянах, у дорог, обычно.

774. *Geranium dissectum* L. – Герань рассеченная.

Одн.-двул., цв. IV-V. На лугах, опушках, на яйле (Л.С. 172).

775. **Geranium divaricatum* Ehrh. – Герань растопыренная.

Одн., цв. V-VI. В дубовых, дубово-ясеневых лесах, на каменистых склонах (Г.П. 414).

776. *Geranium lucidum* L. – Герань блестящая.

Одн., цв. IV-V. В светлых лесах, на склонах, обычно.

777. *Geranium molle* L. – Герань мягкая.

Одн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, изредка.

778. *Geranium purpureum* Vill. (*G. robertianum* L. ssp. *purpureum* (Vill.) Schmalh.) – Герань пурпуровая.

Одн., цв. IV-V. В дубовых лесах, на каменистых склонах, не часто.

779. **Geranium pusillum* L. – Герань маленькая.

Одн., цв. IV-V. На полянах, у дорог, сорное, довольно обычно. Адв.

780. **Geranium pyrenaicum* Burmf. – Герань пиренейская.

Двул.-мн., цв. V-VI. На лесных полянах, луговинах, в тенистых местах, обычно.

781. **Geranium robertianum* L. – Герань Роберта.

Одн., цв. IV-V. В лесах и на полянах, на каменистых склонах яйлы, по всей территории, обычно.

782. ? *Geranium rotundifolium* L. – Герань круглолистная.

Одн., цв. IV-V. Как сорное, на Бабугане, редко (Л.П. 504).

783. **Geranium sanguineum* L. – Герань кроваво-красная.

Мн., цв. VI-VII. В лесах, на опушках, на луговинах яйлы, по всей территории, обычно.

Hydrangeaceae Dumort – Гортензиевые

784. ! *Philadelphus coronarius* L. – Чубушник венечный.

Куст., цв. VI. На территории бывшей усадьбы монастыря в Центральной котловине. Адв.

Lamiaceae Lindl. (=Labiatae Juss.) – Губоцветные

785. *Acinos villosus* Pers. (#*A. arvensis* ssp. *eglandulosus* (Klokov) Tzvelev; #*A. arvensis* ssp. *villosus* (Pers.) Soják; *A. eglandulosus* Klokov) – Душевка мохнатая.

Одн.-двул., цв. V-VIII. На сухих склонах, полянах, среди кустарников, обычно.

786. **Ajuga chia* Schreb. (*A. chamaepitys* (L.) Schreb. ssp. *chia* (Schreb.) Arcang.; *Chamaepitys chia* (Schreb.) Holub) – Живучка хиосская.

Мн., цв. III-IX. Сухие щелбистые склоны, поляны, сорное у жилья, чаще в нижней зоне.

787. **Ajuga genevensis* L. – Живучка женеvская.

Мн., цв. V-VII. На полянах в светлых лесах, среди кустарников, не часто.

788. **Ajuga laxmannii* (L.) Benth. (*Phleboanthe laxmannii* (L.) Tausch) – Живучка Лаксмана.

Мн., цв. V-VIII. На открытых полянах со степной растительностью, изредка (Г.П. 561).

789. **Ajuga orientalis* L. – Живучка восточная.

Мн., цв. III-IV. На сухих каменистых склонах, яйлинских лугах, лесных полянах, обычно.

790. **Ballota nigra* L. (*B. borealis* Schweigg.; #*B. foetida* Lam.; #*B. longicalyx* Klokov; #*B. nigra* ssp. *foetida* (Lam.) Hayek; *B. ruberalis* Sw.) – Белокудренник черный.

Мн., цв. VI-VIII. На луговых полянах, у дорог, не часто.

- 791. *Betonica officinalis L.** (#*B. bjelorusica* Kossko ex Klokov; *B. brachyodonta* Klokov; *B. fusca* Klokov; #*B. officinalis* L.; *B. perauca* Klokov; *Stachys betonica* Benth.; *S. officinalis* (L.) Trevir.) – **Буквица лекарственная.**
Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, луговинах яйлы, среди кустарников, у лесных дорог, обычно.
- 792. Calamintha grandiflora (L.) Moench** (*Melissa grandiflora* L.) – **Душевик крупноцветковый.**
Мн., цв. V-VI. В буковых лесах на полянах, довольно обычно.
- 793. Calamintha nepeta (L.) Savi** (#*C. largiflora* Klokov; #*C. officinalis* Moench) – **Душевик котовниковый.**
Мн., цв. VI-IX. На сухих каменистых склонах, редко (Л.С. 238, YALT, Вульф, 1966).
- 794. Chaiturus marrubiastrum (L.) Rchb.** – **Гривохвост шандровый.**
Двул., цв. VI-VII. На сорных местах, у казармы Яголах, корд. Олень (Вульф, 1966). Адв.
- 795. Clinopodium vulgare L.** (*Calamintha clinopodium* Benth.; *C. vulgaris* (L.) Halacsy) – **Пахучка обыкновенная.**
Мн., цв. V-VIII. В светлых лесах, на полянах, среди кустарников, у дорог, обычно.
- 796. Dracosephalum thymiflorum L.** – **Змееголовник тимьяноцветный.**
Одн., цв. VI-VII. У дорог, жилья, на яйле уроч. Красный камень (Л.С. 227; Вульф, 1966). Адв.
- 797. Galeopsis ladanum L.** (*G. intermedia* Vill.; *Dalanum ladanum* (L.) Dostál; #*Ladanum intermedium* (Vill.) Slavíková) – **Пикульник ладанный.**
Одн., цв. VI-VIII. На опушках, у дорог, редко. Адв.
- 798. *Glechoma hederacea L.** – **Будра плюшевидная.**
Мн., цв. III-VI. На лесных полянах, среди кустарников, по долине р. Альма, обычно.
- 799. *Lamium amplexicaule L.** (*L. stepposum* Kossko ex Klokov) – **Яснотка стеблеобъемлющая.**
Одн., цв. III-V. На сухих каменистых склонах, полянах, изредка.
- 800. *Lamium glaberrimum (C. Koch) Taliev** – **Яснотка голая.**
Мн., цв. VI-VII. На каменистых осыпях и склонах, в верхнем горном поясе, редко (Г.П. 579; Рыфф, 2001). Энд. ЧКУ, IUCN, ERL.
- 801. *Lamium maculatum (L.) L.** (#*L. album* beta *maculatum* L.; *L. laevigatum* auct. non L.) – **Яснотка пятнистая.**
Мн., цв. III-VII, вторично X. В светлых лиственных лесах, на полянах и травянистых склонах, обычно.
- 802. Lamium purpureum L.** – **Яснотка пурпуровая.**
Одн.-двул., цв. III-VI. На сухих склонах, среди кустарников, у дорог, обычно.
- 803. *Leonurus villosus Desf. ex D'urv.** (*L. canescens* Dumort.; *L. cardiaca* L. ssp. *villosus* (Desf. ex D'Urv.) Hyl.; *L. neglectus* Schrank; *L. quinquelobatus* Gilib.) – **Пустырник мохнатый.**
Мн., цв. V-VII. У дорог, на склонах, у кордонов, обычно.
- 804. *Lycopus europaeus L.** – **Зюзник европейский.**
Мн., цв. VII-VIII. На сырых местах, у болотцев и речек, изредка.
- 805. Marrubium praecox Janka** (*M. pestalozzae* auct. non Boiss.) – **Шандра ранняя.**
Мн., цв. V-VIII. На сухих склонах, у дорог, изредка.
- 806. Melissa officinalis L.** (*M. bicornis* Klokov) – **Мелисса лекарственная.**
Мн., цв. VI-VIII. На лесных опушках, вырубках, у дорог, не часто.
- 807. Mentha aquatica L.** – **Мята водная.**

Мн., цв. VII-IX. По берегам речек, озер, водоемов, район Горного озера, редко.

808. **Mentha longifolia* (L.) Huds. (#*M. spicata* ssp. *longifolia* (L.) Tasic) – **Мята длиннолистная.**

Мн., цв. VII-IX. На влажных полянах, в поймах, по берегам болотцев, довольно обычно.

809. *Mentha pulegium* L. (#*M. daghestanica* Boriss.; #*Pulegium dagestanicum* (Boriss.) Holub; *P. vulgare* Mill.) – **Мята блошница.**

Мн., цв. VI-VIII. По берегам речек и на влажных местах, район Горного озера, редко.

810. **Nepeta cataria* L. – **Котовник кошачий.**

Мн., цв. VI-VIII. На сорных местах, у жилья, дорог, изредка.

811. **Nepeta pannonica* L. (*N. nuda* L.) – **Котовник венгерский.**

Мн., цв. VI-VIII. На полянах и горных склонах, по долине р. Альма, у дорог, обычно.

812. *Nepeta parviflora* M.Bieb. (*N. ucrainica* auct. non L.; *N. ucranica* ssp. *parviflora* (M.Bieb.) Mascl.) – **Котовник мелкоцветковый.**

Мн., цв. V-VII. Долина р. Альма (Вульф, 1966).

813. **Origanum vulgare* L. (*O. dilatatum* Klokov; *O. puberulum* (G.Beck) Klokov; #*O. vulgare* var. *puberulum* Beck) – **Душица обыкновенная.**

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, вырубках, луговинах яйлы, среди кустарников, обычно.

814. **Phlomis pungens* Willd. (#*Ph. herba-venti* ssp. *pungens* (Willd.) Maire ex DeFilipps; #*Ph. pseudopungens* Knorring; *Ph. pungens* Willd. ssp. *krynkensis* Klokov & Des.-Shost.) – **Зопник колючий.**

Мн., цв. V-VII. На степных каменистых склонах, в нижнем и верхнем поясе (Г.П. 578).

815. *Phlomis taurica* Hartwiss & Bunge – **Зопник крымский.**

Мн., цв. V-VIII. На сухих склонах и полянах, на каменистых обнажениях яйлы, обычно.

816. *Phlomis tuberosa* L. (#*Ph. desertorum* Smirn.; #*Ph. glandulifera* Klokov; #*Ph. jailicola* Klokov; #*Ph. piskunovii* Klokov; #*Ph. stepposa* Klokov; *Phlomoides tuberosa* (L.) Moench) – **Зопник клубненосный.**

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, сухих сорных склонах, изредка. ЧКУ, IUCN, ERL.

817. **Prunella laciniata* (L.) L. – **Черноголовка разрезная.**

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, травянистых склонах, у дорог, среди кустарников, обычно.

818. **Prunella vulgaris* L. – **Черноголовка обыкновенная.**

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах и луговинах, у дорог, обычно.

819. **Salvia aethiopsis* L. – **Шалфей эфиопский.**

Мн., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, район Хыр-Алана, изредка.

820. **Salvia austriaca* Jacq. – **Шалфей австрийский.**

Мн., цв. IV-VI. На открытых, сухих полянах, изредка.

821. **Salvia glutinosa* L. – **Шалфей железистый.**

Мн., цв. VI-VIII. В лесах и на полянах, обычно.

822. **Salvia nemorosa* L. aggr. (#*S. deserta* Schangin; *S. jailikola* Klokov; *S. moldavica* Klokov; *S. nemorosa* ssp. *jailikola* (Klokov) Соó; #*S. nemorosa* ssp. *moldavica* (Klokov) Соó) – **Шалфей дубравный.**

Мн., цв. V-IX. На лесных полянах, каменистых склонах, у дорог, обычно.

823. **Salvia sclarea* L. – **Шалфей мускатный.**

Мн.-двул., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, по сорным местам, у дорог, изредка (Г.П. 594).

824. **Salvia sibthorpii* Smith (*S. campestris* M.Bied.; *S. extensa* Klokov; *S. virgata* auct. non Jacq.) – **Шалфей Сибторпа.**

Мн., цв. VI-VII. На каменистых и сухих полянах, в светлых лесах, редко (Г.П. 596, Вульф, 1966).

825. *Salvia tesquicola* Klokov & Pobed. (*S. praemontana* Klokov; *S. nemorosa* ssp. *praemontana* (Klokov) Soó; *S. nemorosa* ssp. *tesquicola* (Klokov & Pobed.) Soó; #*S. sylvestris* ssp. *tesquicola* (Klokov & Pobed.) Soják) – **Шалфей сухостепной.**

Мн., цв. V-IX. На лесных полянах, сухих склонах, изредка (Вульф, 1966).

826. **Salvia tomentosa* Mill. (*S. brachystemon* Klokov; *S. grandiflora* Etl.) – **Шалфей войлочный.**

Мн., цв. V-VIII. В светлых лесах, на полянах, каменистых склонах, осыпях, у дорог, обычно.

827. **Salvia verticillata* L. – **Шалфей мутовчатый.**

Мн., цв. VI-VIII. На южных каменистых склонах, у жилья и дорог, обычно.

828. *Salvia virgata* Jacq. (#*S. elenevskyi* Pobed.) – **Шалфей прутьевидный.**

Мн., цв. VI-IX. В разреженных лесах, на полянах и склонах, изредка (Вульф, 1966).

829. *Salvia viridis* L. (*S. horminum* L.) – **Шалфей зеленый.**

Одн., цв. IV-VII. На сухих склонах (Л.С. 234, Вульф, 1966).

830. **Scutellaria albida* L. (*S. pallida* M.Bieb.; *S. subalbida* Klokov) – **Шлемник беловатый.**

Мн., цв. V-VIII. На сухих полянах и в светлых лесах, редко.

831. **Scutellaria altissima* L. – **Шлемник высочайший.**

Мн., цв. V-VIII. В лесах и на полянах, среди кустарников, у дорог, довольно обычно.

832. **Scutellaria orientalis* L. agr. – **Шлемник восточный.**

Мн., цв. IV-IX. На шиферных сухих склонах, осыпях, изредка.

833. **Sideritis montana* L. (#*Hesiodia montana* (L.) Dumort.) – **Железница горная.**

Одн., цв. V-IX. На каменистых горных склонах, осыпях, не часто.

834. **Sideritis taurica* Stephan agr. (*S. libanotica* Labill. ssp. *taurica* (Stephan) Glagoleva, nom. invalid; *S. syriaca* L. ssp. *taurica* (Stephan) Gladkova; *S. scythica* Juz. #*Navicularia syriaca* ssp. *taurica* (Stephan) Soják) – **Железница крымская.**

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, яйле, скалах, обычно. Энд.**

835. *Stachys angustifolia* M.Bieb. – **Чистец узколистный.**

Мн., цв. VI-VII. На полянах, открытых склонах, в разреженных лесах, изредка. ЧКУ.

836. **Stachys germanica* L. (*S. argentea* Tausch; *S. cordata* Klokov; *S. germanica* L. ssp. *cordata* (Klokov) Greuter & Burdet; *S. heterodonta* Zefir.; *S. lanata* Crantz) – **Чистец германский.**

Мн., цв. V-IX. На лесных полянах, склонах, на яйле, обычно.

837. *Stachys iberica* M.Bieb. (*S. memorabilis* Klokov) – **Чистец иберийский.**

Мн., цв. V-VII. В светлых лесах и на полянах, изредка.

838. #*Stachys macrantha* (C.Koch.) Stearn. (#*Betonica macrantha* C.Koch., #*B. grandiflora* Willd.; #*S. macrantha* (K. Koch) Jalas, comb. superfl.) – **Чистец крупноцветковый.**

Мн., цв. VI-VII. В сосновом редколесье, уроч. Красный камень, небольшая популяция.

839. *Stachys palustris* L. (*S. maeoica* Postr.) – **Чистец болотный.**

Мн., цв. VI-VII. У речек, источников, на влажных местах в поймах, редко.

840. *Stachys recta L. (*S. czernjavii* Des.-Shost.; *S. krynkensis* Kotov; *S. transsilvanica* Schur) – **Чистец прямой.**

Мн., цв. VI-VII. У дорог, на полянах и лесосеках как сорное, изредка (Г.П. 590).

841. *Stachys sylvatica L. (#*S. trapezuntea* Boiss.) – **Чистец лесной.**

Мн., цв. V-VIII. В лесах, чаще буковых, на полянах, обычно.

842. *Stachys velata Klokov (*S. cretica* auct. non L.; #*S. cretica* ssp. *velata* (Klokov) Greuter & E.S.Burges) – **Чистец обернутый.**

Мн., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, среди луговой растительности, довольно обычно (Л.С. 230).

843. *Teucrium chamaedrys L. (*T. officinale* Lam.; *T. pulchris* Juz.; *T. stevenianum* Klokov) – **Дубровник обыкновенный.**

Мн., цв. V-IX. В лесах, на сухих каменистых склонах, луговинах яйлы, обычно.

844. *Teucrium jailae Juz. (~*T. cretaceum* Kotov; ***T. montanum* L. ssp. *jailae* (Juz.) Soó) – **Дубровник яйлинский.**

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых обнажениях, скалах, яйле, обычно. Энд.**

845. *Teucrium polium L. – **Дубровник белый.**

Мн., цв. VI-VIII (IX). В шибляковых лесах на шиферных склонах, каменистых полянах, обычно.

846. Teucrium scordioides Schreb. (*T. scordium* L.ssp. *scordioides* (Schreb.) Maire & Petitm.) – **Дубровник скордиевидный.**

Мн., цв. VI-IX. У водоемов, на влажных лугах, район Горного озера, редко.

847. Thymus dzevanovskyi Klokov & Des.-Shost. – **Чабрец Дзевановского.**

Полукуст., цв. VI-VII. В разреженных лесах на шиферных сухих склонах, на яйле, обычно. Энд.

848. Thymus jailae (Klokov & Des.-Shost.) Stank. (#*Thymus roegneri* K.Koch ?) – **Чабрец яйлинский.**

Полукуст., цв. VI-VIII. На каменистых обнажениях яйлы, осыпях, приайлинских склонах, изредка.

849. *Thymus marschallianus Willd. (*Th. amictus* Klokov; *Th. latifolius* (Besser) Andr.; *Th. loavianus* auct. non Opiz.; #*Th. pannonicus* auct.; *Th. pannonicus* All. ssp. *marschallianus* (Wild.) Soó; #*Th. platyphyllus* Klokov; #*Th. pseudopannonicus* Klokov; #*Th. stepposus* Klokov & Des.-Shost.) – **Чабрец Маршаллов.**

Полукуст., цв. V-VI. На луговых полянах, сорных местах, в нижней зоне, не часто. Адв.

850. *Thymus roegneri K.Koch aggr. (*Th. attenatus* Klokov; *Th. callieri* Borb. ex Velen.; #*Th. callieri* ssp. *urumovii* Velen.; #*Th. glabrescens* ssp. *urumovii* (Velen.) Jalas; *Th. hirsutus* M.Bieb., #*Th. hirtellus* Klokov; #*Th. jailae* (Klokov & Des.-Shost.) Stankov; *Th. karadagtnsis* Zefir.; *Th. zelenetzkyi* Klokov & Des.-Shost.) – **Чабрец Рёгнера.**

Полукуст., цв. V-VIII. На сухих каменистых склонах, среди кустарников, луговинах яйлы, обычно.

851. Thymus tauricus Klokov & Des.-Shost. (*Th. cherlerioides* auct. non Vis.; *Th. pseudohumillinus* Klokov & Des.-Shost.) – **Чабрец крымский.**

Полукуст., цв. V-VIII. На скалистых и каменистых местах, яйле, обычно.

852. Ziziphora serpyllacea M.Bieb. (#*Ziziphora fasciculata* K. Koch ex Rech. Fill. 1951 non C.Koch ex Grossh. 1932) – **Зизифора тимьянниковая.**

Полукуст., цв. V. На яйле (Л.С. 236, YALT).

Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые

853. *Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная.

Мн., цв. VI-VII. Лесное озеро у Бешуйской дачи, сбор Г. Поплавской и Н. Троицкого (1927) (Г.П. 659).

Linaceae S.F.Gray – Льновые**854. *Linum austriacum L. (#L. perenne L. ssp. austriacum (L.) Bolos & Vigo; #L. squamulosum Rudolphi) – Лен австрийский.**

Мн., цв. VI-VII. Каменистые склоны, поляны, изредка.

855. Linum catharticum L. (Cathartolinum catharticum (L.) Small.; C. pratense Rchb., nom. illeg.) – Лен слабительный.

Одн., цв. V-VI. Влажные поляны в буковом лесу, изредка.

856. Linum jailicola Juz. – Лен яйлинский.

Мн., цв. VI-VIII. На луговинах яйлы, довольно часто.

857. *Linum lanuginosum Juz. (L. hirsutum L. ssp. lanuginosum (Juz.) Egorova) – Лен шерстистый.

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, осыпях, редко (Г.П. 418).

858. Linum marschallianum Juz. (L. austriacum ssp. marschallianum (Juz.) Greuter & Burdet) – Лен Маршаллов.

Мн., цв. V-VII. На полянах, яйлах, приайлинских склонах, обычно.

859. *Linum nervosum Waldst. & Kit. (L. aucheri auct. non Planch.; #L. nervosum ssp. glabratum (DC.) P.H. Davis) – Лен жилковатый.

Мн., цв. V-VIII. На горных склонах, яйлах, лесных полянах, обычно.

860. *Linum squamulosum Rudolphi ex Willd. (L. austriacum L. ssp. euxinum (Juz.) Ockendon; L. euxinum Juz.) – Лен чешуйчатый.

Мн., цв. VI. На полянах, каменистых склонах, яйлах, обычно.

861. Linum tauricum Willd. – Лен крымский.

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, осыпях, в расщелинах скал на яйлах, изредка (Л.П. 514).

862. *Linum tenuifolium L. – Лен тонколистный.

Мн., цв. V-VIII. На остепненных и каменистых склонах, сухих лесных полянах, обычно.

863. *Linum trigynum L. (L. gallicum L.) – Лен трехстолбиковый.

Одн., цв. VI. На остепненных полянах, скалах, редко (Г.П. 417).

Loranthaceae Juss. – Ремнецветковые**864. *Viscum album L. – Омела белая.**

Куст., цв. III-IV. Паразитирует на диких плодовых деревьях, липе, не часто (Г.П. 192).

Lythraceae Jaume – Дербенниковые**865. *Lythrum salicaria L. – Дербенник иволлистный.**

Мн., цв. VI-IX. На влажных местах, по берегам речек и болотцев, не часто.

Malvaceae Juss. – Мальвовые**866. Alcea taurica Pjin – Шток-роза крымская.**

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, сухих склонах и сорных местах, обычно.

867. *Althaea cannabina L. – Алтей коноплевый.

Мн., цв. VI-VIII. В светлых лесах, среди кустарников, на открытых склонах, обычно.

868. **Althaea hirsuta* L. – Алтей шерстковолосистый.

Одн., цв. V-VII. На сухих полянах и открытых склонах, сорное в посевах, обычно.

869. **Lavatera thuringiaca* L. – Хатьма тюрингенская.

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах и луговинах, довольно редко.

870. **Malva neglecta* Wallr. (~*M. rotundifolia* auct. non L., nom. ambig.) – Просвирник пренебреженный.

Одн.-двул., цв. VI-VII. Поляны в лесу и на яйле, сорное у жилья, обычно. Адв.

871. **Malva pusilla* Smith (#*M. rotundifolia* auct. non L. nom ambig.) – Просвирник низкий.

Одн.-мн., цв. V-VIII. Сорное (Г.П. 452). Адв.

872. *Malva sylvestris* L. (#*M. grossheimii* Пјјin; #*M. mauritiana* L.) – Просвирник лесной.

Двул., мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, сорное, изредка. Адв.

Monotropaceae Nutt. – Вергляницевые

873. **Monotropa hypopitys* L. (*Hypopitys monotropa* Crantz) – Вергляница подъянковая.

Мн., цв. VI-VII. В сосновых, буковых, иногда в дубовых лесах, по всей территории, изредка.

Oleaceae Hoffm. & Link. – Маслиновые

874. **Fraxinus angustifolia* Vahl – Ясень узколистный.

Дер., цв. III-IV. На лесных полянах, в районе Горного озера, редко.

875. **Fraxinus excelsior* L. – Ясень высокий.

Дер., цв. III-IV. В лесах и по склонам, выступает как основная или сопутствующая порода, по всей территории.

876. **Jasminum fruticans* L. – Жасмин кустарниковый.

Куст., цв. IV-VI. На каменистых южных склонах, изредка.

877. **Ligustrum vulgare* L. – Бирючина обыкновенная.

Куст., цв. V-VII. На сухих полянах, каменистых склонах, по долине р. Альма, нередко.

Onagraceae Juss. – Кипрейные

878. **Chamerion angustifolium* (L.) Holub (*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.; *Epilobium angustifolium* L.) – Хаменерион узколистный, Иван-чай.

Мн., цв. VI-IX. На лесных опушках и полянах, образует заросли, изредка.

879. **Circaea lutetiana* L. (#*C. quadrisulcata* (Maxim.) Franch. & Savat p.p.) – Двудлепестник парижский.

Мн., цв. VI-VIII. В тенистых лесах, по балкам, вырубкам, обычно.

880. **Epilobium hirsutum* L. – Кипрей мохнатый.

Мн., цв. VI-IX. У источников, по берегам речек и ручьев, по влажным местам, изредка.

881. *Epilobium lanceolatum* Seb. & Mauri – Кипрей ланцетолистный.

Мн., цв. VI-VII. В лесу, между Алуштой и Центральной котловиной (Л.С. 192; Вульф, 1953).

882. **Epilobium montanum* L. – Кипрей горный.

Мн., цв. VI-IX. В лесах и на полянах, вырубках и каменистых склонах, обычно.

883. *Epilobium palustre* L. (#*E. tundrae* Sam.) – Кипрей болотный.

Мн., цв. VI-IX. Болотце в дубовом лесу у Чучельской казармы.

884. **Epilobium parviflorum* Scrb. – Кипрей мелкоцветковый.

Мн., цв. VI-IX. Во влажных местах, в лесу, изредка.

885. *Epilobium roseum* Schreb. – Кипрей розовый.

Мн., цв. VI-IX. Во влажных местах, в лесу и на полянах, редко.

886. *Epilobium tetragonum* L. (*E. adnatum* Griseb.) – Кипрей четырехгранный.

Мн., цв. VI-VIII. По берегам водоемов и горных рек, редко.

Orobanchaceae Vent. – Молочайные

887. **Diphelypaea coccinea* (M.Bieb.) Nicolson (*Phelypaea coccinea* (M.Bieb.) Poir.) – Дифелипея красная.

Мн., цв. V-VI. На щебнистых, каменистых горных склонах, лесных полянах, паразитирует на васильке наклоненном, редко. **ЧКУ.**

888. **Diphelypaea helenae* (Popl.) Tzvelev (*Phelypaea helenae* Popl.) – Дифелипея Елены.

Мн., цв. V-VI. На каменистых склонах со степной растительностью, по правому берегу р. Альма, паразитирует на васильке наклоненном, редко. **ЧКУ.**

889. **Orobanche crenata* Forssk. (#*O. owerinii* (G. Beck) O.Beck) – Заразиха городчатая.

Мн.-одн., цв. V-VII. На каменистых склонах, полянах, паразитирует на бобовых (клевере, вике), изредка (Г.П. 656).

890. **Orobanche cumana* Wallr. (*O. cernua* Loefl. ssp. *cumana* (Wallr.) Soó; *O. cumana* Wall. ssp. *parviflora* Kotov #*O. sarmatica* Kotov) – Заразиха подсолнечная.

Одн.-мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, у дорог, паразитирует на полыни, дурнишнике, изредка (Г.П. 657). Адв.

891. *Orobanche elatior* Sutton (*O. kochii* F.Schultz; *O. major* auct. non L.) – Заразиха высокая.

Мн.-двул., цв. V-VII. На каменистых склонах, у лесных дорог, редко, паразитирует на сложноцветных (мордовнике).

892. *Orobanche hederæ* Vaucher ex Duby – Заразиха плющевая.

Мн., цв. V-VII. В лесах, паразитирует на плюще, не часто

893. **Phelipanche purpurea* (Jacq.) Soják (*Orobanche purpurea* Jacq.) – Фелипанче пурпурная.

Мн., цв. V-VII. На горных склонах, г. Черная, паразитирует на полыни и тысячелистниках, редко.

Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые

894. **Paeonia daurica* Andrews (*P. taurica* Andrews, schalm. corr.; *P. mascula* (L.) Mill. ssp. *triternata* (Pall. ex DC.) Stearn & P.H.Davis; *P. triternata* Pall. ex DC.) – Пион крымский, п. трижды-тройчатый.

Мн., цв. V-VI. В буковых и смешанных лесах, на полянах южных склонов, обычно. **ЧКУ.**

895. **Paeonia tenuifolia* L. (*P. biebersteiniana* Rupr., *P. lithophila* Kotov) – Пион узколистный.

Мн., цв. IV-V. На каменистых склонах и полянах, довольно обычно. **ЧКУ, ВК.**

Ranunculaceae Juss. – Маковые

896. **Chelidonium majus* L. – Чистотел большой.

Мн., Цв. IV-VII. В светлых лесах, среди кустарников, сорное у дорог и жилья, обычно.

897. **Papaver dubium* L. – Мак сомнительный.

Мн., цв. IV-VII. На полянах и остепненных склонах, изредка (Г.П. 274).

898. **Papaver hybridum* L. (*P. argemone* L. ssp. *hybridum* (L.) Schmalh.) – Мак гибридный.

Одн., цв. IV-VIII. На сухих склонах, сорных местах, редко.

899. **Papaver rhoeas* L. – Мак самосейка.

Одн., цв. IV-VIII. На южных склонах, полянах, у жилья, не часто.

900. **Papaver strigosum* (Boenn.) Schur (*P. nothum* Steven; *P. rhoeas* L. ssp. *strigosum* (Boenn.) Simonk.; #*P. rhoeas* ssp. *strigosum* (Boenn.) Soó) – Мак щетинистый.

Одн., цв. V-VIII. На полянах, у дорог, изредка. Адв.

Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые

901. **Plantago lanceolata* L. – Подорожник ланцетолистный.

Мн., цв. IV-IX. На сухих полянах, склонах, лугах, довольно обычно.

902. *Plantago major* L. (#*P. borysthena* (Rogow.) Wissjul.; #*P. major* beta *borysthena* Rogow.) – Подорожник большой.

Двул., цв. VI-IX. На сорных местах, у дорог и жилья, не часто.

903. **Plantago media* L. – Подорожник средний.

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, лугах, в светлых лесах, обычно.

904. *Plantago urvillei* Opiz (? #*P. media* ssp. *longifolia* (G. Mey.) Witte; ? #*P. media* var. *longifolia* (Spielart) G. Mey.; #*P. media* ssp. *stepposa* (Kuprian.) Soó; #*P. media* ssp. *urvilleana* (Rapin) Hulten; #*P. media* var. *urvilleana* Rapin; *P. stepposa* Kuprian.) – Подорожник Урвилла.

Мн., цв. V-VIII. На сухих остепненных склонах, редко (Вульф, 1969).

Polygalaceae R. Br. – Истодовые

905. *Polygala anatolica* Boiss. & Heldr. (*P. major* Jacq. var. *anatolica* (Boiss. & Heldr.) Schmalh.) – Истод анатолийский.

Мн., цв. V-VI. На горных склонах, в светлых лесах, на полянах, изредка.

906. *Polygala andrachnoides* Willd. – Истод андрахновидный.

Мн., цв. V-VI. На поляне, склон хр. Конек. Сбор Н.Багриковой.

907. *Polygala caucasica* Rupr. – Истод кавказский.

Мн., цв. VI-VII. На поляне в сосновом редколесье, район ур. Красный камень.

908. *Polygala comosa* Schkuhr (#*P. comosa* var. *hybrida* (DC.) Petelin; *P. hybrida* DC.) – Истод хохлатый.

Мн., цв. V-VI. На Никитской яйле (Л.С. 177).

909. **Polygala major* Jacq. – Истод большой.

Мн., цв. V-VII. В светлых лесах, на полянах, склонах, луговинах яйлы, очень обычно.

Polygonaceae Juss. – Гречишные

910. **Bistorta officinalis* Delarble (*Polygonum bistorta* L.) – Горец змеинный, рачьи шейки.

Мн., цв. VI-VII. На луговинах яйлы и у верхней границы леса, довольно обычно.

911. **Fallopia convolvulus* (L.) A.Löve (*Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort.; #*Fagopyrum convolvulus* (L.) H. Gross; *Polygonum convolvulus* L.; #*Reynoutria convolvulus* (L.) Shinners) – Фаллопия выюнковая.

Одн., цв. VI-IX. На остепненных полянах, сорное в посевах, у дорог, обычно. Адв.

912. *Fallopia dumetorum (L.) Holub (*Bilderdykia dumetorum* (L.) Dumort.; #*Fagopyrum dumetorum* (L.) Schreb.; *Polygonum dumetorum* L.; #*Reynoutria scandens* ssp. *dumetorum* (L.) Shinners) – **Фаллопия кустарниковая.**

Одн., цв. VI-VIII. В дубовых, буковых лесах, среди кустарников, сорное в посевах, изредка.

913. *Persicaria lapathifolium (L.) Delarble (#*P. komarovii* (Lev.) Soják; #*P. lapathifolia* ssp. *klokovii* Soják; #*P. lapathifolia* var. *tomentosa* (Schrank) Tzvelev; #*P. nodosa* (Pers.) Opiz; *P. tomentosa* (Schrank) Bicknell; #*Polygonum komarovii* Lev.; *P. lapathifolium* L.; #*P. lapathifolium* ssp. *nodosum* (Pers.) Kitam.; *P. nodosum* Pers.; *P. paniculatum* Andr.; *P. pseudoincanum* Klokov; #*P. tomentosum* Schrank) – **Горец щавелелистный.**

Одн., цв. VII-XI. По берегам лесных болотцев, у сборных арыков в районе Хыр-Алана, редко.

914. *Persicaria minor (Huds.) Opiz (*Polygonum daphnophyllum* Andr.; *P. minus* Huds.) – **Горец малый.**

Одн., цв. VII-IX. По берегам лесных болотцев, вдоль старых арыков в Центральной котловине, очень редко.

915. *Polygonum aviculare L. (#*P. aviculare* ssp. *heterophyllum* (Lindm.) Asch. & Graebn.; #*P. aviculare* ssp. *monspeliense* (Thiebaut ex Pers.) Chrték; *P. heterophyllum* Lindm.; *P. monspeliense* Thiébaud ex Pers.) – **Горец птичий, спорыш.**

Одн., цв. IV-IX. На полянах, у жилья, сорное, изредка.

916. Polygonum bellardii All. (*P. kitaibelianum* Sadl.; #*P. patulum* ssp. *kitaibelianum* (Sadler) Asch. & Graebn.; #*P. tiflisiense* Kom.) – **Горец Белларда.**

Одн., цв. VI-X. На сорных местах, у дорог, на полянах в светлых лесах.

917. Rumex acetosella L. (*Acetosa acetosella* (L.) Mill.; #*Acetosella multifida* (L.) A.Löve; *A. tenuifolia* (Wallr.) A.Löve & D.Löve; *A. vulgaris* Fourr. #*A. vulgaris* f. *multifida* (L.) Dostál; #*R. acetosella* ssp. *tenuifolius* (Wallr.) O. Schwarz #*R. acetosella* var. *tenuifolius* Wallr.; (#*R. multifidus* L.; #*R. tenuifolius* (Wallr.) A.Löve) – **Щавель воробынный.**

Мн., цв. V-VIII. На сухих склонах и яйле, обычно.

918. *Rumex conglomeratus Murr. – **Щавель клубковатый.**

Мн., цв. VI-VII. В пойме р. Альма, во влажных местах, изредка.

919. *Rumex crispus L. – **Щавель курчавый.**

Мн., цв. VI-VII. На полянах, вырубках, у дорог, обычно.

920. *Rumex obtusifolium L. ssp. sylvestris (Lam.) Čelak. (*R. sylvestris* (Lam.) Wall.) – **Щавель лесной.**

Мн., цв. VII-VIII. На лесных полянах, среди кустарников, у дорог, изредка.

921. Rumex pulcher L. – **Щавель красивый.**

Одн.-мн., цв. V-VI. Смешанный лес на южном склоне хр. Хыр-Алан, редко.

922. *Rumex scutatus L. (*R. alpestris* Jacq. s.str. *Acetosa scutata* (L.) Mill.) – **Щавель щитковидный.**

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых осыпях и скалах, очень редко.

923. *Rumex tuberosus L. ssp. turcomanicus Rech.f. (*R. euxinus* Klokov; *R. tuberosus* L. ssp. *euxinus* (Klokov) Borodina; #*R. turcomanicus* (Rech. f.) Czerep.) – **Щавель клубеносный.**

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах и каменистых склонах, довольно обычно.

Primulaceae Vent. – Первоцветные

924. *Anagallis arvensis* L. – Очный цвет пашенный.

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, в посевах, изредка.

925. *Anagallis foeminae* Mill. (*A. arvensis* L. ssp. *foemina* (Mill.) Schinz & Thell.; *A. caerulea* Schreb.) – Очный цвет Фомина.

Одн., цв. V-VI. У дорог, по сухим склонам, изредка.

926. *Androsace elongata* L. – Проломник удлиненный.

Одн., цв. III-IV. Сухие склоны, остепненные поляны, в нижней зоне, изредка.

927. **Androsace maxima* L. ssp. *turczaninovii* (Фреун) Fed. (#*A. maxima* L.; *A. turczaninovii* Фреун) – Проломник большой (п. Турчанинова).

Одн., цв. III-IV. Сухие склоны со степной растительностью, редко.

928. **Androsace taurica* Ovcz. (*A. villosa* L. ssp. *taurica* (Ovcz.) Fed.) – Проломник крымский.**

Мн., цв. V-VI. На каменистых, остепненных склонах, яйле, обычно. Энд.**

929. *Lysimachia nummularia* L. – Вербенник монетный.

Мн., цв. V-VI. Влажные места, буковый лес, у Аспорта, очень редко.

930. **Lysimachia verticillaris* Spreng. (*L. verticillata* M.Bieb.) – Вербенник мутовчатый.

Мн., цв. VI-VII. В сырых, тенистых местах, в кустарниковых зарослях у источников рек, довольно обычно.

931. *Lysimachia vulgaris* L. – Вербенник обыкновенный.

Мн., цв. VI-VII. По берегам рек и ручьев, изредка.

932. **Primula acaulis* (L.) L. (*P. vulgaris* Huds.) – Первоцвет бесстебельный.

Мн., цв. III-IV. В лесах, на луговинах яйлы, лесных полянах, очень обычно.

933. **Primula macrocalyx* Bunge (#*P. inflata* ssp. *macrocalyx* (Bunge) O. Schwarz; *P. veris* L. ssp. *macrocalyx* (Bunge) Ludi) – Первоцвет крупночашечный.

Мн., цв. IV-V. На яйле, лесных полянах, очень обычно.

Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые

934. **Moneses uniflora* (L.) A. Gray (*Pyrola uniflora* L.) – Одноцветка одноцветковая.

Мн., цв. V-VI. В сосновых и смешанных лесах верхнего горного пояса, редко.

935. **Orthilia secunda* (L.) House (*Pyrola secunda* L.; *Ramischia secunda* (L.) Garcke) – Ортилия однобокая.

Мн., цв. VI-VII. В лиственных и сосновых лесах, средней и верхней зоны, обычно.

936. **Pyrola chlorantha* Sw. (#*P. virens* Schweigg.; #*P. virescens* auct.) – Грушанка зеленоцветковая.

Мн., цв. V-VI. В сосновых и лиственных лесах, средней и верхней зоны, изредка.

937. **Pyrola media* Sw. – Грушанка средняя.

Мн., цв. VI-VII. В буковых и сосновых лесах, очень редко.

938. *Pyrola minor* L. (#*P. conferta* Fisch. ex Cham. & Schltdl.; #*P. minor* var. *conferta* (Fisch. ex Cham. & Schltdl.) A.P.Khokh) – Грушанка малая.

Мн., цв. VI-VII. В буковых и сосновых лесах, Никитская яйла, редко (Л.С. 209, YALT).

939. *Pyrola rotundifolia* L. (#*P. californica* auct.; #*P. tianschanica* Poljak.) – Грушанка круглолистная.

Мн., цв. IV-VII. В буковых и смешанных лесах, верхней и средней зоны, изредка.

Ranunculaceae Juss. – Лютиковые

940. **Aconitum anthora* L. – Аконит противоядный.

Мн., цв. VI-VII. На луговинах яйлы, лесных полянах, в верхнем поясе, довольно часто. **ЧКУ.**

941. **Aconitum lasiostomum* Rchb. – Аконит шерстистоусый.

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, в верхнем поясе, изредка.

942. *Adonis aestivalis* L. (*A. autumnalis* L.; *A. miniata* Besser; *A. squarrosa* Steven) – Адонис, горлицев летний.

Мн., цв. IV-V. В посевах, на обочинах дорог, изредка.

943. **Adonis flammea* Jacq. (*A. caudata* Steven) – Адонис пламенный.

Мн., цв. V-VI. На полянах, огородах, сорное, изредка.

944. *Adonis vernalis* L. (*Adonanthe vernalis* auct. non L.) – Адонис весенний.

Мн., цв. IV-V. На яйлах, на полянах в нижней зоне, редко. **ЧКУ.**

945. #*Anemonastrum fasciculatum* (L.) Holub (*Anemone fasciculata* L.; #*A. narcissiflora* f. *fasciculata* (L.) A. Nyár.) – Ветреница пучковатая.

Мн., цв. V-VI. В сосновом редколесье, район уроч. Красный камень.

946. ! **Aquilegia vulgaris* L. (*A. longisepala* Zimmeter) – Водосбор обыкновенный.

Мн., цв. V. В центральной котловине, в устье р. Черная, изредка. Адв.

947. **Batrachium rionii* (Lagger) Nyman (#*B. trichophyllum* ssp. *rionii* (Lagger) C.D.K. Cook; #*Ranunculus rionii* Lagger; #*R. trichophyllus* ssp. *rionii* (Lagger) Soó) – Шелковник, водяной лютик Риона.

Мн., цв. VI-VII. В лесных болотцах, в воде, довольно редко (Г.П. 252).

948. **Batrachium trichophyllum* (Chaix) Bosch (*B. divaricatum* (Schrank) Wimmer; *B. kauffmannii* (Clerc.) V.Krecz.; #*B. penicillatum* Dumort.; *Ranunculus divaricatum* Schrank; *R. kauffmannii* Clerc.; #*R. penicillatus* (Dumort.) Bab.; #*R. pseudofluitans* (Syme) Newbould ex Baker & Foggitt; *R. trichophyllum* Chaix) – Шелковник волосистый.

Мн., цв. VI-VII. В лесных болотцах, изредка (Г.П. 251).

949. **Buschia lateriflora* (DC.) Ovcz. (*Ranunculus laterifolius* DC.) – Бушия бокоцветковая.

Одн., цв. V-VI. В долине р. Альма на влажных местах, найден однажды (Г.П. 263).

950. *Ceratocephala testiculata* (Crantz) Besser (*C. orthoceras* DC.; #*C. reflexa* Steven; *Ranunculus testiculatus* Crantz; **R. orthoceras* Benth & Hoorks.) – Рогоглавник яичковый.

Одн., цв. III-IV. Сухие каменистые склоны и поляны, редко.

951. **Clematis integrifolia* L. – Ломонос цельнолистный.

Мн., цв. V-VI. На яйле, лесных полянах, в верхнем горном поясе, изредка.

952. **Clematis vitalba* L. – Ломонос виноградолистный.

Куст., цв. VI-VII. В нижней зоне, по долине р. Альма, очень обычно.

953. *Consolida divaricata* (Ledeb.) Schodinger (*C. regalis* S.F.Gray ssp. *divaricata* (Ledeb.) Muntz; #*C. regalis* ssp. *paniculata* var. *divaricata* (Ledeb.) P.H.Davis; #*Delphinium consolida* ssp. *divaricatum* (Ledeb.) A. Nyár.; #*D. divaricatum* Ledeb.) – Живокость растопыренная.

Одн., цв. VI-VII. Сухие склоны, поляны, среди кустарников, редко.

954. **Consolida orientalis* (J. Gay) Schrodinger (*C. hispanica* (Costa) Greuter & Burdet; #*Delphinium orientale* J.Gay.) – Живокость восточная.

Одн., цв. V-VI. Остепненные поляны, опушки, вырубки, изредка.

955. *Consolida paniculata* (Host) Schur (*C. regalis* S.F.Gray ssp. *paniculata* (Host) Soó; #*Delphinium paniculatum* Host.) – Живокость метельчатая.

Одн., цв. V-VII. На сухих лесных полянах, у дорог, среди кустарников, изредка.

956. **Delphinium pallasii* Nevski (*D. fissum* auct. non Waldst. & Kit.) – Живокость Палласа.

Мн., цв. VI-VII. На лесных полянах, каменистых склонах, осыпях, обычно. ЧКУ, ИСН.

957. **Ficaria verna* Huds. aggr. (*Ranunculus ficaria* L.) – Чистяк весенний.

Мн., цв. III-V. Тенистые леса, пойма р. Альма, влажные поляны, довольно обычно.

958. *Nigella arvensis* L. – Чернушка полевая.

Одн., цв. VI-VII. На сухих склонах, сорных местах, в посевах, изредка. Адв.

959. ! *Nigella damascena* L. – Чернушка дамасская.

Одн., цв. V-VI. На полянах, среди кустарников, изредка. Адв.

960. **Pulsatilla taurica* Juz. (*P. halleri* (All.) Willd. ssp. *taurica* (Juz.) K.Krause; *P. litophila* Kotov; *P. halleri* auct.) – Прострел крымский.**

Мн., цв. IV-V. В лесах, на полянах, луговинах яйлы, довольно обычно. Энд.** ЧКУ, ERL.

961. *Ranunculus arvensis* L. – Лютик полевой.

Одн., цв. IV-V. На полянах, сорное в посевах, изредка.

962. **Ranunculus constantinopolitanus* (DC.) D'Urv. (*R. villosus* DC. ssp. *constantinopolitanus* (DC.) A.Jelen.) – Лютик константинопольский.

Мн., цв. V-VI. В лиственных лесах, на полянах в пойме р. Альма, обычно.

963. *Ranunculus crimaeus* Juz. (*R. brutius* auct. non Ten.; #*R. brutius* ssp. *crimaeus* (Juz.) Jelen.) – Лютик крымский.**

Мн., цв. V-VI. В тенистых лесах и на полянах, в верхнем горном поясе, изредка. Энд.** ERL.

964. **Ranunculus dissectus* M.Bieb. – Лютик раздельный.

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, луговинах яйлы, в лесах на границе с яйлой, довольно обычно. Энд.**

965. **Ranunculus illyricus* L. (#*R. alexeenkoi* Grossh.; *R. meridionalis* Grossh.) – Лютик иллирийский.

Мн., цв. V-VI. На яйле, южных каменистых склонах, обычно.

966. *Ranunculus neapolitanus* Ten. – Лютик неаполитанский.

Мн., цв. IV-V. Сухие поляны нижней зоны, редко.

967. **Ranunculus oreophilus* M.Bieb. (#*R. acutidentatus* Rupr.; #*R. acutilobus* Ledeb.; #*R. makaschwilii* Kem.-Nath.) – Лютик горный.

Мн., цв. V-VI. На луговинах яйлы, на Чатыр-Даге и в районе Красного камня, очень редко.

968. *Ranunculus oxyspermus* Willd. – Лютик остроплодный.

Мн., цв. IV-V. На сухих склонах, полянах, как сорное в посевах, обычно.

969. **Ranunculus pavlii* (A.Jelen. & Derviz-Sokolova) Tzvelev (*R. caucasicus* auct. non M.Bieb.; *R. caucasicus* M.Bieb. ssp. *pavlii* A.Jelen. & Derviz-Sokolova) – Лютик Павла.**

Мн., цв. VI-VII. В лесах и на полянах, в верхнем горном поясе, изредка. Энд.**

970. **Ranunculus polyanthemos* L. – Лютик многоцветковый.

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, склонах яйлы, сорное у дорог, жилья, обычно.

971. **Ranunculus repens* L. – Лютик ползучий.

Мн., цв. V-VII. Влажные лга, в ройме р. Альма, довольно обычно.

972. **Ranunculus sceleratus* L. (#*R. dolosus* Fisch. & C.A.Mey.) – Лютик ядовитый.

Одн., цв. IV-VI. По берегам лесных болотцев, изредка.

973. **Thalictrum minus* L. (*T. angustifolium* Besser, non L.; #*T. collinum* Wallr.; *T. flexuosum* Bernh. ex Rchb.; #*T. kochii* auct.; *T. transsilvanicum* Schur) – **Василисник малый**. Мн., цв. VI-VII. В лесах, на полянах и яйле, в вернем горном поясе, обычно.

Resedaceae S.F. Gray – Резедовые

974. **Reseda lutea* L. – **Резеда желтая**. Двуд.-мн., цв. V-VIII. На пустырях, у дорог и жилья, изредка.

Rhamnaceae Juss. – Крушиновые

975. **Frangula alnus* Mill. (*Rhamnus frangula* L.) – **Крушина ольховидная**.

Дер., куст., цв. IV-V. В лесах, среди кустарников, изредка.

976. **Rhamnus cathartica* L. – **Жостер слабительный**.

Дер., куст., цв. V-VI. На сухих каменистых склонах, в лесах, изредка.

Rosaceae Juss. – Розоцветные

977. **Agrimonia eupatoria* L. (*A. adscendens* Andrz.; *A. officinalis* Lam. ex Poir.) – **Репейничек лекарственный**.

Мн., цв. VI. В лесах, на полянах, среди кустарников, обычно.

978. *Alchemilla aemula* Juz. – **Манжетка подражающая**.

Мн., цв. V-VIII. На полянах и яйлах, изредка.

979. *Alchemilla exsanguis* Juz. – **Манжетка бескровная**.

Мн., цв. V-IX. На травянистых склонах Никитской яйлы, изредка (Л.П. 409). Энд.

980. *Alchemilla exuens* Juz. – **Манжетка сбрасывающая**.

Мн., цв. VI-VII. На яйле, редко (Л.С. 145). Энд.

981. *Alchemilla hirsutissima* Juz. – **Манжетка самая жестковолосистая**.

Мн., цв. VI-VII. На каменистых склонах, редко (Л.С. 144, YALT). Энд.

982. **Alchemilla jailae* Juz. – **Манжетка яйлинская**.

Мн., цв. V-VIII. На яйле, обычно. Энд.

983. **Alchemilla lithophila* Juz. – **Манжетка камнелюбивая**.

Мн., цв. VI-VIII. На яйле, обычно.

984. **Alchemilla stevenii* Buser (#*A. neo-stevenii* Juz.) – **Манжетка Стевена**.

Мн., цв. VI. На яйле, редко.

985. #*Alchemilla supina* Juz. – **Манжетка низкая**.

Мн., цв. VI-IX. На приайлинских склонах, яйле, обычно. Энд.

986. *#*Alchemilla taurica* Juz. – **Манжетка крымская**.

Мн., цв. V-VI. На лесных опушках вернего пояса и на яйле, обычно.

987. *Alchemilla tythantha* Juz. (#*A. multiflora* Buser ex Rothm.) – **Манжетка мелкоцветковая**.

Мн., цв. V-VIII. На яйле, лесных полянах, горных луговинах, очень обычно. Энд.

988. **Amelanchier ovalis* Medik. (*A. rotundifolia* (Lam.) Dui.-Cours., nom. illeg.; *A. vulgaris* Moench; #*Crataegus rotundifolia* Lam.) – **Ирга круглолистная**.

Куст., цв. IV-V. На лесных полянах, в светлых лесах, осыпях, довольно редко.

989. **Amygdalus nana* L. (*A. campestris* Besser) – **Миндаль низкий, бобовник**.

Куст., цв. IV-V. На каменистом южном склоне вершины «Веселый Шпиль», единично (Г.П. 362).

990. **Cerasus avium* (L.) Moench (*Prunus avium* L.) – **Вишня птичья, черешня**.

Дер., цв. IV-V. В смешанных лиственных лесах, по долине р. Альма, на полянах, изредка.

- 991. *Cerasus mahaleb* (L.) Mill. (*Padellus mahaleb* (L.) Vass.) – Вишня антипка, магалепка.**
Дер., цв. IV-V. На полянах и крутых склонах, редко.
- 992. *Cotoneaster integerrimus* Medik – Кизильник цельнокрайний.**
Куст., цв. V-VI. На каменистых склонах, осыпях, яйлах, довольно обычно.
- 993. *Cotoneaster melanocarpus* Fisch. ex Blytt. (#*C. melanocarpus* Lodd., G. Lodd. & W. Lodd.; #*C. niger* (Wahlenb.) Fr.; *Mespilus cotoneaster beta nigra* Wahlenb.) – Кизильник черноплодный.**
Куст., цв. V-VI. На скалах, очень редко (Л.С. 127, YALT).
- 994. *Cotoneaster tauricus* Pojark. – Кизильник крымский.**
Куст., цв. V. В сосновых слесах, на полянах, яйле, изредка. IUCN, ERL.
- 995. *Crataegus ceratocarpa* Kossyach – Боярышник рогоплодный.**
Дер.-куст., цв. V. В долинах рек, по опушкам в верхнем поясе, изредка. Энд.
- 996. *Crataegus curvisepala* Lindm. (#*C. calycina* ssp. *curvisepala* (Lindm.) Franco; #*C. kyrtostyla* auct.; #*C. monogyna* ssp. *curvisepala* (Lindm.) Soò; #*C. oxyacantha* L.; #*C. pseudokyrtostyla* Клоков) – Боярышник отогнуточашелистикový.**
Куст., цв. V. В подлеске, на полянах и опушках, довольно обычно.
- 997. *Crataegus microphylla* K.Koch – Боярышник мелколистный.**
Куст., цв. V. В подлеске светлых лесов и на опушках, нередко.
- 998. **Crataegus monogyna* Jacq. – Боярышник однопестичный.**
Куст.-дер., цв. V. В светлых лиственных лесах и на полянах, довольно обычно.
- 999. *Crataegus orientalis* Pall. ex M.Bieb. (#*C. laciniata* auct. p.p.) – Боярышник восточный.**
Куст.-дер., цв. V-VI. В лесах и на полянах, довольно обычно.
- 1000. *Crataegus pallasii* Griseb. (*C. stevenii* Pojark. #*C. beckeriana* Pojark.) – Боярышник Палласа.**
Куст., цв. IV-V. На сухих склонах, опушках, изредка.
- 1001. *Crataegus pentagyna* Waldst. & Kit. (#*C. colchica* Grossh.; #*C. klokovii* Ivaschin; #*C. melanocarpa* M.Bieb.) – Боярышник пятипестичный.**
Куст.-дер., цв. V-VI. В дубовых и буковых лесах, на опушках, довольно редко.
- 1002. *Crataegus taurica* Pojark. – Боярышник крымский.**
Куст., цв. V-VI. На Бабугане, сбор В.Косых (1980). IUCN, ERL.
- 1003. **Filipendula vulgaris* Moench (*F. hexapetala* Gilib., nom. inval.) – Лабазник обыкновенный.**
Мн., цв. V. На полянах, лесных опушках, на яйле, обычно.
- 1004. **Fragaria vesca* L. – Земляника лесная.**
Мн., цв. V. На полянах, вырубках, опушках, обычно.
- 1005. *Fragaria viridis* Duchesne (*F. collina* Ehrh.) – Земляника зеленая, полуница.**
Мн., цв. V. На полянах, лесных опушках, на яйле, обычно.
- 1006. **Geum urbanum* L. (#*G. rivale* ssp. *urbanum* (L.) A.Löve & D.Löve) – Гравилат городской.**
Мн., цв. V-VI. Среди кустарников, на опушках, у дорог, обычно.
- 1007. **Malus praecox* (Pall.) Borkh. (#*M. sylvestris* Mill. ssp. *praecox* (Pall.) Soò; *M. sylvestris* Mill. var. *praecox* (Pall.) Пonomarenko) – Яблоня лесная ранняя.**
Дер.-куст., цв. IV-V. На опушках и полянах, у дорог, обычно.
- 1008. *Mespilus germanica* L. – Мушмула германская.**
Дер.-куст., цв. V. В сосновых лесах, на опушках южного макросклона, изредка.
- 1009. **Potentilla argentea* L. – Лапчатка серебристая.**

Мн., цв. VI-VII. На открытых склонах, остепненных полянах, обычно.

1010. *Potentilla astracanica* Jacq. (#*P. bornmuelleri* Borbas; #*P. mollicrinis* (Borbas) Stankov) – **Лапчатка астраханская.**

Мн., цв. VI-VII. На сухих открытых склонах, у дорог, изредка (Г.П. 348; Вульф, 1960).

1011. *Potentilla callieri* (Th.Wolf) Juz. (#*P. taurica* f. *callieri* (Th. Wolf) Gusul.) – **Лапчатка Каллье.**

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых остепненных склонах, у дорог, изредка (Л.С. 137, YALT).

1012. *Potentilla canescens* Besser (#*P. adscendens* Waldst. & Kit. ex Willd.; #*P. inclinata* auct. p.p.) – **Лапчатка серая.**

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, изредка.

1013. **Potentilla crantzii* (Crantz) G.Beck ex Fritsch (*P. verna* L. p.p. (Опр. Кр.); *P. villosa* Limm. (Г.П. 349)) – **Лапчатка Кранца.**

Мн., цв. VI-VIII. На яйле, приайлинских склонах, очень обычно.

1014. *Potentilla depressa* Willd. ex Schlecht. – **Лапчатка прижатая.**

Мн., цв. V-VI. На каменистых склонах, на яйле, в лесах на южном макросклоне, обычно. Энд.

1015. **Potentilla geoides* M.Bieb. – **Лапчатка гравилатовидная.**

Мн., цв. V-VII. На скалах и сухих каменистых склонах, на яйле, обычно.

1016. *Potentilla jailae* Juz. – **Лапчатка яйлинская.**

Мн., цв. VI. По травянистым местам, на Гурзуфской яйле, изредка (Л.П. 393).

1017. **Potentilla micrantha* Ramond ex DC. (#*P. breviscapa* Vest) – **Лапчатка мелкоцветковая.**

Мн., цв. IV-V. Среди кустарников, в светлых лиственных лесах, изредка.

1018. *Potentilla neglecta* Baumbg. (*P. impolita* auct. non Wahlenb) – **Лапчатка неблестящая.**

Мн., цв. VII-VIII. На сухих склонах, изредка (Л.С. 156; Л.П. 396; YALT).

1019. **Potentilla recta* L. (*P. sulphurea* Lam.) – **Лапчатка прямая.**

Мн., цв. VI-VIII. На сухих склонах, по всей территории, обычно.

1020. **Potentilla reptans* L. – **Лапчатка ползучая.**

Мн., цв. VI-VII. На сырых полянах, по долине р. Альма, довольно обычно.

1021. *Potentilla semilaciniosa* Borbás (#*P. recta* L. ssp. *semilaciniosa* (Borb.) Jav.) – **Лапчатка полунадрезанная.**

Мн., цв. VI-VIII. Каменистые склоны в смешанных лесах, изредка.

1022. **Potentilla taurica* Schlecht. – **Лапчатка таврическая.**

Мн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, полянах, осыпях, обычно. Энд.

1023. *Potentilla umbrosa* Steven – **Лапчатка теневая.**

Мн., цв. VI-VII. На лесных опушках, луговинах, яйле, редко.

1024. *Poterium polygamum* Waldst. & Kit. (*P. sanguisorba* L. ssp. *polygamum* (Waldst. & Kit.) Simonk.; *Sanguisorba minor* Scop. ssp. *polygama* (Waldst. & Kit.) Holub) – **Черноголовник многобрачный.**

Мн., цв. V-VI. На сухих склонах, лесных полянах, среди кустарников, обычно.

1025. **Prunus spinosa* L. – **Слива колючая, терн.**

Куст.-дер., цв. V. На лесных полянах, в пойме р. Альма, обычно.

1026. *Pyracantha coccinea* (L.) M.Roem. – **Пираканта красная.**

Куст., цв. VI. В светлых смешанных лесах, у дорог на южном макросклоне, изредка.

1027. **Pyrus communis* L. – **Груша обыкөөвенная.**

Дер., цв. IV-V. В лесах, на полянах, шиферных склонах, на яйлах, изредка.

1028. **Pyrus elaeagnifolia* Pall. – Груша лохोलистная.

Дер.-куст., цв. IV-V. На каменистых сухих склонах, лесных полянах, по всей территории, обычно.

1029. **Rosa canina* L. (*R. arguta* Steven; *R. armata* Steven; *R. calycina* M.Bieb.; *R. ciliato-sepela* Blonski; *R. glauca* Schott. & Besser, non Pourr.; *R. kosinskiana* Besser) – Роза (шиповник) собачья.

Куст., цв. V-VI. На лесных полянах, травянистых склонах, у дорог, обычно.

1030. *Rosa corymbifera* Borkh. (*R. collina* M.Bieb.; *R. friedlaendriana* Besser; *R. kalmiussica* Chrshan. & Laseb.; *R. montana* Steven ex Besser; *R. saxatilis* Steven; *R. taurica* M.Bieb.; *R. wittmanii* Heinr.Braun) – Роза щитконосная.

Куст., цв. (V)VI. Среди кустарников, на лесных опушках, изредка (Л.П. 426).

1031. *Rosa jundzillii* Besser (*R. glandulosa* auct. non Besser; *R. jundzilliana* Besser; *R. trachyphylla* Rau) – Роза Юнзилла.

Куст., цв. VI. На Бабугане, сбор В.Косых (1980).

1032. *Rosa micrantha* Smith – Роза мелкоцветковая.

Куст., цв. VI. На лесных полянах, каменистых склонах, у дорог, обычно.

1033. *Rosa spinosissima* L. (*R. micrantha* Besser; #*R. pimpinellifolia* L.) – Роза колючейшая.

Куст., цв. V-VI. На луговинах яйлы, каменистых склонах, обычно.

1034. *Rosa tschatyrdagi* Chrshan. – Роза Чатырдага.

Куст., цв. V. На лесных полянах, яйлах, у дорог, довольно обычно.

1035. *Rosa turcica* Rouy (*R. horrida* Fisch. ex Crép. 1872 non Spreng.) – Роза турецкая.

Куст., цв. VI. Среди кустарников, район Горного озера, редко.

1036. *Rubus anatolicus* (Focke) Focke ex Hausskn. (#*R. sanguineus* auct.) – Ежевика анатолийская.

Куст., цв. VII-VIII. На опушках, открытых каменистых склонах, редко.

1037. *Rubus caesius* L. – Ежевика сизая.

Куст., цв. V-IX. В светлых лесах на полянах, у дорог, жилья, обычно.

1038. **Rubus canescens* DC. (*R. tomentosus* auct. non Borkh.) – Ежевика войлочная.

Куст., цв. VI-VII. На лесосеках, у дорог, в кустарниковых зарослях, обычно

1039. *Rubus hirtimimus* Juz. – Ежевика жестковатая.

Куст., цв. VI-VII. По долине р. Альма, редко.

1040. **Rubus idaeus* L. – Малина обыкновенная.

Куст., цв. V-VII. На опушках, вырубках, у дорог, редко (Г.П. 339). Адв.

1041. *Rubus paratauricus* Juz. – Ежевика сходно-таврическая.

Куст., цв. VI-VII. Каменистые склоны в районе ущ. Уч-Кош, редко.

1042. **Rubus saxatilis* L. – Костяника.

Куст., цв. VI-VII. В лесах, на приайлинских склонах, на яйле, обычно.

1043. *Rubus tauricus* Schlecht. ex Juz. – Ежевика таврическая.

Куст., цв. VI-VII. В светлых лесах, на полянах, прибрежных кустарниковых зарослях, изредка.

1044. **Sanguisorba taurica* Juz. (~*S. officinalis* L.) – Кровохлебка лекарственная.

Мн., цв. VI-VIII. На южных каменистых склонах, луговинах яйлы, редко.

1045. **Sorbus aucuparia* L. (#*S. caucasigena* Kom. ex Gatsch.) – Рябина обыкновенная.

Дер.-куст., цв. V-VII. В лесах и на полянах в верхнем поясе, довольно обычно.

1046. **Sorbus domestica* L. – Рябина крупноплодная.

Дер., цв. V. В лесах и среди кустарников, в нижней зоне, не часто.

1047. **Sorbus graeca* (Spach) Lodd. ex Schauer (#*S. baldaccii* (Degen & Fritsch ex C.K. Schneid.) Zins; #*S. umbellata* var. *cretica* auct. p.p.) – Рябина греческая.

Дер.-куст., цв. V. На каменистых осыпях, скалах, в лесах, довольно обычно.

1048. **Sorbus roopiana* Bordz. (*S. dualis* Zinserl.) – Рябина Роопа.

Дер., цв. V. В верхнем лесном поясе на границе с яйлой (Г.П. 333; Вульф, 1960).

1049. **Sorbus taurica* Zinserl. (#*S. graeca* var. *taurica* (Zinserl.) Gabrieljan; #*S. umbellata* var. *taurica* (Zinserl.) Gabrieljan) – Рябина крымская.

Дер.-куст., Мн., цв. V-VI. В сосновых и дубовых лесах, на каменистых склонах, довольно обычно.

1050. *Sorbus tauricola* Zaikonn. (*S. pseudolatifolia* K.Pop. 1959, non Boros 1937) – Рябина крымская.

Дер., цв. VI-VII. На каменистых склонах, в смешанных лесах у верхней границы леса, редко (Вульф, 1960). Энд. ERL.

1051. **Sorbus torminalis* (L.) Crantz – Рябина берека, глодовина.

Дер., цв. V-VI. В буковых и смешанных лесах, обычно. ЧКУ.

1052. **Spiraea hypericifolia* L. – Таволга зверобоелистная.

Куст., цв. V-VII. На южных каменистых склонах Чатыр-Дага, очень редко.

Rubiaceae Juss. – Мареновые

1053. *Asperula attenuata* Klokov – Ясменник утонченный.

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, редко.

1054. *Asperula caespitans* Juz. (*A. transhelii* Klokov) – Ясменник дернистый.

Полукуст., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, осыпях, скалистых обнажениях, яйле, довольно обычно. Энд.**

1055. *Asperula stevenii* V.Krecz. (*A. cynanchica* L. var. *elongata* Steven; #*A. tenella* Neuff. ex Degen; ; #*A. maeotica* M.Pop. & Chrshan.) – Ясменник Стевена.

Мн., цв. VI-VIII. На щебнистых и каменистых обрывах, довольно обычно.

1056. *Asperula supina* M.Bieb. – Ясменник низкий.

Полукуст., цв. V-VIII. На каменистых обнажениях яйлы, изредка.

1057. *Asperula taurica* Pacz. – Ясменник крымский.

Мн., цв. VI-VIII. На сухих каменистых склонах и осыпях, изредка (Г.П. 669).

1058. **Crucianella angustifolia* L. (*C. oxyloba* Janka) – Крестовница узколистная.

Одн., цв. V-VI. На сухих склонах со степной растительностью, изредка.

1059. *Cruciata laevipes* Opiz (*Galium cruciata* (L.) Scop.; *C. chersonensis* (Willd.) Ehrend. p.p. excl. typo) – Круциата гладконогая.

Мн., цв. IV-V. В сосновом редколесье, ур. Красный камень, редко.

1060. **Cruciata pedemontana* (Bellardi) Ehrend. (*Galium pedemontanum* All.; #*Valantia pedemontana* Bellardi) – Круциата пьемонтская.

Одн., цв. V-VI. Среди кустарников и в разреженных дубовых лесах, на полянах по берегу р. Альма, изредка.

1061. *Cruciata taurica* (Pall. ex Willd.) Soó (*C. chersonensis* (Willd.) Ehrend. p.p. quoad typum; #*C. coronata* ssp. *taurica* (Pall. ex Willd.) Ehrend.; #*C. taurica* (Pall. ex Willd.) Ehrend., nom. inval.; *Galium chersonense* (Willd.) Roem. & Schult.; *G. coronatum* auct. taur.; *G. decoronatum* Klokov; *G. tauricum* (Pall. ex Willd.) Roem. & Schult.) – Круциата крымская.

Мн., цв. V-VII. На прогреваемых каменистых склонах, яйле, обычно.

1062. **Galium aparine* L. – Подмаренник цепкий.

Одн., цв. IV-V. В лесах, среди кустарников, обычно.

1063. *Galium biebersteinii* Ehrend. (*G. galioides* (M.Bieb.) Soò; *Asperula galioides* M.Bieb., nom illeg.) – **Подмаренник Биберштейна.**

Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, сухих полянах, осыпях, обычно.

1064. **Galium elongatum* C.Presl (*G. maximum* G.Moris; *G. palustre* L. ssp. *elongatum* (C.Presl.) Lange) – **Подмаренник вытянутый.**

Мн., цв. V-VIII. У лесных болотцев, редко (Г.П. 672).

1065. *Galium humifusum* M.Bieb. (*Asperula besseriana* Klokov; *A. cincinnata* Klokov; *A. conferta* (K.Koch) Stankov; *A. humifusa* (M.Bieb.) Besser; *G. cincinnatum* (Klokov) Ostapko, comb. inval., *G. pseudohumulosum* Ostapko) – **Подмаренник распростертый.**

Мн., цв. VI-VIII. На щебнистых склонах, сухих полянах, у дорог, обычно.

1066. **Galium mollugo* L. (*G. erectum* auct. non Huds.; #*G. tyrolense* Willd.) – **Подмаренник мягкий.**

Мн., цв. V-VIII. В лесах, на полянах, среди кустарников, у дорог, обычно.

1067. **Galium odoratum* (L.) Scop. (*Asperula odorata* L.) – **Подмаренник душистый.**

Мн., цв. IV-VI. В тенистых лесах, на опушках, обычно.

1068. **Galium rubioides* L. (*G. articulatum* Lam.; #*G. dasypodium* Klokov, р.р.) – **Подмаренник мареновидный.**

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, опушках, у лесных дорог, обычно.

1069. **Galium tenuissimum* M.Bieb. – **Подмаренник тончайший.**

Одн., цв. V-VII. На сухих каменистых склонах, полянах, у дорог, обычно.

1070. *Galium tricornutum* Dandy (*G. tricorne* Stokes, excl. typo) – **Подмаренник трехрогий.**

Мн., цв. IV-VII. Сорное у дорог, в посевах, редко. Адв.

1071. *Galium verticillatum* Danth. – **Подмаренник мутовчатый.**

Одн., цв. V-VI. На лесных полянах, среди кустарников, на сухих склонах, изредка.

1072. **Galium verum* L. – **Подмаренник настоящий.**

Мн., цв. VI-VIII. В разреженных лесах, на полянах, луговинах яйлы, обычно.

1073. *Sherardia arvensis* L. – **Жерардия полевая.**

Одн., цв. IV-V. На сухих склонах, среди кустарников, изредка.

Rutaceae Juss. – Рутовые

1074. **Dictamnus gymnostylis* Steven – **Ясенец голостолбиковый.**

Мн., цв. V-VI. В лесах, среди кустарников, по всей территории, особенно на южном макросклоне, довольно обычно.

1075. *Haplophyllum suaveolens* (DC.) G.Don f. (*H. ciliatum* Griseb.) – **Цельнолистник душистый.**

Мн., цв. V-VI. На каменистых, щебнистых склонах, осыпях, изредка.

Salicaceae Mirb. – Ивовые

1076. **Populus tremula* L. (*P. pseudotremula* N.I.Rubtzov) – **Осина обыкновенная.**

Дер., цв. IV-V. В буковых и дубовых лесах – единично, по берегам водоемов и рек – заросли, иногда как лесообразующая порода.

1077. **Salix alba* L. (*S. vitellina* L.) – **Ива белая.**

Дер., куст., цв. IV-V. В пойме р. Альма – часто, на остальной территории – редко (Г.П. 172).

1078. ! **Salix babylonica* L. (#*S. matsudana* Koidz.) – **Ива вавилонская.**

Куст., цв. III-IV. Высажена по берегам прудов и водоемов. Адв.

1079. *Salix caprea L. (#*S. bakko* Kimura; #*S. coetanea* (Hartm.) Flod.; #*S. hultenii* Flod.) – **Ива козья.**

Дер., цв. IV-V. По всей территории отдельными экз., в долине р. Альма – часто.

1080. Salix cinerea L. (#*S. deserticola* Goerz ex Pavlov; #*S. phlomoides* M.Bieb. p.p.) – **Ива серая.**

Куст., цв. IV-V. На болотце, район корд. Буковского.

1081. *Salix purpurea L. (#*S. caesifolia* Drobow) – **Ива пурпуровая.**

Куст., цв. IV-V. В пойме р. Альма, довольно часто.

Santalaceae R.Br. – Санталовые

1082. *Thesium arvense Horv. (*Th. ramosum* Hayne; #*Th. brevibracteatum* Sumnev.) – **Ленец обыкновенный.**

Мн., цв. V-VII. На сухих шиферных склонах, лесных полянах, чаще в нижней зоне.

1083. *Thesium brachyphyllum Boiss. – **Ленец коротколистный.**

Мн., цв. IV-V. На каменистых склонах, вершине г. Чучель, изредка (Г.П. 193).

Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые

1084. *Saxifraga irrigua M.Bieb. – **Камнеломка орошенная.**

Мн., цв. IV-VII. В сырых затененных местах, по каменистым склонам, обычно. Энд.

1085. Saxifraga tridactylites L. – **Камнеломка трехпальчатая.**

Одн., цв. V-VI. На сухих каменистых полянах, склонах, довольно обычно.

Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые

1086. *Chaenorhinum minus (L.) Lange (#*Antirrhinum minus* L.; *Ch. viscidum* (Moench) Simonk.; #*Microrrhinum minus* (L.) Fourr.) – **Хеноринум малый.**

Одн., цв. VI-VIII. На каменистых склонах, галечниках речных долин, изредка.

1087. *Euphrasia irenae Juz. (#*E. liburnica* auct. p.p.; *E. tatarica* auct. non Fisch. ex Spreng.) – **Очанка Ирены.**

Одн., цв. VII-IX. На сухих склонах, лесных полянах, на яйле, обычно.

1088. *Euphrasia taurica Ganesch. ex Popl. – **Очанка крымская.**

Одн., цв. VII-VIII. На скалистых склонах яйлы и каменистых обнажениях, довольно обычно. Энд.

1089. *Gratiola officinalis L. – **Авран лекарственный.**

Мн., цв. VI-VII. На влажных местах, в нижней зоне, редко.

1090. *Lathraea squamaria L. – **Петров крест чешуйчатый.**

Мн., цв. III-V. В лесах, по долине р. Альма, паразитирует на лещине, ольхе, довольно обычно.

1091. *Linaria genistifolia (L.) Mill. (*Antirrhinum genistifolium* L.; #*L. caucasigena* Kem.-Nath.; #*L. iberica* Kem.-Nath.; #*L. imerethica* Kem.-Nath.; #*L. kantschavelii* Kem.-Nath.; *L. pontica* Kuprian.; *L. scenoreina* Juz.) – **Льянка дроколистная.**

Мн., цв. V-IX. На каменистых склонах, полянах, у дорог, обычно.

1092. *Linaria ruthenica Bloński (*L. biebersteinii* Besser ssp. *ruthenica* (Bloński) Ivanina; #*L. biebersteinii* ssp. *strictissima* (Schur) Soó; #*L. italica* var. *strictissima* Schur) – **Льянка русская.**

Мн., цв. VI-VIII. На полянах с луговой растительностью, как сорное у дорог, обычно.

1093. *Macrosyringion glutinosum (M.Bieb.) Rothm. (*Odontites glutinosum* (M.Bieb) Benth.) – **Макросирингион клейкий.**

Одн., цв. VIII-IX. На каменистых склонах, яйле, изредка.

1094. *Melampyrum argyrocomum Fisch. ex Koso.- Pol. (#M. arvense var. argyrocomum Fisch. ex Ledeb.) – Марьянник серебристохохлатый.

Одн., цв. VI-VII. На лесных полянах, очень редко (Г.П. 643, Вульф, 1969).

1095. *Melampyrum arvense L. (#M. arvense ssp. aestivum Govor.; #M. arvense ssp. pseudobarbatum (Schur) Ronniger; #M. arvense var. pseudobarbatum Schur; #M. arvense ssp. venum Govor.; #M. pseudobarbatum (Schur) Schur) – Марьянник полевой.

Одн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, в светлых лесах, на луговинах яйлы, среди кустарников, обычно.

1096. Odontites luteus (L.) Clairv. (Orphantha lutea (L.) A. Kerner ex Wettst.) – Зубчатка (органта) желтая.

Одн., цв. VIII-IX. На луговых и степных склонах, очень редко (Л.С. 256, YALT).

1097. *Odontites vulgaris Moench (O. serotinus Dumort.; #E. rubra Baumg. nom. illeg.; #O. rubra (Baumg.) Opiz, nom. illeg.; #O. rubra Gilib. nom. inval.; Euphrasia serotina Lam., nom. illeg.; #O. verna ssp. serotina (Dumort.) Corb.) – Зубчатка обыкновенная.

Одн., цв. VIII-IX. На лесных сухих полянах, среди кустарников, обычно.

1098. *Pedicularis sibthorpii Boiss. – Мытник Сибторпа.

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах, травянистых склонах в светлых лесах, на яйле, довольно обычно.

1099. *Rhinanthus aestivalis (N.Zinger) Schischk. & Serg. (Alectorolophus aestivalis N.Zinger; #Rh. angustifolius ssp. aestivalis (N.W.Zinger) Soó; #Rh. angustifolius var. aestivalis (N.W.Zinger) E.Mayer; #Rh. angustifolius ssp. grandiflorus (Wallr.) D.A.Webb, p.p.; #Rh. grandiflorus ssp. aestivalis (N.W.Zinger) Soó; #Rh. serotinus ssp. aestivalis (N.W.Zinger) Dostál; #Rh. vernalis ssp. aestivalis (N.W.Zinger) Ivanina) – Погремок летний.

Одн., цв. VII-VIII. На луговинах яйлы, на склонах и в лесах, в среднем и верхнем поясе, обычно.

1100. Rhinanthus vassilczenkoi Ivanina & Karasjuk (Rh. mediterraneus auct. non (Sterneck) Adamov) – Погремок Вассильченкой.

Одн., цв. V-VII. На горных склонах, Бабуган-яйла, г. Большая Чучель (Вульф, 1969).

1101. *Rhinanthus vernalis (N.Zinger) Schischk. & Serg. (Alectorolophus vernalis N.Zinger; #Rh. angustifolius ssp. grandiflorus (Wallr.) D.A.Webb, p.p.; #Rh. angustifolius ssp. vernalis (N.W.Zinger) Soó; #Rh. grandiflorus ssp. vernalis (N.W.Zinger) Soó; Rh. serotinus (Schoenh.) Oborny ssp. vernalis (N.Zinger) Hyl.) – Погремок весенний.

Одн., цв. V-VIII. На опушках, луговинах, яйле, обычно.

1102. Scrophularia bicolor Smith (S. canina auct. non L. #S. canina ssp. bicolor (Sm.) Greuter) – Норичник двуцветный.

Мн., цв. V-VIII. На каменистых, сухих полянах, у дорог, изредка.

1103. *Scrophularia exilis Popl. – Норичник тонкий.

Мн., цв. V-VI. На каменистой осыпи в верховье р. Авунда у Гурзуфского седла (Г.П. 626). Энд.

1104. *Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый.

Мн., цв. V-VIII. В лесах, на опушках, среди кустарников, довольно обычно.

1105. *Scrophularia rupestris M.Bieb. ex Willd. (#S. variegata ssp. rupestris (M.Bieb. ex Willd.) Grau) – Норичник скальный.

Мн., цв. VI-VII. На щебнистых, каменистых склонах яйлы, Чатыр-Даг, изредка.

1106. *Scrophularia scopolii Норре ex Pers. – Норичник Скополи.

Двул., цв. V-IX. В лесах, на полянах, в тенистых местах, довольно обычно.

- 1107. *Scrophularia umbrosa Dumort.** (*S. alata* Gilib., nom. inval.; *S. aquatica* L., nom utique rej. Prop.) – **Норичник теневой.**
Мн., цв. VI-IX. На влажных полянах, у водоемов, изредка.
- 1108. Verbascum blattaria L.** – **Коровяк тараканий.**
Одн.-двул., цв. V-VIII. На сухих склонах и полянах, по берегам водоемов, район Горного озера, редко.
- 1109. Verbascum densiflorum Bertol.** (*V. thapsiforme* Schrad.) – **Коровяк высокий.**
Одн., цв. VI-VII. На сухих склонах, лесных полянах, лугах, изредка.
- 1110. *Verbascum orientale (L.) All.** (*Celsia orientalis* L.; *V. chaixii* Vill. ssp. *orientale* (M.Bieb.) Hayek; *V. marshallianum* Ivavina & Tzvelev) – **Коровяк восточный.**
Мн., цв. VI-IX. На лесных полянах, лесосеках, у лесных дорог и жилья, обычно.
- 1111. *Verbascum phlomoides L.** – **Коровяк лекарственный.**
Двул., цв. VI-VIII. На сухих склонах, открытых полянах, у жилья, довольно обычно.
- 1112. Verbascum pyramidatum M.Bieb.** – **Коровяк пирамидальный.**
Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, опушках (Л.С. 249, YALT).
- 1113. *Verbascum spectabile M.Bieb.** – **Коровяк блестящий.**
Двул., цв. VI-VII. На сухих склонах, лесных полянах, у лесных дорог, обычно.
- 1114. *Verbascum thapsus L.** – **Коровяк обыкновенный.**
Двул., цв. VI-VII. На приайлинских склонах, сорных местах у жилья, редко.
- 1115. *Veronica anagallis-aquatica L.** (*V. anagalliformis* Boreau; #*V. anagallis-aquatica* ssp. *anagallidiformis* (Boreau) Soó) – **Вероника ключевая.**
Мн., цв. IV-IX. По берегам ручьев, болотцев, водоемов, изредка.
- 1116. *Veronica arvensis L.** – **Вероника полевая.**
Одн.-двул., цв. IV-V. На шиферных склонах, у дорог, на Ускуларском хребте, редко. Адв.
- 1117. Veronica austriaca L.** (*V. dentata* F.W.Schmidt) – **Вероника австрийская.**
Мн., цв. V-VII. На каменистых склонах, в светлых лесах, редко.
- 1118. *Veronica beccabunga L.** – **Вероника поточная.**
Мн., цв. IV-IX. Во влажных местах, по берегам болотцев, редко (Г.П. 634).
- 1119. Veronica capsellcarpa Dubovik** (*V. multifida* auct. non L.; #*V. multifida* ssp. *capsellcarpa* (Dubovik) Jelen.) – **Вероника пастушьесумкоплодная.**
Мн., цв. V-VII. На сухих склонах, в светлых лесах, на полянах, обычно.
- 1120. *Veronica chamaedrys L.** – **Вероника дубравная.**
Мн., цв. VI-VIII. В лесах, на полянах, среди кустарников, на луговинах, обычно.
- 1121. Veronica cymbalaria Vod.** – **Вероника цимбалариевая.**
Одн., цв. IV-V. На Бабугане, сбор В.Косых (1980).
- 1122. Veronica dillenii Crantz** – **Вероника Дилления.**
Одн.-двул., цв. IV-VI. На яйле, Никитская яйла над Красным камнем (Вульф, 1969).
- 1123. *Veronica gentianoides Vahl** (#*V. charadzeae* Kem.-Nath.; #*V. kemulariae* Kuth.) – **Вероника горечавковая.**
Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, луговинах яйлы и приайлинских склонах, обычно.
- 1124. Veronica hederifolia L.** – **Вероника плющелистная.**
Одн.-двул., цв. III-IV. На сухих полянах, среди кустарников, у дорог, преимущественно в нижней зоне, обычно.
- 1125. *Veronica incana L.** (#*Pseudolysimachion incanum* (L.) Holub; #*P. incanum* (L.) T. Yamazaki, comb. superfl.; #*V. bellidifolia* Juz.; #**V. spicata* ssp. *incana* (L.) Walters) – **Вероника седая.**

Мн., цв. V-VIII. На каменистых склонах яйлы со степной растительностью, Чатыр–Даг (Г.П. 628). Энд.**

1126. **Veronica officinalis* L. – Вероника лекарственная.

Мн., цв. VI-IX. На лесных опушках, в лесах, на лугах, в среднем и верхнем поясе, не часто.

1127. *Veronica persica* Poir. (#*V. meskhetica* Kem.-Nath.) – Вероника персидская.

Одн.-двул., цв. III-X. На лесных полянах, яйле, сухих склонах, как сорное, изредка. Адв.

1128. *Veronica polita* Fr. (*V. didyma* auct. vix Ten.) – Вероника глянцевая.

Одн.-двул., цв. III-X. На сухих склонах, сорное в посевах, редко. Адв.

1129. *Veronica praecox* All. – Вероника ранняя.

Одн., цв. III-IV. На каменистых склонах со степной растительностью, яйле, довольно редко.

1130. **Veronica scutellata* L. – Вероника щитковая.

Мн., цв. V-IX. На берегу болотца под Чатыр–Дагом, очень редко (Г.П. 641).

1131. **Veronica serpyllifolia* L. (#*V. serpyllifolia* ssp. *nummularioides* (Lecoq & Lamotte) Dostál; #*V. serpyllifolia* var. *nummularioides* Lecoq & Lamotte; #*V. tenella* All.) – Вероника тимьянолистная.

Мн., цв. V-VIII. На лесных полянах, сухих склонах, у дорог, изредка.

1132. *Veronica spicata* L. (#*Pseudolysimachion spicatum* (L.) Opiz; #*P. spicatum* ssp. *hybridum* (L.) Holub; #*V. hybrida* L.; #*V. paczoskiana* Klokov) – Вероника колосистая.**

Мн., цв. VI-X. На опушках, среди кустарников, в светлых лесах, довольно обычно.

1133. **Veronica taurica* Willd. – Вероника крымская.

Мн., цв. V-VII. На каменистых сухих склонах, яйле, обычно.

1134. **Veronica teucrium* L. (*V. austriaca* L. ssp. *teucrium* (L.) D.A.Webb; #*V. austriaca* var. *teucrium* (L.) O. Bolos & Vigo) – Вероника широколистная.

Мн., цв. V-VII. В светлых лесах, на полянах, среди кустарников, довольно обычно.

1135. **Veronica umbrosa* M.Bieb. – Вероника тeneвая.

Мн., цв. III-VI. В тенистых лесах, на каменистых склонах, часто.

1136. **Veronica verna* L. – Вероника весенняя.

Одн.-двул., цв. III-VI. Южный склон г. Черная, редко (Г.П. 631).

Solanaceae Juss. – Пасленовые

1137. **Atropa bella-donna* L. – Красавка белладона.

Мн., цв. V-VII. На лесных полянах, лесосеках, у дорог, обычно. ЧКУ.

1138. *Datura stramonium* L. – Дурман обыкновенный.

Одн., цв. VI-IX. У жилья, на огородах, у дорог, изредка. Адв.

1139. **Hyoscyamus niger* L. (#*H. bohemicus* F.W. Schmidt; #*H. pallidus* Waldst. & Kit. ex Willd.) – Белена черная.

Одн.-двул., цв. V-IX. На остепненных полянах, у жилья и дорог, изредка. Адв.

1140. **Physalis alkekengi* L. – Физалис обыкновенный.

Мн., цв. V-VI. В тенистых местах, среди кустарников, у ручьев и дорог, обычно.

1141. **Solanum dulcamara* L. – Паслен сладко-горький.

Полукуст., цв. V-IX. В кустарниковых зарослях, на огородах, у жилья, не часто.

1142. **Solanum nigrum* L. (*S. flavescens* Andrz. 1862, non Dun. 1813) – Паслен черный.

Одн., цв. VI-IX. На придорожных полянах, у жилья, на огородах, не часто. Адв.

Tamaricaceae Link – Гребеншиковые

1143. *Myricaria bracteata Royle (*M. alopecuroides* Schrenk.; *M. germanica* ssp. *alopecuroides* (Schrenk) Kitam.) – **Мирикария прицветниковая.**

Куст., цв. V-VI. На галечниках, по долине р. Альма, редко.

1144. Tamarix tetrandra Pall. ex M.Bieb. – Гребенщик (тамарикс) четырехтычинковый.

Куст., цв. V-VI. По долине р. Альма в районе корд. Тарьер, на галечнике, редко.

Tiliaceae Juss. – Липовые

1145. Tilia begoniifolia Steven (*T. caucasica* Rupr.; #*T. caucasica* f. *begoniifolia* (Stev.) Ig. Vassil.; #*T. officinarum* ssp. *caucasica* (Rupr.) Andonovski; #*T. platyphyllos* ssp. *caucasica* (Rupr.) Loria; #*T. prilipkoana* Grossh. & J. Wagner) – **Липа бегониелистная.**

Дер., цв. VII. В лиственных и смешанных лесах, на опушках, изредка.

1146. *Tilia cordata Mill. (*T. officinarum* Crantz., nom. utique rej. prop.; *T. parvifolia* Hoffm.) – **Липа сердцевидная.**

Дер., цв. VI-VIII. В лесах, по всей территории, обычно.

1147. Tilia dasystyla Steven – Липа пушистостолбиковая.

Дер., цв. VI. Смешанные лиственные леса, район водопада Головкинского, редко.
ЧКУ, ERL.

Ulmaceae Mirb. – Ильмовые

1148. Celtis glabrata Steven ex Planch. – Каркас голый.

Куст., цв. III-IV. На сухих склонах в Ялтинском лесн-ве (Л.С. 75).

1149. *Ulmus glabra Huds. (*U. elliptica* K.Koch; *U. excelca* Borkh.; *U. podolica* (Wilcz.) Klokov; *U. scabra* Mill.; *U. sukaczewii* Andron.) – **Ильм голый.**

Дер., цв. IV-V. В лесах верхнего и среднего пояса как сопутствующая порода, по долине р. Альма, не часто.

1150. *Ulmus minor Mill. (#*U. araxina* Takht.; *U. campestris* L., nom. ambig.; *U. carpinifolia* Rupp. ex Suckow; *U. corylifolia* Host; #*U. densa* Litv.; *U. foliacea* Gilib., nom. inval.; #*U. georgica* Schchian; *U. glabra* Mill. 1768, non Huds. 1762; #*U. grossheimii* Takht.; #*U. minor* var. *suberosa* (Moench) Dostál; #*U. suberosa* Moench; #*U. uzbekistanica* Drobow; *U. wyssotzkyi* Kotov) – **Вяз малый.**

Дер., цв. III-IV. Среди кустарников по долине р. Альма, в светлых лесах нижней зоны, обычно.

1151. *Ulmus suberosa Moench (*U. minor* Mill. var. *suberosa* (Moench) Soó) – **Вяз пробковый, карагач.**

Дер., цв. III-IV. По всей территории – не часто, в нижнем поясе – обычно.

Urticaceae Juss. – Крапивные

1152. *Parietaria officinalis L. (*P. erecta* Mert. & W.D.J.Koch) – **Постенница лекарственная.**

Одн., цв. V-VIII. В балках, образует заросли, довольно часто.

1153. Parietaria serbica Pančać (#*Freirea chersonensis* (Lang & Szov.) Jarm.; #*F. serbica* (Panc.) Jarm.; *P. chersonensis* (Lang & Szov.) Dörfel.; *P. lusitanica* auct. non L.; #*P. lusitanica* ssp. *chersonensis* (Lang & Szov.) Chrtek; *P. lusitanica* ssp. *serbica* (Pančać) P.W. Ball) – **Постенница сербская.**

Одн., цв. V-VIII. Под пологом леса и на лесных полянах, изредка.

1154. *Urtica dioica L. – Крапива двудомная.

Мн., цв. VI-X. Под пологом леса и на полянах, у дорог и жилья, сорное, обычно.

1155. **Urtica urens* L. – Крапива жгучая.

Одн., цв. V-X. В огородах и близ жилья, сорное, изредка (Г.П. 189). Адв.

Valerianaceae Batsch – Валериановые

1156. **Valeriana wolgensis* Kazak. (#*V. collina* ssp. *nitida* (Kreyer) A. & D.Love; *V. nitida* Kreyer; *V. officinalis* L. ssp. *nitida* (Kreyer) Soò, ~ *V. officinalis* L.; #*V. officinalis* var. *nitida* (Kreyer) Rostanski; #*V. tanaitica* Worosch.; #*V. wallrothii* ssp. *nitida* (Kreyer) Dostál; #*V. wolgensis* var. *nitida* Kazak.) – **Валериана лекарственная.**

Мн., цв. VI-VII. На влажных полянах, лесных опушках, по берегам рек, не часто.

1157. *Valerianella coronata* (L.) DC. – Валерианелла килеватая.

Одн., цв. IV. На сухих склонах, хр. Конек, редко.

1158. ?Valerianella costata* (Steven) Betcke – Валерианелла ребристая.**

Одн., цв. IV. Луг по долине р. Альма, Г. Поплавская приводит под «?» (Г.П. 682).

1159. *Valerianella dentata* (L.) Poll. – Валерианелла зубчатая.

Одн., цв. V-VI. На сухих полянах, сорных склонах, по долине р. Альма, довольно обычно.

1160. *Valerianella locusta* (L.) Laterrade (*V. olitoria* (L.) Pollich) – Валерианелла колосковая.

Одн., цв. IV-V. На травянистых полянах, опушках, обычно.

1161. *Valerianella pumila* (L.) DC. – Валерианелла маленькая.

Одн., цв. IV. На сухих полянах, остепненных склонах, в нижней зоне, изредка.

1162. *Valerianella rimosa* Bast. – Валерианелла щелистая.

Одн., цв. IV-V. На шиферных склонах, сухих полянах, редко.

Verbenaceae Jaume – Вербеновые

1163. **Verbena officinalis* L. – Вербена лекарственная.

Мн., цв. VI-VIII. На лесных полянах, у дорог, изредка. Адв.

Violaceae Batsch – Фиалковые

1164. *Viola alba* Besser (*V. besseri* Rupr.) – Фиалка белая.

Мн., цв. II-VI. В дубовых, буковых и смешанных лесах, на полянах и среди кустарников, довольно обычно. ЧКУ.

1165. **Viola ambigua* Waldst. & Kit. (*V. campestris* M.Bieb.) – Фиалка сомнительная.

Мн., цв. III-IV. Среди кустарников, на сухих склонах и яйле, обычно.

1166. **Viola arvensis* Murray (*V. agrestis* Jord.; *V. parviflora* Neilr.) – Фиалка полевая.

Одн.-двул., цв. V-VI. На полянах, у дорог, в посевах, сорное, не часто. Адв.

1167. *Viola canina* L. – Фиалка собачья.

Мн., цв. V-VI. В лесах и на полянах, редко (Л.С. 191).

1168. *Viola kitaibeliana* Schult. (*V. parviflora* Kit.; ~*V. arvensis* Murray) – Фиалка Китаибелева.

Одн., цв. IV-V. На каменистых склонах, остепненных полянах, изредка.

1169. **Viola mirabilis* L. – Фиалка удивительная.

Мн., цв. V-VI. В лесах и на полянах, изредка.

1170. *Viola montana* L. s.str. (#*V. canina* ssp. *montana* (L.) Hartmann; #*V. canina* var. *montana* (L.) Fries; *V. elatior* Fries) – Фиалка горная.

Мн., цв. V-VI. В светлых лесах и на полянах, довольно редко.

1171. **Viola odorata* L. – Фиалка пахучая.

Мн., цв. IV-V. В лесах на полянах, по долине р. Альма, обычно.

1172. **Viola oreades* M.Bieb. – Фиалка скальная.

Мн., цв. IV-V. На каменистых местах, открытых полянах, яйлах, в верхнем лесном поясе, обычно. **ЧКУ, IUCN, ERL.**

1173. **Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau (*V. sylvatica* Fr. ex Hartm.f.; *V. sylvestris* sensu Rchb., non Lam. #*V. sylvestris* Lam. p.p. nom. illeg.) – Фиалка Рейченбаха.

Мн., цв. IV-V. В лесах, среди кустарников и на луговинах, обычно.

1174. **Viola saxatilis* F.W.Schmidt (*V. elisabethae* Klokov; *V. vespertina* Klokov) – Фиалка каменистая.

Мн., цв. V-VI. На лесных полянах и приайлинских склонах, изредка.

1175. *Viola sieheana* W.Beck. – Фиалка Зиге.

Мн., цв. III-VI. В лесах и на яйлинских лугах, обычно.

1176. *Viola suavis* M.Bieb. (*V. austriaca* A.Kern. & J.Kern.; #*V. pontica* W. Beck.) – Фиалка приятная.

Мн., цв. III-V. В лесах и на полянах верхнего пояса, редко.

Vitaceae Juss. – Виноградные

1177. *Vitis sylvestris* C.C.Gmel. (*V. vinifera* L. ssp. *sylvestris* (C.C.Gmel.) Hegi) – Виноград лесной.

Куст., цв. VI-VII. В лиственных лесах нижней и средней зоны, не часто.

Примечания:

– Названия даются по С.К. Черепанову (1995); ! – натурализовавшиеся интродуценты. * – вид приводится в списке Г.И. Поплавской (1931), произрастание его подтверждено сборами других коллекторов или авторами данной публикации; (Г.П.) (Л.С.) (Л.П.) (Вульф, 1957) – виды, которые приводились только Г.И. Поплавской (1931), Самсоновой (1953), Л.А. Приваловой (1958) или в других литературных источниках, а в 80-е гг. не отмечались на территории заповедника. YALT – по гербарным образцам, хранящимся в Никитском ботаническом саду.

Сокращения: **Адв.** – адвентивный вид. **Опр. Кр.** – Определитель высших растений Крыма (1972). **Опр. Укр.** – Определитель высших растений Украины (1987); **Энд.** – крымский эндемик, **Энд.**** – эндемичный подвид (по А.В. Ена, 2009).

Раритетность: IUCN – Красный список находящихся под угрозой растений Международного союза охраны природы (1998), ERL – Европейский красный список (1991); ВК – Конвенция об охране дикой флоры и фауны, а также их природных мест обитания в Европе (Берн, 1979); ЧКУ – Червона книга України. Рослинний світ (2009); **CITES** – конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (Вашингтон, 1973).

Литература

- Вульф Е. В. Флора Крыма. Т. 1. – Вып. 2: Папоротникообразные, голосемянные. – Л.: НБС, 1927. – 54 с.
- Вульф Е. В. Флора Крыма. Т. 1. – Вып. 2: Однодольные. – Л.: НБС, 1929. – 77 с.
- Вульф Е. В. Флора Крыма. Т. 1. – Вып. 3: Однодольные. – Л.: НБС, 1930. – 126 с.
- Вульф Е. В. Флора Крыма. Т. 2. – Вып. 1: Двудольные. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1947. – 329 с.
- Вульф Е. В. Флора Крыма. Т. 1. – Вып. 4: Злаки / Под ред. С.С. Станкова. – М.: Сельхозгиз, 1951. – 153 с.
- Вульф Е. В. Флора Крыма. Т. 2. – Вып. 2: Двудольные. Толстянковые – Бобовые / Под ред. С.С. Станкова. – М.: Сельхозгиз, 1960. – 311 с.
- Вульф Е. В. Флора Крыма. – Т. 3. – Вып. 1: Вересковые – Маслинные / Под ред. С.С. Станкова. – М.: Сельхозгиз, 1957. – 86 с.
- Вульф Е. В. Флора Крыма. Т. 3. – Вып. 2: Вьюнковые – Пасленовые / Под ред. Н. И. Рубцова, С.С. Станкова. – М.: Колос, 1966. – 256 с.
- Вульф Е.В. Флора Крыма. Т. 3. – Вып. 3: Норичниковые – Сложноцветные / Под ред. Н. И. Рубцова, Л.А. Приваловой. – Ялта, 1969. – 393 с.
- Ена А.В. Ресурсы спонтанной флоры злаковых Крыма // Проблемы устойчивого развития АПК Крыма: Сб. тр. Аграрного отд. КАН. – Симферополь, 2003а. – С. 158-166.
- Ена А.В. Чеклист Asteraceae флоры Крыма. I. Asteroideae // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Темат. сб. науч. работ. – Симферополь, 2003. – Вып. 13. – С. 3-13.
- Ена А.В. Чеклист Asteraceae флоры Крыма. II Cichorioideae. // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Темат. сб. науч. работ. – Симферополь, 2005. – Вып. 15. – С. 18-28.
- Ена А.В. Феномен флористичного эндемизму та його прояви у Криму. Автореф. дис. ... докт. біол. наук. – Київ, 2009. – 34 с.
- Костина В.П. О новых флористических находках в Горном Крыму // Новости систематики низших и высших растений. Сб. науч. тр. – 1979. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 86-90.
- Костина В.П. Раритетная флора Крымского природного заповедника // Состояние природных комплексов Крымского природного заповедника и других заповедных территорий Украины, их изучение и охрана. – Алушта, 2003. – С. 118-127.
- Костина В.П. Флористическое богатство Крымского природного заповедника // Матер. респуб. конф. «Заповедники Крыма на рубеже тысячелетий», 27 апреля 2001 г., г. Симферополь. – Симферополь, 2001. – С. 66-68.
- Костина В.П. Флористическое обследование территории Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства, выявление редких и исчезающих видов, составление списка и картотеки видов растений (заключительный отчет). – Алушта, 1981. – Рукопись № 91. – 183 с.
- Костина В.П., Слизык-Маслова Л.Н. Крымский природный заповедник: краткая история ботанических исследований и современные задачи // Матер. научн. конф. «Евгений Иванович Вульф – крупнейший крымский флорист XX века», 25-27 мая 2000 г., г. Алушта. – К.: Стилос, 2002. – С. 165-178.
- Определитель высших растений Крыма / Под общ. ред. Н.И. Рубцова. – Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1972. – 550 с.

- Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. – К.: Наукова думка, 1987. – 548 с.
- Поплавская Г.И. Список растений, собранных в Крымском природном заповеднике. – М.-Л.: Гос. мед. изд-во, сектор науки и Наркомпресса, 1931. – 103 с.
- Попов К.П. Краткие итоги изучения флоры и растительности Крымского заповедно-охотничьего хозяйства // Крымское заповедно-охотничье хозяйство (50 лет). Симферополь: Крымиздат, 1963. – С. 53-72.
- Привалова Л.А. Растительный покров нагорий Бабугана и Чатыр-Дага. Общее заключение по всему Крымскому нагорью // Труды Никитск. ботан. сада. – 1958. – Т. XXVIII. – Ялта, 1958. – 203 с.
- Червона книга України. Рослинний світ / ред. Я.П. Дідух. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). – С.-Пб.: Мир и семья, 1995. – 992 с.
- Ярославцев Г.Д., Доценко А.П. Опыт внедрения древесных экзотов в заповедные леса Крыма // Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство (50 лет). – Симферополь: Крымиздат, 1963. – С. 143-167.
- Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine a nomenclatural checklist. – Kiev, 1999. – 345 p.