

УДК 598.2 (477.75)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА

Бескаравайный М.М.

Карадагская научная станция – природный заповедник РАН,
e-mail: karavay54@mail.ru

Материалы по орнитофауне Севастополя, опубликованные в последние десятилетия, охватывают лишь некоторые районы и ландшафтно-биотопические единицы региона или касаются отдельных видов или групп птиц.

Цель настоящей работы – предварительная оценка орнитологического разнообразия региона в целом. Используются материалы как собственных наблюдений (1977–2016 гг.), так и изложенные в публикациях второй половины XX – начала XXI вв. (Костин, 1983; Клестов, Осипова, 1991; Цвелых, 1993, 2002; Абакумов, Цвелых, 1994; Цвелых и др., 1997; Клестов, Цвелых, 1999; Домашевский, 2002; Костин, 2014, 2016; Гирагосов и др., 2015; Гирагосов, Бескаравайный, 2016; Прокопенко, Кучеренко, 2016 и др.).

Согласно физико-географическому делению Крыма, Севастопольский регион (1079 кв. км) расположен в Чернореченском районе Предгорной области (Подгородецкий, 1988), с юга и запада он омывается Черным морем (длина береговой линии 152 км). Естественные биотопы представлены пушистодубовыми, высокоможжевельными и сосновыми лесами, скальными и береговыми формами рельефа, степными участками. Значительную площадь занимают земли сельскохозяйственного использования и городская застройка.

В состав современной орнитофауны региона входит не менее 244 видов птиц (прогнозируемое количество – приблизительно 270 видов). Лидируют по количеству видов воробьинообразные (97), далее следуют ржанкообразные (37), соколообразные (27), гусеобразные (25), аистообразные (12), журавлеобразные (7), совообразные (6), поганкообразные, веслоногие и голубеобразные (по 5), курообразные (4), ракшеобразные и дятлообразные (по 3), гагарообразные и стрижеобразные (по 2), трубконосые, кукушкообразные, козодоеобразные и удообразные (по 1 виду).

Гнездовой компонент орнитофауны включает приблизительно 100 видов: воробьинообразных – 54, соколообразных – 11, ржанкообразных – 7, голубеобразных – 4, остальных – 1–3 вида.

Древесно-кустарниковый орнитокомплекс наиболее разнообразен – его образуют не менее 45 видов: доминируют *Columba palumbus*, *Streptopelia turtur*, *Lanius collurio*, *Garrulus glandarius*, *Anthus trivialis*, *Sylvia atricapilla*, *S. communis*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Luscinia megarhynchos*, *Turdus merula*, *Parus caeruleus*, *P. major*, *Fringilla coelebs*, *Chloris chloris*, *Carduelis carduelis*.

Скальный орнитокомплекс состоит из 15 видов, из которых обычны *Falco tinnunculus*, *Apus apus*, *A. melba*, *Delichon urbica*, *Corvus corax*, *Oenanthe pleschanka*, вероятно *Columba livia*, а также два облигатно-гидрофильных вида береговой зоны – *Phalacrocorax aristotelis* и *Larus cachinnans*.

В открытых травянистых биотопах (степи, ксерофитные сообщества, поля сельхозкультур) встречается не менее 13 видов: обычны *Alectoris chukar*, *Perdix*

perdix, *Upupa epops*, *Melanocorypha calandra*, *Galerida cristata*, *Anthus campestris*, *Oenanthe oenanthe*, *Emberiza calandra*, *E. hortulana*.

Гидрофильный орнитокомплекс обеднен (8, возможно 12 видов): в тростниковых сообществах на искусственных пресных водоемах и в вершинах некоторых бухт Гераклейского полуострова отмечены *Ixobrychus minutus*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Emberiza schoeniclus*; на прибрежных участках, берегах и отмелях – *Anas platyrhynchos*, *Himantopus himantopus*, вероятно *Charadrius dubius*; в грунтовых обрывах у водотоков – *Alcedo atthis*; на надводных сооружениях Севастопольской бухты – *Sterna hirundo*.

В зимний период зарегистрировано 129 видов; из них не менее 77 (в т.ч. не менее 33 – дендрофильных) составляют орнитокомплекс суходольных биотопов. Состав фоновых видов практически не отличается от такового в других районах Горного Крыма (*Circus cyaneus*, *Phasianus colchicus*, *Columba palumbus*, *C. livia*, *Streptopelia decaocto*, *Dendrocopos major*, *D. syriacus*, *Galerida cristata*, *Melanocorypha calandra*, *Alauda arvensis*, *Anthus pratensis*, *Sturnus vulgaris*, *Pica pica*, *Corvus frugilegus*, *C. cornix*, *Troglodytes troglodytes*, *Regulus regulus*, *Erithacus rubecula*, *Turdus merula*, *T. pilaris*, *T. viscivorus*, *Aegithalos caudatus*, *Parus caeruleus*, *P. major*, *Passer domesticus*, *Fringilla coelebs*, *Chloris chloris*, *Spinus spinus*, *Carduelis carduelis*, *Acanthis cannabina*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Emberiza calandra*, *E. citreola*). Специфичная черта зимнего орнитокомплекса суходольных биотопов – регулярная зимовка коршуна (*Milvus migrans*).

Зимняя орнитофауна морских берегов и прибрежной акватории включает 50 водных и околотовных видов из 8 отрядов. Многочисленный орнитокомплекс (48 видов) формируется в закрытых бухтах Гераклейского полуострова. Здесь доминируют гусеобразные (23 вида: обычны *Cygnus olor*, *Anas platyrhynchos*, *Aythya ferina*, *A. fuligula*) и ржанкообразные (13 видов: обычны *Larus ridibundus*, *L. cachinnans*, *L. canus*); в число доминантов также входят *Podiceps cristatus*, *Phalacrocorax carbo*, *Fulica atra*. Во время экстремальных похолоданий обычными становятся *Cygnus cygnus*, *Netta rufina*, *Anas penelope*, *Bucephala clangula*, *Mergus albellus*. Характерная черта орнитокомплекса – регулярная зимовка видов, редких в других районах южного Крыма: *Podiceps ruficollis*, *Ardea cinerea*, *Gallinula chloropus*, *Tringa totanus*, а в последние годы – *Oxyura leucocephala*. Зимний орнитокомплекс у открытых берегов значительно беднее (около 30 видов): его стабильную часть образуют *Gavia arctica*, *Podiceps nigricollis*, *P. cristatus*, *Phalacrocorax carbo*, *Ph. aristotelis*, *Mergus serrator*, *Larus cachinnans*.

Видовой состав пролетных птиц изучен недостаточно. По имеющимся данным к пролетным относится не менее 152 видов. В суходольных биотопах обычны *Coturnix coturnix*, *Columba palumbus*, *Lullula arborea*, *Alauda arvensis*, *Anthus trivialis*, *Motacilla alba*, *Lanius minor*, *Oriolus oriolus*, *Sturnus vulgaris*, *Corvus frugilegus*, *Acrocephalus schoenobaenus*, *Sylvia atricapilla*, *S. borin*, *S. communis*, *Phylloscopus trochilus*, *Ph. collybita*, *Ficedula hypoleuca*, *F. albicollis*, *F. parva*, *Muscicapa striata*, *Saxicola rubetra*, *S. torquata*, *Oenanthe oenanthe*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Ph. ochruros*, *Erithacus rubecula*, *Turdus pilaris*, *T. philomelos*, *Emberiza citrinella*. Преимущественно над территорией пролетают *Grus grus*, *Riparia riparia*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica*, *Apus apus*, *A. melba*. Осенью хорошо заметен пролет хищных птиц, из которых обычны *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Accipiter nisus*, *Buteo*

buteo, *Circaetus gallicus*, *Aquila clanga*, *A. heliaca*, *Falco subbuteo*, *F. vespertinus*, *F. tinnunculus*.

На морских берегах и прибрежной акватории задерживаются *Gavia arctica*, *Podiceps nigricollis*, *P. cristatus*, *Phalacrocorax carbo*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta alba*, *E. garzetta*, *Ardea cinerea*, *A. purpurea*, *Himantopus himantopus*, *Tringa glareola*, *Actitis hypoleucos*, *Philomachus pugnax*, *Larus melanocephalus*, *L. ridibundus*, *L. fuscus*, *L. canus*, *Thalasseus sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Alcedo atthis*.

Около 20 видов встречаются в регионе во время весенне-летних кочевок. В их числе – *Aegypius monachus*, *Gyps fulvus*, *Loxia curvirostra*, у морских берегов обычны *Puffinus puffinus*, *Phalacrocorax carbo*, *Stercorarius parasiticus*, *Larus melanocephalus*, *L. ridibundus*, *L. cachinnans*; в последние годы регулярно регистрируется *Rissa tridactyla*.

Не менее 38 зарегистрированных в регионе видов относятся к редким и внесены в Красную Книгу Российской Федерации (2001). На гнездовании обычны *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* и *Streptopelia turtur*; также отмечены *Buteo rufinus*, *Circaetus gallicus*, *Gyps fulvus*, *Falco cherrug*, *Falco peregrinus*, *Burhinus oedicnemus*, *Coracias garrulus*.